

# INSTITUTIONES MEDICAE


In usus annuae  
EXERCITATIONIS

DOMESTICOS

Digestae ab  
HERMANNO BOERHAAVE.

Editio altera primâ longè auctior.

31713



*LUGDUNI BATAVORUM,*

Apud JOHANNEM VANDER LINDEN.  
M D C C X I I I.



# ABRAHAMO DROLENVAUX

*Senatori & Scabino Lugdunensi*

Socero suo

HERMANNUS BOERHAAVE.



ANTA quidem est Tuorum  
erga me benefactorum ma-  
gnitudo, ut digna his repen-  
dere nunquam me posse ar-  
bitrer: postquam enim vo-  
tis meis conjugalibus prolem dedisti,  
quam habes, unicam, quae dulcissi-  
ma erat vitae Tibi focia, summo do-  
ni pretio omnem remunerandi spem  
praeripuisse mihi videris. Gratitude  
tamen una tandem superest; quae  
Optimi cujusque sola expectatio, &  
dignum animo benefico praemium ha-  
betur. Insedit quoque ea menti meae  
reverentiae, quâ Te veneror, vis,  
ut illi testandae studere suavissima sit  
prorsus mihi oblectatio. Quin & in

violabilis necessitudo , tam amabili  
pignore inter Nos conciliata , facit-  
ut restent mihi quam plurima pieta-  
tis officia solvenda Tibi ; quibus prae-  
standis vitae spatium meae impenden-  
dum censeo. Atque haec quidem ut  
tacitâ cogitatione mecum semper vol-  
vo , ita solenni quoque denunciatio-  
ne propalare studui. Oportunè igitur  
quum hodie contigerit , ut praesens  
laboris mei fructus committeretur pu-  
blico , aequum duxi strenae loco eum  
ad Te mittere , atque illum palam ,  
meque simul ipsum , consecrare Ti-  
bi ; ut perpetuum sit pietatis , grati-  
tudinis , integraeque ergâ Te reve-  
rentiae meae , monumentum.

*Lugduni Batavorum primo die an-  
ni 1713.*



# LECTORI AUCTOR.



*L*apsos pridem annos quinque numero, postquam opusculi hujus argumentum edideram eo animo, ut materiem daret institutionibus domesticis. Simulac enim docendo admotus eram, sensi propriorum cogitatorum explicatione docentem plus proficere, quam si opus ab alio conscriptum interpretari suscipit. Sua quippe optime intelligit, sua cuique prae coeteris placent, unde clarior fere doctrina, atque animata plerumque sequitur oratio. Qui verò sensa alterius exponit, infelicius saepenumero eadem assequitur; quumque suo quisque sensu abundat, multa refutanda frequenter invenit, unde gravem frustra laborem aggravat, minusque incitata dictione nititur. Solis movebar argumentis hisce ut, post Optimum quemque, ipse quid conscriberem, licet Illorum operibus mea componere vix ausim. Iisdem & nunc causis impulsus curavi excudendum denuò hunc libellum haud parum immutatum. Est equidem posterior cura ubique sapientior, fertilisque novitas hâc tempestate inventi recentis usum crebrò revelat. Utraque haec culta mihi effecit ut aucta materies, ordo curatior, & sermo forte magis perspicuus, evaserit. Etiam dudum observaveram nihil gratius, vel utilius, fieri his, qui actiones corporis humani speculantur, quam ut penitus intel-

ligant mirandam ejus fabricam, atque in examine medico defectum in his maximum frequentissimè eram expertus. Ideò dedi operam ut indicarem ubique accuratissimas tabulas, in quibus Auctorum in his Principum sincera sapientia corporis structuram verissimè depinxerat. Praeterquam enim quod Optimos cognoscere Tyrones sic incipiant, intelligentia quoque horum ita juvatur facilè, pariterque semel sic perspecta partium compages firmissimâ habetur in memoriâ. Nulli verò rei magis studui, nisi vehementer memet fallit animus, quam fidei certissimae, ut pro vero traderetur nihil, quod rerum experimentis, aut ratione invictâ, haud esset compertissimum. Id artem parvam, certam tamen, efficit, monstrat errores, dubia detegit, figit limites, tutamque viam progressuro expedit. Dubia autem, aut solâ opinandi luxurie nata, dogmata ut plena hic periculi, ita quò operosius animo impressa, eò turpius nos deludunt, ut seri delere ea ex mente nostrâ vel inviti cogamur. Postremò ut intelligas compendia citandi, explicata haec in fronte operis praefigo, en haecce sunt praecipua.

Aquapend. Hieronymi Fabricii ab Aquapendente, opera omnia anatomica, Lipsiae 1687. in folio.

Bartholin. de Str. diaphr. Casparus Bartholinus de diaphragmatis structurâ novâ, Paris. 1676. in octavo.

Bartholin. Act. Phil. Angl. Bartholinus in Actis Philosophicis societatis regiae Anglicanae, in quarto.

Bartholin. An. ref. Thomae Bartholini Anatome, Lugduni Batav. 1686. in octavo.

Barthol. Eustach. Bartholomaei Eustachii opuscula Anatomica, Lugduni Batav. 1707. in octavo.

Bellin. de ren. Laurentii Bellini exercitationes anatomicae de renibus & organo gustus, Lugd. Bat. 1711. 4°.

Bellin. de organ. gust. In tractatu mox dicto.

Bidl. vel Bidl. Anat. Godefridi Bidloo Anatomia corporis humani, Amstelodami 1685. in folio.

Bohn. act. Lipf. Joannes Bohnius in actis Lipsiensibus, Anni 1682. 1683.

Borell. mor. an. Johannes Alphonfus Borellus de motu animalium, Lugd. Bat. 1710. 4°.

Brunner de pancr. Johannis Conradi Brunneri experimenta nova circa pancreas, Amstelæd. 1685. 8°.

Casser. de voc. org. & Casser. Julius Casserius, de vocis, auditusque, organis, Ferrariae 1600. in folio. in hujus citatione T. notat Tabu-

lam. F. figuram. 1. literam in figurâ.

Cowp. app. ad Bidl. The anatomy of humane Bodies by Willm. Cowper Surgeon, Oxford 1698. in folio. Quod est Bidloii opus mox citatum cum appendice Cowperi Anglicè.

Cowp. Myotom. reform. Myotomia reformatâ by William Cowper Surgeon, Lond. 1694. 8o.

Diod. Sic. Diodorus Siculus, Hanoviae 1604. folio.

Drake Anthropol. & Cowper apud Drake. Anthropologia nova by James Drake, London 1707. 8o. 2 vol. ubi multa adfunt Cowperi inventa.

Du Verney de l'Ouie & du Vern. Traite de l'organe de l'ouie par Mr. du Verney, Paris. 1683. 8o.

Euseb. praep. Eusebii praeparatio Euangelica, Colon. 1688. fol.

Fallop. observ. anat. Gabrielis Fallopii observationes anatomicae in operibus ejus omnibus, Francofurti 1584. in folio.

Galen. Galeni opera, Basiliae 1538. folio V. vol.

Glisson. Hep. Francisci Glissonii Anatomia hepatis, Londini 1654. 8o.

Graaf de succ. pancr. Graaf de org. gen. Graaf. vir. org. Graaf. mul. org. Regneri de Graaf opera omnia, Amstelaed. 1705.

Harv. de gen. an. Guilielmus Harvaeus exercitationes de generatione animalium, Londin. 1651. 4o.

Herodot. Herodotus, Francof. 1608. folio.

Higmot.

Higmor. disq. anat. Corporis humani disquisitio Anatomica auctore Nathanaele Higmore, Hagae Com. 1651. folio.

Hippocr. Hippocratis opera Foëssii, Genev. 1657. folio.

Homer. Homeri opera Spondani, Basil. folio.

Hooke iu Epist. ad Leeuwenh. Habetur in actis Anglicanis.

Leal. Leal. &c. Habetur in Barthol. Eustac. suprâ.

Leeuwenh. in Observ. & in act. phil. Antonii van Leeuwenhoek detecta Invisibilia, Lugd. 1696. &c. 3 vol. in 4°.

Lower de Cord. Richardi Lower de corde tractatus, &c. Lugd Bat. 1708. 8°.

Malpig. & Malpig. posth. Marcelli Malpighii opera omnia, 2 Tom. Lond. 1686. fol. ubi in tomo secundo sunt posthuma. Eadem Lugd. Batav. in 4°.

Mauriceau de la gross. Traité des maladies des femmes grosses par M<sup>r</sup>. Mauriceau, Paris. 1683. 4°.

Memoir. de l'Acad. Roy. T. Histoire de l'Académie Royale des sciences Tome &c. Paris. 1699. 4°.

Needham form. foet. Disquisitio Anatomica de formato foetu Authore Gualthero Needham, Londini 1667. 8°.

Nuck Adenogr. Adenographia curiosa authore Anthonio Nuck, Lugd. Bat. 1691. 8°.

Nuck Sialogr. Sialographia Antonii Nuck,  
Lugd. Bat 1695. 8°.

Palfin. osteol. nov. Waare, en seer naauw-  
keurige beschrijvinge der beenderen van  
’s Menschen lighaam door Jan Palfin, Lei-  
de 1702. 8°.

Pausan. Pausanias, Lipsiae 1696. folio.

Perault Essay. Essay de Physiques par Mr.  
Perault, 8°. Paris.

Peyer Parerg. Joannis Conradi Peyeri parer-  
ga Anatomica & Medica. septem, Genevae  
1681. 8°.

Peyer. anat. ventr. gall. Est in Peyer parerg.

Peyer de gland. Intest. Est in Peyer parerg.

Ridl. Anat. Cereb. & Ridl. The anatomy of  
the brain by H. Ridley, Lond. 1695.  
8°.

Riolan. Anthropol. Joannis Riolani opera A-  
natomica Lutetiis, Paris. 1649. fol.

Ruyfch. Epist. Ruyfch. Ep. resp. Ruyfch. ep. Fre-  
derici Ruyfch epistolae problematicae, Am-  
stelaed. 1696. 4°. numeris distinctae.

Ruyfch obsl. Frederici Ruyfchii observatio-  
num anatomico-chirurgicarum Centuria,  
Amstelaed. 1691. 4°.

Ruyfch Th. Frederici Ruyfch Thesauri ana-  
tomici per numeros successivos distincti,  
Amstelaed. 1701. &c. 4°.

Schneider de Catharr. Conradus Victor Schnei-  
derus de Catharris, Witteberg. 1661. 2  
vol. 4°.

Spigel.

Spigel. Adriani Spigeli opera omnia, Amstelaedami 1945. folio.

Sten. obs. Nicolai Stenonis observationes Anatomicae, Lugduni Bat. 1680. 12°.

Sten. spec. myol. Nicolai Stenonis Elementorum myologiae specimen, Florent. 1667. 4°.

Strabo. Parisiis 1620. folio.

Tulp. Observ. Nicolai Tulpii observationes Medicae, Amstelaedami 1672. 8°.

Valsalv. de aure. De aure humanâ tractatus auctore Antonio Maria Valsalvâ, Bonon. 1704. 4°.

Verheyen. Philippi Verheyen corporis humani anatomia, Bruxellis 1710. 4°.

Vesal. Andreas Vesalius de humani corporis fabricâ, Basil. 1543. folio. In citando hoc Anatomicorum Principe numerus primus libri seriem, alter caput notat, F. figuram indicat. L. verô litteram in figurâ.

Vieuſſ Neur. Raymundi Vieuſſiens Neurographia universalis, Lugd. in Gall. 1685. folio.

Vieuſſ. de remot. & prox. mixt. princ. Raymundi Vieuſſiens tractatus duo de remotis & proximis mixti principiis &c. Lugd. in Gall. 1688. fol.

Vieuſſ. vas. syst. Raymundi Vieuſſiens novum vasorum corporis humani systema, Amstelaedami 1705.

Vieuſſ. nov. invent. de Corde. Raymundi Vieuſſiens

sens nouvelle decouverte touchant le coeur,  
&c.

Vicuss. Intellige Vicuss. Neur.

Wepfer. Cic. Aquat. Cicutae aquaticae histo-  
ria & noxae. Auctore Johanne Jacobo Wep-  
fero, Basil. 1679. 4°.

Wharton adenogr. Adenographia auctore Tho-  
mâ Wharton, Amstelaedami 1669. 12°.

Will. Pharm. Pharmaceutice rationalis au-  
ctore Thomâ Willis, Oxonii 1679. 8°.

Will. Cereb. & Will. & Will. de nerv. Cerebri  
anatomy, cui accessit nervorum descriptio  
& usus. Studio Thomae Willis, Londini  
1664. 4°.



# I N D E X

Quinque Partium INSTITUTIONES  
MEDICAS componentium.

1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ seu ΟΕ-  
CONOMIA ANIMA-  
LIS. Pag. 12.

2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. pag. 284.

3. ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ. pag. 344.

4. ΥΓΙΕΙΝΗ. pag. 385.

5. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ. pag. 397.  
IN,

# INDEX CAPITUM.

## PROLEGOMENA.

*Origo, Progressus, Fata Medicinæ. pag. 1*

*Principia & Partes Medicinæ. pag. 6*

---

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. pag. 12

*Manducatio Ciborum. pag. 17*

*Salivæ Ortus, Natura, Admistiō. pag. 23*

*Actio Ventriculi in Ingesta. pag. 29*

*Actio Intestinorum in Ingesta. pag. 36*

*De Actiōe Bilis utriusque. pag. 39*

*De Actiōe Lymphæ Pancreaticæ. pag. 40*

*Propulsio Chyli in Vasa Lactea pag. 42*

*Fœcis Intestinalis Materia & Expulsio. pag. 45*

*Mesenterii Actio in Chylum. pag. 47.*

*Actio Glandularum Meseraicarum. pag. 49.*

*Ductus Chyliferi Actio in Chylum. pag. 50*

*De Fabricâ Arteriæ & Venæ. pag. 54.*

*De Circulatione Sanguinis. pag. 56*

*Cordis Fabrica, Vis, Actio. pag. 67*

*Pulmonis Fabrica, Vis, Actio. pag. 72*

*Arteriæ Vis, & Actio, in Humores. pag. 79*

*Sanguinis Natura, Partes, Phenomena. pag. 83.*

*Arteriarum ad Cerebrum, & Cerebellum euntium Indoles, & Vis. pag. 85*

*Cortex Cerebri. pag. 89.*

*Glandularum fabrica, diversitas, vis, p. 91. ad 99.*

*Actio Lienis. pag. 120*

*Actio Omenti. pag. 127*

*Actio Hepatis. pag. 131*

*Actio Renum. pag. 138*

*Vesicæ Urinaria Actio. pag. 143*

*Mu-*

<i>Musculorum Actio.</i>	pag. 148
<i>Functio Cutis.</i>	pag. 162
<i>Sudoris Excretio.</i>	pag. 165
<i>Sanctoriana Perspiratio.</i>	pag. 166
<i>Nutritio, Incrementum, Decrementum.</i>	pag. 168
<i>De Tactu.</i>	pag. 178
<i>De Gustu.</i>	pag. 180
<i>De Olfactu.</i>	pag. 182
<i>De Visu.</i>	pag. 188
<i>De Auditu.</i>	pag. 207
<i>De Sensibus Internis.</i>	pag. 220
<i>De Vigiliâ.</i>	pag. 225
<i>De Somno.</i>	pag. 226
<i>De Respiratione.</i>	pag. 233
<i>De Voce, Loquelâ, Cantu, Risu, Tussi. &amp;c.</i>	p. 246
<i>Seminis Masculini Ortus. &amp;c.</i>	pag. 251
<i>De Menstruis.</i>	pag. 262
<i>De Conceptu.</i>	pag. 266

---

## ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ.

<i>Morbi Natura.</i>	pag. 284
<i>Morborum Differentiæ.</i>	pag. 286
<i>Morbi similes.</i>	pag. 287
<i>Morbi Organici.</i>	pag. 288
<i>Humorum Morbi.</i>	pag. 292.
<i>Αἰτιολογία Παθολογικῆς.</i>	pag. 298
<i>Συμπτώματα Παθολογίας.</i>	pag. 319

---

## ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ.

<i>Σημειωτικῆς Generalia.</i>	pag. 344.
<i>Signa Generalia Sanitatis Optima.</i>	pag. 347
<i>Signa</i>	

*Signa Sanitatis Singularis. pag. 350*

*Signa Morborum. pag. 353*

*De Pulsu Arteriae ut Signo. pag. 371*

*De Respiratione ut Signo. pag. 374*

*De Urinâ ut Signo. pag. 378*

---

**ΥΓΙΕΙΝΗ.** pag. 385

*Prophylaxis. pag. 391*

*Diata ad Longevitatem. pag. 393*

---

**ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ.** pag. 397

*Methodus Medendi. pag. 399*

*Indicatio Vitalis. pag. 402*

*Cardiaca, & Diata Aegroti. pag. 403*

*Προφύλαξις Θεραπευτικῇ pag. 413*

*Indicatio Curatoria in Morbis Solidi. pag. 427*

*Indicatio Curatoria in Morbis corrigens Fluida.*

*pag. 429*

*Indicatio Curatoria in Fluidis Evacuans. p. 439*

*Sudorifera. pag. 439*

*Apoplegmatisantia. pag. 442*

*Sialogoga. pag. 444*

*Emetica. pag. 446*

*Purgantia. pag. 448*

*Diuretica. pag. 451*


*Menagoga & Aristolochica. pag. 453*

*Phlebotome. pag. 454*

*Cyratio Palliativa. pag. 459*

# HERMANNI BOERHAAVE ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

## ORIGO, PROGRESSUS, FACTA, MEDICINAE.

1. ui actiones homini proprias exercere valet cum facilitate, oblectamento, & quadam constantia, Sanus habetur; atque haec ejus conditio Sanitas solet appellari.

2. Si verò easdem aut exercere nequit; aut tantum eas peragit cum molestia, dolore, citàque defatigatione, Ægrotare Idem dicitur; ipseque hic Ejus status Morbus vocari consuevit.

3. Injuriae autem, & vicissitudines inevitabiles, & necessarij semper, Aëris; Alimenti natura, & Potulenti; Corporum irruentium vis; Actiones vitae; fabrica denique compagis humanae; effecerunt coevas Mortalibus aegritudines (2), quamdiu eâ, quâ Nos, lege vitam egerunt.

4. Morbi (2) quidem praesentia impulsu automatico cogit corpus ipsum ad applicationem auxilii, coëterum ignoti: Id observat attenta contemplatio fieri in Hominibus

pariter, & in Brutis; licet ratio modum assequatur neutiquam.

5. Ipsa verò molesta perceptio impediti in membris quibusdam motus; aut tormentum doloris laesam quamcunque partem exagitantis, impulit mentem, ut quaerat, & applicet, apta his tollendis Remedia, sive vago experimento, sive appetitu spontaneo, utatur.

6. Hinc (4. 5.) Ars Medendi primò nata; atque ea quidem, sensu explicato (4. 5.), semper, & ubique, fuit inter homines.

7. Historiae autem priscae monumenta, & Fabulae, Nos docent, <sup>a</sup> Assyriis, Babylonis, Chaldaeis, & Magis, primò ità fuisse excultam, ut praesentes morbos tollere, futuros avertere, intenderint. Hinc in <sup>b</sup> Aegyptum, <sup>c</sup> Lybiam Cyrenaicam, & Crotonem migrasse, ex his in <sup>d</sup> Graeciam derivatam, floruisse inprimis, in Cnido, Rhodo, Co, insulis, & Epidauri.

8. Prima condendae Arti fundamenta jecit

<sup>a</sup> Herodot. i. 197. Strabo xvi. pag. 746. Plin. vii, 36. & xxx. 15. Euseb. praep. i. 10.

<sup>b</sup> Homer. Odyss. iv. pag. 46. 47. Herod. iii. 129. 130. 131. & Herod. ii. 77. 84. Herod. iii. i. Diod. Sic. i. 43.

<sup>c</sup> Herod. iii. 129. 130.

<sup>d</sup> Herod. ii. 49. Hippocrat. Epist. ad Philopoemon. in fine, & Epist. ad Crateum in fine. Galen. Method. Med. lib. i. Pausan. ii. 27. Strabo xiv. pag. 637. Soran. in vitâ Hippocr.

cit 1. Casus fortuitus ; 2. naturalis Instinctus ; atque 3. Eventus haud praevisus.

9. Incrementum deinde dabat 1. memoria experimentorum , quae obtulerant praegressa (8.) ; 2. descriptio morbi, remedii, & successus <sup>a</sup> in columnis , <sup>b</sup> tabulis , & parietibus , templorum ; 3. <sup>c</sup> Aegrorum in triuiis , & in foro , expositio , ut transeuntes de morbo compellarent , remedia , si nōrant , aperirent , atque ad usum eorum exhortarentur ; 4. ratiocinium ex comparatione observatorum cum praesentibus & futuris ; quae *ἀναλογία* appellatur.

10. Major deinde accessit Arti perfectio 1. <sup>d</sup> constitutione Medicorum , tam ad morbos quosvis , quam ad certos quosdam , curandos. 2. <sup>e</sup> annotatione accuratâ morborum ; 3. observatione , & descriptione , exactâ , remedii , & usus ejus. Verum tum statim quibusdam familiis , & Sacerdotibus , propria facta & gentilitia , honori fuit , & emolumento ; sed tamen eo ipso quam maximê in suo progressu impedita.

11. 1. Extispicia Sacerdotum ; 2. Cada-  
verum balsamo condiendorum mos ; 3. La-

A 2 niena

<sup>a</sup> Pausanias l. 2. C. 27.

<sup>b</sup> Strabo l. 14. pag. 657. Edit. Paris. 1620.

<sup>c</sup> Strabo l. 16. pag. 746. Herod. l. 1. C. 197.

<sup>d</sup> Aristoteles Politic. 3. C. 15. Diodor. Sic. l. 1. C. 82.  
Herod. l. 2. C. 84.

<sup>e</sup> Hippocr. l. 1. de vict. acutor,

niena ipsa, promoverunt cognitionem fabricae corporis sani, causarumque abditarum, & proximarum tam sanitatis, morbiq̃ue, quam ipsius mortis.

12. Denique, 1. <sup>a</sup> incisio vivorum animalium in usus Philosophicos; 2. <sup>b</sup> enarratio in morbis distincta causae, ortus, incrementi, vigoris, decrementi, exitus, permutationis, effectuum; 3. <sup>c</sup> Medicamentorum cognitio, electio, praeparatio, applicatio, vis nota, eventusque observati, videbantur fastigium fere imposuisse operi.

13. Hippocrates verò, Democrito coaetaneus, horum quidem omnium (7. usque ad 13.) pulchrè gnarus, suisque simul sapiens observatis, bona quaeque adunando Corpus Medicinae Graecae conflavit, meruitque primus veri nomen Medici: quippe qui ἐμπειρία, & ἀναλογία, instructus, castaeque σοφίας peritus, Medicinam omnibus fundavit seculis δόγματι.

14. Quae in gente Asclepiadaeâ illibata diu exulta; ab Aretaeo Cappadoce ordinatius in corpus digesta; in variis partibus, à diversis Artificibus, differenti temporum, & rerum, successu, accuratius elaborata, in <sup>d</sup> A-

lexan-

<sup>a</sup> Hippocr. in litteris ad Damagetum.

<sup>b</sup> Hippocr. l. 1. de dieta acutorum.

<sup>c</sup> Hippocr. in epist. ad Crataeum.

<sup>d</sup> Galen. 2. administr. Cap. ult.



Alexandrinâ praeprimis scholâ ; tandem ad Claudium Galenum pervenit.

15. Qui sparsa colligens , digerens confusa, cunctaque ex Peripateticis dogmatibus, ad servitutis infamiam usque , explicans, emolumenti plurimum, neque minus tamen damni, bonae Arti attulit: dum auctor fuit, ut ex elementis , qualitatibus cardinalibus, harum gradibus , & humoribus quatuor, subtilius, quam verius, explicaretur Medicina.

16. Deletis fere & Artibus , & Harum memoriâ, post sextum seculum , in Europâ ; à nono dein ad decimum tertium, ab Arabibus, in Asiâ, Africâ, & Hispaniâ, Medicina subtilissimè fuit culta: dum, materiem medicam, ejus praeparationes, & Chirurgica, auxêre, atque correxerunt simul ; vitia autem Galenica (15.) magis, quam prius, affricuerunt Arti: sed tamen sequentes fere omnes sequaces habuerunt.

17. Donec emendati, atque refutati sunt binis diversis mediis. Maximè quidem restauratâ in Galliis Hippocraticâ disciplinâ. Deinde quoque experimentis tam Chemicorum, quam Anatomicorum.

18. Usque dum immortalis Harvejus demonstrationibus suis omni Priorum Theoriâ eversâ, novam omninô, & certam, jecit huic basin Scientiae.

19. Inde hodie libera ab omni sectâ colitur; dum promota est per inventa certa, Anatomica, Botanica, Chemica, Physica, Mechanica, & effecta Artis, quae in ipso opere versatur.

Ex quibus denique constat: 1. Antiquissimam Artem solâ collectione fidelis observatorum constituisse. 2. dein verò cogitatum fuisse de causis experimentorum per disputationem rationis indagandis. 3. priorem partem, evidentiam, usu, necessitate, semper eandem, nec fallacem; posteriorem dubiam, mutabilem, ac cuilibet fere Sectae diversam, evasisse.

## PRINCIPIA ET PARTES, MEDICINAE.

20. **E**x eo autem capite (2. & 3. 19.) inutilia, & fallacia, plurima accepit haec Scientia, quae ut expellantur, considerandum omnem scopum Artis esse evitacionem doloris, debilitatis, mortis; adeoque conservationem sanitatis praesentis, absentis restitutionem: ideoque quidquid sciendum, & agendum Medico, uni tantum huic proposito inservire debere.

21. Est enim objectum Ejus, Hominis vita, sanitas, morbus, mors; horum causarum, quibus oriuntur; eorundem media, quibus diriguntur.

22. Pro-

22. Proinde est Medicina Scientia eorum, quorum applicatorum effectu, vita sana (1) conservatur, aegra (2) verò in priorem restituitur salubritatem.

23. Cujus itaque Nobilitas, Utilitas, Necessitas, sponte patent.

24. Agnoscuntur autem duo modò firma fundamenta, quibus certa demum nititur; nempe 1. accuratissima observatio eorum phaenomenon, quae in homine sano, aegroto, moriente, mortui cadavere, sensibus externis apparent; sive ea oriantur ab iis, quae in ipso homine, sive ab iis, quae per externas causas, casu, vel Arte, in eum agunt. 2. severa indagatio illorum, quae in homine latent sensibus abscondita, vel quae faciunda sunt in eventum praefixum. Haec autem solâ potest obtineri ratiocinatione exactâ, dum  $\alpha$  data experimenta, (1. hujus.) singulatim perfectè expensa,  $\beta$  in omnibus suis proprietatibus examinantur,  $\gamma$  dein inter se sedulò comparantur, ut convenientia, vel diversitas, patefcat,  $\delta$  tumque prudentissimâ fide notantur ea omnia, quae in iis contineri perspecta clarè inde deduci possunt. Neque verò posteriora haec prioribus minus firma, vel fida, erunt.

25. Ut porrò haec quaesita ex datis inveniantur, principia quaedam requiruntur, quorum notitiâ fiat demonstratio. Quae,

distincta, clara, certa, esse debere ratio ipsa exigit. Talia autem in iis, quae purè corporea in Homine, sunt Mechanica, & experimenta Physica, solà. His enim corporum vires generales, singularesque, tantum innotescunt.

26. Quum verò in homine etiam alia sint, quae per illa principia non queunt intelligi, ideòque per eadem ne quidem demonstrando explicari possunt, alià longe ratione circà haec utendum erit, si errores vitare velimus: id autem facile perspicit, quicumque sequentia, alibi demonstrata, considerat, & ut vera admittit.

27. *α.* Homo constat mente, & corpore, unitis.

*β.* Quorum utrumque naturâ ab altero differt.

*γ.* Adeòque vitam, actiones, passiones, diversas habet.

*δ.* Tamen ita se habent inter se, ut cogitationes mentis singulares determinatis corporis conditionibus semper jungantur, & vicissim.

*ε.* Interim cogitationum aliae ex solâ cogitatione purâ sequuntur, aliae verò tantum ex mutatâ conditione corporis oriuntur.

*ζ.* Contrà quoque exercitationes quaedam quorundam in corpore motuum fiunt sine attentione, conscientiâ, vel imperio animae

ad eas concurrente ut causâ , vel ut conditione : nonnullae autem excitantur , atque determinantur , per actiones mentis praegressas , quamdiu homo sanus est : quaedam denique ex utrisque his concretae observantur.

γ. In homine quidquid cogitationem involvit , soli id Menti , ut principio , adscribendum.

θ. Quod verò extensionem involvit , aut motum , id uni corpori , ejusque motui , ut principio , tribui , per ejus proprietates intelligi , explicari , & demonstrari , debet.

ι. Neque ex perspectâ mentis , vel corporis , naturâ , quatenus ab humanâ intelligentiâ cognita habetur hætenus , intelligitur ratio , quâ agere in se mutuô , vel pati à se mutuô , queant.

κ. Siquidem hæc solâ effectuum observatione itâ constant , ut horum allegatio nihil explicet : quin imô , ubi problema Medicum eôusque solutum , ut restet modô explicandum quomodo fiat hæc relatio (δ.ε.ζ.) satisfactum erit quaesito : quoniam ulterior inquisitio impossibilis , & illa solutio Medico sufficiet.

28. Ultimae quoque Metaphysicae , & primae Physicae , causae , Medico investigatu , necessariae , utiles , vel possibiles , non sunt. Ut erant elementa , formae pri-

10      PRINCIPIA ET PARTES,  
mac, feminum, & motus, origo. &c.

29. Assumere autem licet, & prodest, omnia verè demonstrata, in Anatomicis, Chemiâ, Mechanice, atque in Phycis, quoad simplicem factorum eventum. (vid. 25.)

30. Tum oportet incipere à simplicissimis, cognitu facillimis, atque certissimis; à quibus deinde pergendum ad ea semper, quae proximo gradu harum conditionum praegressa attingunt; atque ita accuratè progrediendum, ad composita, obscura, difficilia.

31. Docenti autem procedendum à generalibus ad singularia quaecque, dum inventa explicat; ut Inventori contrâ a singularibus ad generalia eundum fuit.

32. Ex quibus omnibus ordo doctrinae liquet: erit enim primò agendum de Vitâ; deinde Sanitas enarratur; tandem de Morbis; denique de Remediis tractare decet.

33. Itaque prima totius generalis Doctrinae Medicae, quae Institutiones Medicae appellantur, pars explicat Humani corporis

1. Partes, fabricam.

2. Vitam.

3. Sanitatem.

4. Effecta, quae ex his sequuntur.

Vocatur *φυσιολογική, οἰκονομία* humana, doctrina de usu partium.

Objecta verò hujus partis modò enumera-

ta appellari solent Res Naturales, vel Res secundum naturam.

34. Altera pars enarrat corporis humani viventis

1. Morbos.
2. Morborum differentias.
3. Eorum causas.
4. Effecta.

Dicitur παθολογική, quatenus morbos declarat; αἰτιολογία παθολογική, dum causas tractat; παθολογία, vel νοσολογία, quando agit de differentiis eorundem; συμπίωματολογία denique, quoties effecta morborum exponit.

Objecta iterum hujus partis vocantur Res praeter Naturam, aut contrà eam.

35. Tertia deinde docet

1. Quatenam sint signa.
2. Quomodò revocentur in usum.

Ut in corpore sano, & in aegro, cognoscamus, an, quis, qualis, sit, fuerit, erit, gradus, ordo, effectus, vel sanitatis, vel morbi.

Designatur nomine σημειωτική.

Objecta autem hujus sunt Res naturales, non-naturales, praeternaturales.

36. Indicat quarta

1. Remedia.
2. Usus.

Quibus Vita & Sanitas conservari queant. Unde nominatur ὑγιαίνη.

Et

Et pro objectis habet Res non naturales dictas inprimis.

37. Quinta denique instruit

1. Materiem Medicam.

2. Ejus praeparationem.

3. Modum utendi.

Ut salus restituatur, morbi tollantur.

Dicitur *θεραπευτική*, complectens *διαιτητική*, *φαρμακωτική*, *χειρουργική*, *μεθόδον* *ὑγιαίνουσαν*.

38. Quum ergò docenti, discentique, commoda, & naturae rei congrua, sit haec distributio Artis, eam & sequemur ut normam dicendorum.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.

39. **C**orpus humanum conflatur ex fluidis, & firmis. docet Anatome.

40. Firma sunt, aut vasa coërcentia humores, aut instrumenta sic facta, figurata, & connexa, ut ex singulari hâc fabricâ determinati quidam motus exerceri queant, si causa movens accedit. Deprehenduntur enim ibidem, fulcimenta, columnae, trabes, propugnacula, hypomochlia, cunei, vectes, trochleae determinantes, funes, praela, folles, cribra, filtra, canales, receptacula. Facultas exercendi hos motus Functio dicitur; quae lege mechanicâ fit, & per eam tantum explicari potest.



41. Fluidae verò partes intrà firmas continentur, moventur, in motu determinantur, miscentur, separantur, mutantur, vasa cum nexis instrumentis movent, horum parietes atterunt, mutant, restituunt. fiunt hae actiones juxtà leges hygrostaticas, hydraulicas, & mechanicas, ideòque & juxtà has ultimò exponi debent: ita tamen ut accuratissima primò ratio habeatur uniuscujusque humoris, & actionis ejus, prout per omne genus experimentorum innotescere potest.

42. Vitae Humanae nomine, hîc loci, sensu pervulgato, intelligo eam Corporis, quoad firma, & fluida, conditionem, quae omninò requiritur, ut commercium mutuum inter mentem & corpus duret quodam modo, aut queat restitui utcunque, nec necesse sit id omninò tolli. Non enim hîc Vitae veram definitionem dare adhuc licet. Ut neque clariorem in his initiis ideam Sanitatis effingere possim, quam est data (1.)

43. Ut autem sciatur accuratè, quid requiratur in corpore, ut haec ambo (42.) adsint; 1. colligenda curiosè cuncta phaenomena Vitae, & Sanitatis; 2. inquirenda subjecta, in quibus haec; 3. indagandae causae, à quibus; 4. instrumenta, per quae, fiant; 5. effectusque, quos iterum producant.

44. Quum

44. Quum verò ipsa haec fere innumera-  
bilia sint, ratio doctrinae jubet ea revoca-  
re ad quaedam capita, ut ordinatè tractetur  
singulatim de singulis.

45. Incipiendum quidem à corporeis (30.);  
sed haec, vel communia sunt Mari & Foe-  
minae, vel propria alterutri; ideòque de  
prioribus primò tractandum erit.

46. Quae iterum, vel in adulto, vel in  
eo, quod fieri incipit, corpore spectari pos-  
sunt; sed tamen de priori iterum prius a-  
gendum (30.)

47. Verum omnia illa ita cohaerent inter  
se (43. 44. 45. 46.) ut, quasi in orbem eun-  
do, mutuas causae & effectuum vices agant;  
unde inevitabilis difficultas est in reperiundo  
ordine, qui non peccet in leges bonae me-  
thodi.

48. Optimus tamen videtur, qui ab ali-  
mentis assumendis incipiens, per successivas  
horum in corpore mutationes pergit, donec  
desinat ubi haec corpus ipsum faciunt, &  
actiones ejusdem: quum enim ex his as-  
sumtis, sensu prius exploratis, & assidue  
permutatis, constet corpus, & per eadem  
agat, clarum est illud hoc modo facillimè  
posse cognosci.

49. Sunt igitur, vel solida, vel liquida, ad-  
eòque esculenta, vel potulenta. Quorum ma-  
teries primaevis aqua, & ea, quae sponte dabit,  
terra.

terra. ut historia *a* sacra, *b* profana, *c* fabularis, & ipsa rei natura, docet: deinde demum humores quosdam animalium, & alias quasdam horum partes, unâ cum esculentis terrâ natis, praeparavere, & usurpaverunt.

50. Interim *d* multi solis vegetabilibus, & aquâ, ab antiquissimis temporibus usque in hodiernum diem usi in sustentaculum vitae, imò integrae nationes his contentae vixere; *e* solo gramine & foeno vixisse visus est homo; *f* alii solis fere sustentati piscibus; *g* carnibus & lacte alii; dum alii omne ferme vegetantium, piscium, reptilium, volatilium, genus, mensis adhibent; quod luxus, & ingluvies, ut *b* olim, sic hodie, docet.

51. Itaque singulis horum (49. 50) seorsum, vel commistis simul, crudis, aut praeparatis, utens homo vivit, viget, veget, reficitur. Nec tamen varietas assumptorum magnam differentiam nutrito corpori adfert in materiê, vel in actionibus. Quare est in homine sano facultas, quae ex tam diversis,

*a* Genes. 1. 29. 11. 16. confer 1x. 3.

*b* Herod. 1. 71.

*c* Apud Poëtas in fabulis Cereris & Triptolemi.

*d* Herod. 1. 202. 1v. 177. 185.

*e* Tulp. observ. 1v. 10.

*f* Herodot. 1. 200. & 202. 11. 92. 1v. 183.

*g* Herod. 1. 216. 111. 23.

*b* Petron. in Satyric.

sis, mutando, constituere humanum corpus possit.

52. Docet nihilominus rerum usus, mutationem hanc (51.) feliciter absolvi pro varietate assumti, vel pro diversitate praeparationis, quâ haec mutata fuere antequam corpori ingererentur.

53. Inde cerealia matura, mundata, triata, cum aquâ subacta, fermentata, cocta per ignem, aptiora sunt vitae sanae conservandae. Animalium verò partes mundatas tundendo, Aëri exponendo, coquendo, assando, frixando, condiendo, in meliores usus experientia redegit.

54. Sal, Acetum, Aroma, praecipuum dedere condimentorum materiem.

55. Fructuum quidem horaceorum, si maturi, ea est, ut solvantur facile, mollities, quae vix ullâ praeparatione egeat.

56. Potus autem, si aqua pura, & cursu exercita, crudus optimus; si aqua infectis & horum ovis inquinata, coctione levissimâ, & quiete brevi, optima redditur. Potus verò ex Cerealibus, aut fructibus, cum aqua coctis, intelligitur facile. Ut & ille, qui ex Cerealibus mundatis, humectando, in initia vegetationis fuscitando, mox siccando, terendo, infundendo in aquâ, deinde coquendo, fermentando, depurando denique conficitur, atque Cerevisia nominatur.

Nec

Nec obscura ratio tandem & illius, qui ex maturis horaeis pressis, fermentatisque, & depuratis, adeo laudatur, & expetitur, celebri nomine Vini.

57. Quarum praeparationum (53. 54. 55. 56.) omnium effectu, assumendis conciliatur, attenuatio, mistio, dilutio, lubricitas, fluiditas, liquidioris à crasso secretio, adeoque facilius in corpore humano subactio, separatio, excretio.

## MANDUCATIO CIBORUM:

58. **C**ibi (49. 50. 51.), quidam sic (57.) mutati, in ore alias subeunt permutationes, quae 1. morfu, 2. masticatione, 3. salivae, muci, & aëris, permistione, constant.

59. Morfus requirit 1. <sup>a</sup> maxillae inferioris à <sup>b</sup> superiore versus pectus abductionem, suprâ <sup>c</sup> condyliformem processum, <sup>d</sup> tuberculo ossis temporum ope ligamenti, & interposito <sup>e</sup> lamellae cartilagineae, articulatam, 2. dein iterum fortem ejus contrâ maxillam superiorem compressionem, ut intercepti dentibus cibi conscindi queant.

B

60. Prior

<sup>a</sup> Vesal. 1. 10. F. 1. 2. & 5. F. omnes.

<sup>b</sup> Vesal. 1. 9. F. 1. 2.

<sup>c</sup> Vesal. 1. 10. F. 1. 2. l. A.

<sup>d</sup> Vesal. 1. 6. F. 5. ante l. h.

<sup>e</sup> Vesal. 1. 10. in textu pag. 44.

60. Prior actio (59. 1.) fit contractione *a* musculorum biventrium, qui carnei oriuntur ex *b* fossulâ basi processus mastoïdis insculptâ, descendentes tendinem faciunt, quo per musculus stylohyoïdeum & ligamentum annulare lateri ossis hyoïdis adnatum transeunt, inde iterum carnosi fiunt, atque ab ipso osse hyoïde fibris carneis instructi, adscendunt usque ad *c* internam, mediam, inferiorem, partem menti, ibique inferuntur, infimi omnium hic affixorum, hocque mechanismo, vis, & directio, horum musculorum intelliguntur, non sine maximâ mirabilitate artificiosae fabricae.

61. Posterior verò (59. 2.) efficitur contractione Musculorum *d* Temporalium, qui largâ, semicirculari, carneâ, origine ex cavo ossi frontis, verticis, sphenoïde, temporali, insculpto, fibris concurrentibus sub osse jugali uniti, fibris ab eo acceptis roborati & determinati, circumnascuntur tendinosi facti, partimque adhuc carnei, circumquâque *e* processui coronoidi maxillae inferioris; *f* Masseterum, qui carnei, crassique oriuntur à primo osse maxillae inferioris & ab osse jugali, hinc

*a* Casser. de voc. organ. p. 15. T. 1. F. 1. Litt. BCB FD.

*b* Vesal. 1. 6. F. 5. inter k & m.

*c* Vesal. 1. 10. F. 2. l. H.

*d* Vesal. 11. T. 2. l. A. T. 4. l. B. F. T. 5. l. B.

*e* Vesal. 1. 10. F. 2. l. C.

*f* Vesal. 2. T. 5. l. CD.

hinc fibris decussantibus se mutuô inferuntur inferiori, exteriori, margini maxillae inferioris ab angulo versus mentum per spatium quatuor fere digitorum; <sup>a</sup> Pterygoideorum externorum, qui oriuntur ab externâ parte alae exterioris processus pterygoïdis in osse sphenoïde, & à parte superiori ibidem ossis sphenoïdis, progressi retrò, inferuntur forti tendine in spatio semilunari, fito in internâ parte maxillae inferioris inter condyloïden & coronoiden processum; <sup>b</sup> Pterygoideorum internorum, qui carnei & tendinosi oriuntur ex totâ internâ superficie lamellae externae processus pterygoïdis, progressi descendendo, lato, robusto, tendine affiguntur fossulae paulò suprâ angulum internum maxillae inferioris sub magnis apophysibus. Si enim octo descripti muscoli agunt simul, vi incredibili prematur maxilla inferior contrâ superiorem, dentibusque octo incisoriis sic valide compressis fit Morsus.

62. Dein morsu divisi cibi arctantur inter latas molarium superficies scribeas, ut actionem recipiant attritus. Illa arctatio fit 1<sup>o</sup>. contractione inprimis musculi <sup>c</sup> Buccinatoris,

B 2. ris,

<sup>a</sup> Fallop. Observ. anat. pag. 426. Verhey. T. 29. F. 13. l. C.

<sup>b</sup> Fallop. Obs. an. p. 426. Verhey. T. 29. F. 13. l. D. Cowp. app. ad Bidl. T. 8. F. 35. l. B.

<sup>a</sup>. & <sup>b</sup>. Simul vid. Vesal. 2. T. 6. l. D.

<sup>c</sup> Cowp. App. ad Bidl. T. 8. F. 33. l. K.

ris, qui lato, carneo, principio ortus ab anteriori parte processus coronoidis maxillae inferioris fibris directis haeret gingivis utriusque maxillae, pergens per genas inseritur angulo labiorum; *a* Orbicularis labiorum, qui carneis fibris aperturam oris ambiens & labia, nulli ossi inseritur; *b* Zygomatici, qui ab externâ parte ossis jugalis carneus ortus obliquè descendens inseritur circa angulum labiorum; *c* Elevatoris labiorum communis, qui ab ossè quarto maxillae superioris ad concursum labiorum sub tendine praecedentis (b) suo tendine inseritur, *d* Elevatoris labii superioris proprii, qui ab eodem ossè quarto ortus immediatè suprâ priorem (c) oblique descendens sub cute labii superioris evanescit; *e* Depressore labii inferioris proprii ex anteriori mento ex maxillâ orti, atque labio inferiori inserti; *f* Elevatoris labii inferioris proprii, qui oritur ex anteriori parte gingivae maxillae inferioris circa dentes incisivos, insertus in inferiora cutis menti; *g* denique musculi ope Depressoris labiorum communis, qui carneus oritur ab inferiori margine maxillae

*a* Id. Ib. l. FF.

*b* Id. Ib. l. G.

*c* Id. Ib. l. D.

*d* Id. Ib. l. E. E.

*e* Id. Ib. l. I.

*f* Id. Ib. T. 7. F. 32. l. HH.

*g* Id. Ib. T. 8. F. 33. l. HH.



maxillae inferioris, circa ejus latera, adscendens inferitur angulo labiorum. Si enim hi omnes agunt simul, tum genae, & labia, ita applicantur gingivis & dentibus, ut nil cibi, potusve, cadat intrâ genas & gingivas; si verô successivê, tum determinantur etiam locis variis. 2°. fit eadem arctatio per linguam, musculum maximê in omnia volubilem, atque ad omne punctum oris interni facile mobilem 1°. per musculos *a* Genioglossos, ab internâ parte menti carnosio principio ortos, dilatatos progredientes, & radici linguae insertos; qui linguam in anteriora trahunt, & contrahunt; *b* Ceratoglossos, ortos lato carneo initio à latere ossis hyoïdis, unde adscendentes largo fibrarum ductu dispersos cernimus per linguam; retro agunt eam, deprimunt, explicant; *c* Styloglossos, qui à parte externa processus styloïdis ossis temporum orti acuto & carneo principio obliquo descensu in anteriora se inserunt posticae parti linguae, quam elevant, ad latera trahunt, explicant. 2°. per musculos ipsum linguae corpus constituentes, qui sunt *d* longitudinales linguam breviores reddentes; trans-

B 3

versis

*a* Cowp. Myotom. refor. F. 5. l. DD.

*b* Id. Ib. l. CC.

*c* Id. Ib. l. EE.

*d* Malpig. de ling. F. 2. l. A.

*e* Id. Ib. l. B.

versi linguam arctantes ; <sup>a</sup> perpendiculares linguae crassitiem minuentes ; <sup>b</sup> alii ejus dorsum , & latera , trahentes ; <sup>c</sup> angulosi linguam intrô trahentes ; <sup>d</sup> alii acuminatum dorsum deprimentes ; <sup>e</sup> recti basin linguae comprimentes. Omnibus his , seorsum , vel junctim variè , agentibus , facilè explicantur linguae ad hanc cibi inter molares , potus versus fauces & cibi , determinationem ; accedente inprimis actione *f* fibrarum extrâ linguam in musculos externos emissarum , quae cum iis simul agit.

63. Quin sponte liquet successivo musculorum maxillam moventium (60. 61.) motu, aperiente, premente, antrorsum (61. a. pag. 19.), ad latera (61. e.), retrorsum (61. d. f.), cibos musculis genarum, labiorum, linguae, intrâ mandibularum dentes deductos, ablatosque, atteri.

64. Quo quidem motu cibus accidunt 1. similes mutationes, ac (57.) jam explicatae. 2. aliae mutationes ab admistu salivae & muci palatini ac faucium 3. denique aliae ab aëre simul intermixto.

SA-

<sup>a</sup> Id. Ib. l. C.

<sup>b</sup> Id. Ib. l. E.

<sup>c</sup> Id. Ib. l. G.

<sup>d</sup> Id. Id. l. H.

<sup>e</sup> Id. Ib. l. L.

<sup>f</sup> Id. Ib. l. F.

## SALIVAE ORTUS, NATU- RA, ADMISTIO.

65. **N**amque 1<sup>o.</sup> <sup>a</sup> ad radicem auriculæ, in foveâ inter processum mammillarem, condyloïden, & os jugale, factâ haeret parotis conglomerata conglobatam sinu complexa, inde latè extensa ad anteriora, inferiora, posteriora; haec ab arterioso cruore fabricâ suâ salivam fecernit, communi ductui infundit, qui circâ tertium molarem superiorem eam in os affundit perforans Buccinatorem, <sup>b</sup> 2. intrâ maxillam haeret maxillaris interna, ingens, lato ortu totam fere maxillae longitudinem emensa, salivam ab eodem arterioso sanguine separat, in ductum excretorium à posteriori ejus parte ortum immittit, ad anteriora fere usque ad dentes incisivos anteriores progressum, medio itinere ex reliquo progressu glandulae ejusdem & illam salivam per ramos laterales accipientem, eamque effundentem per duo emissaria sub anteriori linguâ posita. 3. <sup>c</sup> sunt sublinguales Rivinianae, vel Bartholinianae, B 4 forte

<sup>a</sup> Steno Observat. de gland. 1660. Nuck. Sialograph. 8.9.10. Tab. 1. Fig. 2. Valsalv. de aure T. 1. F. 1. I. L. I. I. M. M. N.

<sup>b</sup> Wharthon Adenogr. p. 113. Nuck. Sialogr. 8. Tab. 1. Fig. 1.

<sup>c</sup> Barthol. Act. Phil. Angl. 164. 749. Nuck. Sialogr. 13. 14. 15. Tab. 1. Fig. 4. Tab. 2. Fig. 1.

forte prioris (2.) soboles, simili osculo patientes sub linguâ, eodem loco. 4. lingua, palatum, gingivae, labia, exiguis emissariis perforantur, per quae tenuior longê, sed similis, humor extillat. 5. <sup>a</sup> palati anterioris, maximê verô posterioris penduli, tum Uvulae, <sup>b</sup> tonsillarumque, glandulae mukum separant, eructant, cibis permiscendum praebent. Sunt autem hi fontes, & emissaria, sic sita, ut motu manducationis & loquelae, imprimis humores suos profundant. <sup>c</sup> An in homine alia salivae glandula, & ductus?

66. Est saliva humor dilutus; pellucidus; igne non concreescens; saporis, odorisque fere expers; conquassatus tenaciter spumescens; glandulosus, à puro arterioso cruore secretus; esurienti copiosior, fluidior, acrior; diu jejulantibus valde acris, penetrans, detergens, resolvens; vegetantibus farinosis, succulentisve, & syrupis, fermentationem concilians, augens; Brutis, Hominibus sanis, dormientibusve, deglutitur; exspuitione voluntariâ nimis secreta *ἀνορεξίαν*, *δυσρεψίαν*, *ἀπνοφίαν*, creat; aqua, spiritibus, salis copiosis, constat; sed & oleo & sale pauco in saponem simul coactis paucis admodum conflatur.

67. Hoc

<sup>a</sup> Schneider de Catharr. l. 3. c. 2. C. 111. Fig. 2. 3. 4.

<sup>b</sup> Nuck. Sialogr. 57. 58.

<sup>c</sup> Nuck. Sialogr. §1. ad 23. Tab. 3. Fig. 4. 3. 2. 1.

67. Hoc ergo motu masticationis (58. ad 64.) attenuatis cibis saliva expressa, accuratèque permista facit 1. ad inducendam similitudinem corporis nutriendi, 2. miscelam oleosi cum aquosis, 3. solutionem salini, 4. fermentationem, 5. mutationem saporis, odorisque, 6. excitationem motus intestini, 7. refectio- nem momentaneam, 8. applicationem sapi- di, quum sit insipida ipsa.

68. Ideoque ex purissimo humore, mira- bili artificio, tali loco, elaborata, & ad- mista cibo, male rejicitur; sed deglutita, muneribus suis functa, novo circuitu emen- data, resurgit melior. Nec morbi, reme- dia, aut crises, aliud hinc indicant.

69. Interim eadem ope aëre, cibis, sa- livâ, muco palatino, intimè mistis, & in- viscatis simul; pondere prioris, fluiditate, & elasticitate, calore corporis, & variatâ omni momento pressione, fit attenuatio, fluxilitatis productio, motus intestini indu- cti continuatio, in totâ hâc massâ.

70. Mansi, subacti, permisti, attenuati, humidi, lubricati, cibi protruduntur versus fauces, dum musculis genarum, & labio- rum (62. 1.) coerciti, motuque linguae si- mul ejus dorso explicato impositi (62. 2.) inter hoc & palatum fornicatum, sulcisque ad fauces pressa determinantibus ornatum,

B 5

pre-

premuntur, dum Genioglossi, dorsi longitudinales, Styloglossi, Ceratoglossi, successivo motu, agunt, cavum ad radicem linguae sub <sup>a</sup> velo palatino, uvulâ, tonsillis, suprâ laryngem, pharyngem, & ante membranas corpora vertebrarum colli succingentes, formant, coque deglutienda deducunt (62. 2.).

71. Tum actione Genioglossi (62. 2.); <sup>b</sup> Geniohyoidei, qui ab interno mento, sub Genioglossis ortus, affigitur circâ articulationem parvorum cornuum cartilagineorum ossi hyoïdi; <sup>c</sup> Mylohyoidei, qui largo tendine à mediâ parte basios ossis hyoïdis ortus largâ iterum aponeurosi affigitur mandibulae inferiori juxtâ dentes molares usque ad anteriora ejus, occupans id spatii quod inter os hyoïdes, & latera interiora maxillae inferioris, interjacet; <sup>d</sup> Styloceratohyoidei, qui acuto, carneo, principio à processu Styli-formi ossis temporum ortus, obliquè descendens antrorsum, penetratus à digastrico (60.), inseritur articulationi cornu majoris cum ossè hyoïde; linguae radix explicatur, elevatur, velo palatino applicatur, foramen narium eo clauditur, simul os hyoïdes, & larynx

<sup>a</sup> Id. Ib. l. BCB. & Cowp. App. ad Bidl. T. 4. F. 8.  
l. abcde.

<sup>b</sup> Casser. voc. org. 15. T. 1. F. 11. l. BB.

<sup>c</sup> Casser. ibid. 15. T. 1. F. 1. l. EEEE.

<sup>d</sup> Casser. ibid. 15. T. 1. F. 1. l. DED.

larynx ope contracti <sup>a</sup> Thyrohyoidei, qui carneus ab latere ossis hyoïdis ortus, descendens parti inferiori cartilaginis scutiformis affigitur, elevantur, deglutienda pressa hinc epiglottidem claudunt, uvulam rimae glottidis applicant, mucum lubricum velo, tonsillis, uvulae, radici linguae, epiglottidi, glandulis ejus, expressum, deglutiendo circumapplicant, quin simul radicem linguae, os hyoides, laryngem, antrorsum movent, sic pharyngem aperiunt, contractis simul <sup>b</sup> pharyngeis, laxato <sup>c</sup> oesophageo, itaque eô deglutienda premunt. Sed & eodem tempore <sup>d</sup> musculi Gargareonis externi, interni-que, palati velum elevant, omnimodo explicant, uvulam moderantur, sic lapsum deglutiendi in glottidem, eructationem per nares, impediunt.

72. Deinde laxantur omnes contracti (71.); agunt <sup>e</sup> Sternohyoideus uterque; qui ab internâ claviculae parte juxtâ sternum lato, carneo, principio, ascendens inferitur basi ossis hyoïdis antèrius; <sup>f</sup> Cora-  
coco-

<sup>a</sup> Aquapend. de Laryng. F. 23. n. F. 34. N.

<sup>b</sup> Valsalv. de aur. T. iv. F. 11. l. l. L. M. N. n. O. Cowp. app. ad Bidl. T. 9. F. 38. l. B B. D D.

<sup>c</sup> Cowp. app. ad Bidl. T. 9. F. 38. l. E. E.

<sup>d</sup> Fallop. observ. p. 428. Riolan. Anthropog. l. 5. c. 11. Valsalv. de aure T. iv. l. m. m. n. n.

<sup>e</sup> Cass. org. voc. T. 1. F. 1. l. K. K. F. 11. l. II.

<sup>f</sup> Cass. org. voc. T. 1. F. 1. l. Qr. Qr.

## 28 SALIVAE ORTUS NATURA, ADMISTIO.

coceratohyoïdeus uterque ; qui rotundo , carneo , principio à superiori costâ scapulae ad radicem processus coracoïdis , progressu biventer factus affigitur anteriori parti ossis hyoïdis. Sic clauditur pharynx , simulque stringitur <sup>a</sup> oesophageus , ab utroque latere cartilaginis scutiformis ortus , inque mediam lineam posticam gulae utrimque concurrens , sicque deglutienda vi pressâ haerent in cavo oesophagi sub pharynge.

73. <sup>b</sup> Qui tubus diversis membranis sibi mutuô incumbentibus constans , ope primae villosae , cavitatem internam facientis , liquorem salivâ pinguiorem , lentiolemque , assiduê stillat , quo lubricam deglutendis viam , fibrisque suis flexilitatem commodam , praebeat , & munimentum. Secunda , ubi priori est incumbens , glandulosa , succum descriptum facit , per emissaria in cavum tubi expromit , & averâ parte vasis ad glandulas has tendentibus constat. Ambit hanc musculosa fibris orbicularibus , quae iterum longitudinalibus cinguntur. Atque tandem involvuntur omnes tenui , fibrosa , & vasculosa , membranâ.

74. Contractis ergo longitudinalibus , & orbicularibus , fibris , deglutita lubrica , per viam pinguem , & sub deglutiendo bolo dilata-

<sup>a</sup> Cowp. app. ad Bidl. T. 9. F. 38. l. E. E.

<sup>b</sup> Verhey. T. 23. F. 4. 5.



latatam, protruduntur per laxatum, & apertum, os Ventriculi in eundem.

75. Quô ubi descenderunt, <sup>a</sup> caro superior musculi inferioris diaphragmatis, gulam ibi transeuntem stringens, Ventriculum hâc parte claudit.

## ACTIO VENTRICULI IN INGESTA.

76. **C**ibi, & potus, deglutiti, stomacho clauso, calidoque, excepti, diluti, aëre commisti, sponte, in hoc loco, pro diversitate materiae, fermentescere inciperent vel putrescere, utroque verô modo mirê mutari, vel in acescentem, vel in alcalescentem, vel in rancidam, massam.

77. <sup>b</sup> Crusta villosa ventriculi cibos amplectens parte cavâ villosa, tubulosa, rugosa, madida, glutinosa; parte convexâ glandulis multis, variisque, ornata, quae oriuntur à tunicâ vasculosâ adhaerescente, arteriis, venis, nervis, ditissimâ; suppeditat ergo emissariis tenuissimis assiduô humorem tenuem, pellucidum, spumosum, spiritibus divitem, falsum leniter, in ipsis voracissimis Animalium, non alcalinum, nec acidum, in esurie diu toleratâ acrem, secretum

<sup>a</sup> Bartholin. de Str. diaphr. c. 2. f. 1. & 2.

<sup>b</sup> Will. Pharm. 7. T. 4. F. 1. 2. 3.

tum fistulis exiguis ab arteriis gastricis; & humorem lentiolem, mucosum, glandulis secretum, folliculis harum collectum, per emissaria ex oculis in cavum ventriculi expressum; amplior contracto ventriculo rugas facit magnas, cibi remoras, fermenti acrioris causas, contritum juvantes, famemque excitantes; <sup>a</sup> in Animalibus, quorum ventriculo haec crusta abest cum liquoribus his, ingluvies, & sinus gulae ante ventriculum, simili fere fabrica, & humoribus; donantur.

78. Si consideres ad cibos hos eò loci <sup>b</sup> salivam, magnâ copiâ, assiduo fluere ex ore, & oesophago, ventriculum eos transfudante humore diluere perpetuò, reliquias prioris alimenti iis permistas eos agitare, aërem iis subactum eos intimè movere, calorem loci cuncta haec excitare, videbis effectus hic praestitos esse, macerare, diluere, in tumorem attollere, attenuare, fermentationem inchoare, dissolvere, meatibus, & humoribus, corporis nostri adaptare, ingesta.

79. Neque tamen hinc videris, quomodo solidiores cibi, non admodum mansi, feliciter digeruntur in ventriculo.

80. Ut verò causa haec quaesita inveniat, speculeris fabricam muscularem ventriculi,

<sup>a</sup> Malpig. posth. 28. & Peyer. parerg. pag. 57. ad 70.

<sup>b</sup> Nuk. Sialograph. pag. 29.

culi, expendasque quatenus inde actio pendeat.

81. Tumque apparet, membranam ventriculi carnosam, *a* parte convexâ fieri fibris validis, quae ab ore summo incipientes, ad pylorum progressâe, serie orbiculari, vel spirali, ejus cavum ambiunt perpendiculari fere ad longitudinem illius positu, suoque contractu latitudinem arctant; *b* parte autem concavâ constare fibris primò obliquis, fundum ventriculi obliquè versus dorsum ejus, & versus os superius, contrahentibus, sicque minuentibus longitudinem, secundò fibras habere validas, pylorum, parallelo ad longitudinem itinere, amplexas, per dorsum unitas, os superius circumambientes, sicque vacui ventriculi ora adducentes, pleni os superius claudentes, inferius valde coarctantes.

82. Simul patefcit hanc membranam cingi adhuc aliâ extremâ, quae *c* convexâ parte vasculosa valde, *d* concavâ verò fibrosa ductu longitudini parallelo, juvat arctationem longitudinis.

83. Adeoque fibrae hae, valde contractiles quidem, sed tamen non potentes omni-

*a* Will. pharm. rat. T. 3.

*b* Id. Ibid. T. 5.

*c* Id. Ibid. T. 1.

*d* Id. Ibid. T. 2.

nô evacuare stomachum, ubi simul agunt, ora claudunt, contenta distendentia validè premunt, miscent, motu vermiculari atterrunt, ictibus ambientium exponunt, in ventriculo retinent crassâ, ea attenuant, fluidiora versus sinum ante pylorum pellunt, per hunc arctatum quidem at minus clausum quam os superius lentè, parum simul, idque fluidissimum, in cineritiam materiem redactum expellunt in intestinum Duodenum.

84. <sup>a</sup> Tali motu, at violentiori, multa animalia fere solo utuntur ad maceratos cibos concoquendos; <sup>b</sup> hunc auditus percipit in illis; cum observatio effectuum demonstrat; similem verò (83.) nobis inesse docet nervosa, & musculosa, visceris hujus fabrica.

85. An non & inde causa intelligitur, cur paucio cibo, potuve, assumpto, ventriculus citò evacuetur? quare stomachus nimis infarctus nihil demittat, nec digerat, sed diu retenta cruda evomat? quamobrem, & quando avidissimè ingestos subitò liquores, pertinaciter retineat?

86. Tamen explicatas causas haud putes sufficientes sic mutandis cibis, ut fit; verum

<sup>a</sup> Harvej. de Gen. An. p. 21. Edit. Lond. Peyer de Anat. Ventriculi Gallin. p. 57. &c.

<sup>b</sup> Borell. mot. An. p. 2. c. 16.

rum attende ad 1. calorem perpetuum foventem ambientium partium; 2. ictus tam innumeros tot Arteriarum ventriculo, diaphragmati, omento, spleni, hepati, pancreati, mesenterio, peritoneo, innatarum; 3. Aortae suppositae violentas vibrationes; 4. vim forte liquidi nervosi vix alibi copiosioris; 5. compressionem assiduam, reciprocam, validam, peritonei totius fere, per *α*. ingens *α* diaphragma; quod inferiori parte dextrâ à tribus primis lumborum vertebis, sinistrâ ab ultimâ & penultimâ Thoracis, tendineo, an mox carneo, principio ortum fibris directis adscendit, tendinescitque; parte superiori, principio membranaceo tenui statim carnosio ex toto margine cartilagineosorum apicum costarum inferiorum & infimâ parte sterni ortum, fibris centrum petentibus decurrit, tendinescit, prioribus confunditur; unde agens ex convexo planum fit, abdomen, & contenta arctat; *β*. musculos decem abdominales unitâ contractione validè comprimentes, arctantefque, reciprocis motibus abdomen, maximamque vim in idem exercentes, ut docet contemplatio: nam 1°. *β* Obliquus Exterior, tendinosus, & carneus, ortus à margine inferiori 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. costarum,

C

de-

*α* Barthol. Struct. diaphr. Cap. 1. 11. &c.

*β* Vesal. l. 2. T. 1. l. P. P.

descendens , tendinescit , lineae albae , ossi pubis , anteriori superiori margini ossis Ilium inferitur. 2. *c* Obliquus inferior carneus ex ambitu circulari ossis Ilium , & ex ligamento ossis pubis , ortus , fibris antrorsum inclinatis , tendinescens , lineae albae , cartilaginibus 8, 9, 10, 11, 12, costarum inferitur. 3. *d* Pyramidalis carneus ex parte anteriore superiore ossis pubis , tendinescens lineae albae , & umbilico insertus. 4. *e* Transversus carneo ortu à processibus transversis vertebrarum lumbarium , spinâ ossis Ilium , ligamento ossis pubis , sine cartilagineo costarum infrâ sternum , exortus , lato tendine toti lineae albae sub Recto Abdominali immittitur. 5. *f* Rectus denique , carneus à cartilagine Xiphoïde , cartilaginibus binarum costarum infimarum verarum , cartilaginibus binarum costarum superiorum spuriarum , quinque tendinescentibus iterumque carnescentibus partibus constans , tandem in partem superiorem anteriorem ossis pubis inferitur.

87. Quod si omnium harum causarum (76. ad 87.) vim cogitas , unitâ operâ conspirantem in materiem satis mollem , solubilem-

*c* Spigel. l. 4. T. 10. l. L. L.

*d* Fallop. Observ. Anat. pag. 431. Bidl. T. 32. F. 1. l. R.

*e* Vesal. l. 2. T. 5. l. Y.

*f* Spigel. l. 4. T. 8. l. N. L. Tab. 9. l. 1. b. T. 10. l. D. E.

bilemque , uno loco coërcitam , dissolvendam , verê videbis effectus , qui hic loci contingunt , inde debere certô sequi , nempe

1. Mobilia misceri fluidis , laevigari , in fluorem solvi , cineritium colorem induere , sensim premi , & quâ data porta exprimi.

2. Tenaciora à priori opere residua retineri , continuatis iisdem causis , iterum eadem pati , eademque exhibere phaenomena , ut priora.

3. Fibras , membranas , tendines , cartilagineas , ossa , animalium , pelles , filamenta , & duriores partes vegetantium , exsucca reddi , ultimôque expelli è ventriculo , formâ cohaerente adhucdum.

4. Hinc ex cibis vegetabilibus , animalibusque , resolvendo fieri humorem nostris fatis similem.

5. Et citam instaurationem languidarum ex inediâ virium ; dum subtilissimus humor receptus fistulis excipientibus ubique in ore , oesophago , ventriculo , hiantibus , in venas Lymphaticas se evacuantibus , hinc brevi in venas sanguinis immisus , indeque citô ope Arteriae in omnes corporis partes distributus subitô collapsas reficit.

88. An ergô solus calor coquus est Stomachi ? Estne in ventriculo acor vitalis , vitam inspirans , nativus ventriculo ? Num sine acido digestio deficit ? Quis humor spissus ,

## 36: ACTIO INTESTINORUM

sus, falsus, acidus, amarūve, sano jejuni homini prono Thorace toties eructatus? & undenam natus? An est causa famem excitans multiplex, & quae? quare tumescit digerens ventriculus?

89. Flaccescit fere vacuus ventriculus crassiora sola retinens, eaque amplo jam pyloro vi respirationis evacuat, licet rarō ad integram exinanitionem usque.

## ACTIO INTESTINORUM IN INGESTA.

90. **U**t porrō cognoscatur quid Chylo Stomachi, & foecibus residuis, in intestinis accidat, contemplemur fistulae hujus fabricam, humores eō delatos, vasa absorbentia, motum horum, & partium circumjacentium.

91. <sup>a</sup> Tunica ergō Intestinorum tenuium prima chylum amplectens, villosa, ampla, pertusa fistulis aquosis, & glutinosis, pertusa osculis lacteorum, pertusa poris grandibus, qui ab aliis his meatibus distincti, humore aquoso, & glutinoso, assiduē madida, & lubrica, incumbente musculosā triplo quidem longior, hinc rugosa valde, maximē ubi nexa mesenterio, convexa parte

vascu-

<sup>a</sup> Will. Pharm. rat. T. 6. l. E. E. Ruysch. Epist. 11. Tab. 12. F. 1. 2. 3. 4. 5. 6.



vasculosa, glandulosa, nervosaque; unde remora chylo & foecibus, interceptio horum perpetua ubique, lubricatio & defensio cavi, dilutio assidua crassioris materiae, maximè circâ finem Ilei, & foecum ibi crassescantium inunctio.

92. <sup>a</sup> Ambit hanc alia tenuis, nisi ejusdem partem censeas, reticulari innumerabilium vasculorum arteriosorum, venosorum, nervosorum, intertextu constans, cui <sup>b</sup> glandulae Peyerianae basibus fere haerent, quarum apices per crustam hiantes gluten supeditant, hae in initio intestinorum Tenuium paucae, sensim mole, & numero auctae, ad ortum Crassiorum confertissimae; quare hinc calor, pulsus, tritus, dilutio, lubricatio, defensio,

93. Cingit illam <sup>a</sup> musculosa, parte concavâ fibris annularibus, firmis, densis, mesenterii fimbriae, ut tendini, insertis; unde hinc intestinorum tenuium cavitas integrè, per partes, successivè, assurgentibus valvulis, <sup>b</sup> arctatur, sursum & deorsum, reciprochè, contenta urgentur in latera intestini villosa; coneruntur, miscentur, attenuantur, à concretionem impediuntur, parietes

C 3 ipsi

<sup>a</sup> Will. Pharm. rat. T. 6. l. D. D.

<sup>b</sup> Peyer. de Gland. Intest. toto tractatu. Ic. 2. l. B. C. Ic. 3. l. B. B.

<sup>a</sup> Will. Pharm. rat. T. 6. l. CC. BB.

<sup>b</sup> Wepfer. & Peyer. Gl. Int. 1. Part. 2. Cap. 4.

### 38 ACTIO INTESTINORUM IN INGESTA.

ipsi intestinorum detergentur; parte convexa longitudinalibus, priores decussantibus, quibus corrugantur, contrahuntur, in rectitudinem porriguntur intestina, maximè in locis è regione annexi mesenterii.

94. Ultima hanc ambit <sup>a</sup> Extima à peritonaeo, priores involvens, ordinans, nectens mesenterio, vasa firmans.

95. Fistula haec tota (91. ad 95.) longa-que, fimbriae mesenterii brevi, rugosae, complicatae, adnectitur; pendula haeret; mirè in gyros complicatur omni fere modo; appensi, interstrati, pinguis, omenti fotu, & blandâ exhalatione, lubricatur, mulce-  
tur, laxatur, mobilis servatur, defenditur; exponitur illi loco peritonaei, in quem ambientes causae maximè reciprocas actiones exercent; in statu sano diluta tantum continet, crassescente tandem ad ejus extrema foece; in vitali, sanoque, statu mirè arctata est; peristaltico motu agitur perpetuò. Quare aptissima conterendo, diluendo, separando, volatilem reddendo, macerando, resolvendo, in oscula lactea propellendo, Chylo. Atque haec quidem toti tractui communia.

96. Intestino duodeno propria est rectitudo, angustia, laxior ad meseraeum nexus, <sup>a</sup> perfora-

<sup>a</sup> Will. Pharm. rat. 6. l. AA. T.

<sup>a</sup> Glisson, hep. C. 16.

foratio ad finem pro <sup>b</sup> meatu bilis communi, & pro <sup>c</sup> ductu pancreatico Wirfungiano alias junctis, quandoque separatis; Quare Chyli celerrimus hic ad ora haec transitus, & minor immutatio.

97. Triplicem hâc viâ humorem cernes ingredi in cavum hoc intestini Duodeni; scilicet Cysticam, Hepaticamque, bilem, tum Lympham ex Pancreate.

## DE ACTIONE BILIS UTRIUSQUE.

98. **E**st 1. vesicae bilis spissior, profundius flava, amarior, assiduô non fluens in intestina, sed copiâ, compressu externo, contractione fibrarum irritatarum, excernenda. 2. hepatica verô dilutior, pellucidior, blandior, jugi fluore stillans, solis actionibus circumductorum humorum expellenda. 3. humor pancreaticus perpetuô fere secretus excernitur. Ex quibus cum accedente salivâ & muco, oris, oesophagi, ventriculi, intestinorum, permistis, fit liquor spumofus, atque aliquantum lentescens, haec loca occupans, & saepe in vacuum ventriculum premendus.

C 4 99. Bi-

<sup>b</sup> Gliff. hep. C. 27. Tab. ibid. L. F.

<sup>c</sup> Graaf de succ. pancr. T. 1. l. A. C. E. Warthon. Adcnogr. C. 13. Tab. FDB.

99. Bilis autem cystica resistit aciescentibus ; aliaque admistione sui simili facultate imbuit ; Saponacea est , absterget ; olea aquae miscibilia reddit ; resinas , gummi , tenacia quaeque , resolvit , attenuat , homogenea facit ; nec alcalica est , nec acida ; sed oleo , sale , spiritibus , inprimis concrevit aquâ dilutis ; non combustilis nisi siccata prius ; acerrimus humorum circumductorum corporis. Quare effectus ejus , si chylo , foecibusque , affusa miscetur , conteriturque , sunt , attenuare , resolvere , abstergere , fibras motrices stimulare , diversissima quaeque permiscere , acria salina obtundere , coagulata dividere , vias expedire Chylo , appetitum excitare , fermenti vicem gerere , cruda coctis assimilare. Haec cystica plus , hepatica minus , praestat. Reliqua , descriptio hepate , patebunt.

## DE ACTIONE LYMPHAE PANCREATICAЕ.

100. Sub posticâ parte , & fundo , Ventrliculi , in lamellâ inprimis posteriori omenti , glandula conglomerata ingens , pendula , est , \* Pancreas dicta , ab arteriis Coeliacis , ope fabricae glandulosae , secer-nens

\* Wharthon. Adenogr. C. 13. Tab. Graaf de succ. pancr. C. T. 1. Vesal. l. 3. T. 4. l. 27.

# DE ACTIONE LYMPHAE PANCREAT. 41

nens humorem in unum communem ductum, qui in duodenum exit (96.), eoque omnem illam lympham effert.

101. Est autem insipida fere, subsalsave, limpida, copiosa, assiduò facta & emissâ, nec acida, nec alcalina, sed salivae simillima ortu, vasis, dotibus; bili confusa in vivis, cum eâ digesta, in eodem tubo cum illâ haerens, nihil intestini motus observandum exhibet, sed aequabiliter miscetur illi, aut & sola in vacua intestina influit: hinc usus ejus affusæ, permistæ, subactæ, cum chylo, & foecibus, bile, mucos, erunt crassa diluere; miscere omnia; chylum cruori miscibilem reddere; transitui per lactea adaptare; acria emollire; bilis visciditatem, amarorem, coloremque, immutare, eamque chylo intimè permiscere; menstrui, & vehiculi, munere fungi; sapores, odores, dotes, ciborum singulares, itâ mutare, ut unam fere induant indolem; citissime ire, redire, hanc viam.

102. Quare firmus respondebis rogatus, an Bilis duplex? an excrementum Chyli hepatici, dum sanguis fit ibidem, rejectum? an sanitati, vitaeque omni, aliquid boni praestat? quid verò illud? an pancreas & bilis Helmontiano, atque Sylviano hinc, systemati serviunt? an Duumviratum hic, & qualem, obtinent? an motu intestino san-

## 42 PROPULSIO CHYLI

guinis excitando, sustinendoque, vitam faciunt? qualis pancreatis succus, & cui bono? cur fluit cum bile, aut illi saltem proximus? an eo tutô caret animal?

## PROPULSIO CHYLI IN VASA LACTEA.

103. **C**ontractis fibris rectis intestinorum, quae externae horum tunicae, ut tendini, inferuntur, fistula rugosa fit in parte à mesenterio averfâ, hinc ex spirali tubo cylindri acquirit figuram, unde in parte mesenterio annexâ laxa fit, in parte à mesenterio averfâ arctatur, quare meatus mesenterio proximi, id est ora lacteorum laxa fluidiori, mobiliori, lubriciori Chylo, aperta sunt, per quae intrare possit: interim eâdem vi valvulae auctae, assurgunt, ad se mutuô accedunt, Chylum intercipiunt, fistunt, partem intestini contractam fere claudunt.

104. Contractis simul fibris orbicularibus mesenterio, ut tendini, insertis, spatia cylindrica (103) arctantur, valvulisque ad se mutuô pressis clauduntur, quare Chylus hâ vi, & actione ambientium (86.), pressus, dilutus, mistus, attritus (91. 92. 93. 95.), interceptus, adigitur versus loca mesenterio propiora, hoc est adigitur in ora lacteo-

teorum motu peristaltico optimè aperta. An ergô suo impetu lactea intrat effervescentes Chylus? non.

105. Qui ergô intrat in oscula lacteorum Chylus male habetur solius cibi & potus soboles: est enim humor partem maximam constans salivâ (66.), mucu tenui oris (65. 5.), liquore duplici oesophagi (73.), & ventriculi, (77. 2.), bile cysticâ (98. 1. 99.), bile hepaticâ (98. 2. 99.), lymphâ pancreatis (101.), humore intestinali lymphatico (91.), humore intestinali Peyeriano (92.), a nervorum forte effuso copioso, subtilissimoque, liquore, à tam innumerabilibus nervis supeditato; illi enim omnes humores deglutiti, transudantes, effluentes, soli, vel subtilissimo Chylo misti, semper venas lacteas ingrediuntur, licet à pastu tantum conspicuas.

106. An non tenuis, biliosa, & lymphatica magis, pars illius Chyli (105.) recipitur fistulis absorbentibus, hiantibus in intestinorum crustâ (91.), & se exonerantibus in venas meseraicas, unde in venâ Portarum dilutio, bilique secernendae nova materies? Certe harum numerus, amplitudo, fabrica singularis circâ intestina, communis natura omnibus venis; humor hinc fluens, venosus in Portarum venam ut in arteriam; Cruoris huius

#### 44 PROPULSIO CHYLI IN VASA LACT.

hujus indoles; ingens copia humorum in intestina confluentium, qui nec lacteis omnes recipi, nec alvo expelli observantur; Anatomie comparativa, in Oviparis lactea non reprensens, interimque aditum in meseraicas ex cavo intestinorum experta; respondent ad hoc quaesitum.

107. Quum cuncta phaenomena, cibo, potuique, contingere visa, ab assumptione horum ad ingressum in Lactea, clarè, simpliciter, distinctè, demonstrantur sequi ex fabricâ & vi vasorum, indole cognitâ humorum, & ex viribus illorum, sensu, vel ratiocinio Mechanico, demonstratis; an Tibi videntur debere advocari obscura, dubia, rationi & experimentis dissona, postulata? Calor coquus stomachi; vitalis ejus, nativus, & volatile reddens, Acor; Archaeus faber; Bilis Alcalina acidum Chylum fixum in falsum volatile alcalescens immutans; Pancreaticae Lymphae acor, & cum bile Alcalinâ fervor; praecipitatio Chylum depurans; facultates Peripateticæ, Galenicæ, Chemicæ; fervores, effervescentiæ, fermentationes; & innumerae tales hypotheses, damnosæ, dum regulas dant faciundæ Medicinæ.



# FOECIS INTESTINALIS MATERIA, ET EXPULSIO.

108. **A**ssumptorum partes crassiores osculis lacteorum, tenacius cohaerentes, quam ut vi manducationis, & *χυλοπιήσι* solvantur, absorpto liquidiori, motu Intestinorum tenuium valvulis instructorum, assiduo gyro inflexorum, 37 palmos fere longorum, lubricatae pingui glandularum, in loca sensim angustiora pelluntur, premuntur, teruntur, diluuntur, macerantur, emulgentur, successive exhauriuntur, donec orbatae fere omni solubili, exsuccaë, usque in intestinum amplissimum Coecum detrudantur.

109. Diverticulum <sup>a</sup> magni Coeci, <sup>b</sup> Intestinuli vermicularis, <sup>c</sup> Valvula Tulpii, <sup>d</sup> perpendicularis hinc in colo primo adscensus, faciunt, ut in Ileum reverti impos, hic stagnans, foex validè pressa suo pondere, intestini & ambientium actione, omni humore tenui privetur resorpto in vasa lymphatica hinc orta in alveum lacteum exonerantia humores, tum siccum, durum, figurat-

<sup>a</sup> Peyer. Parerg. 1. Ic. 3. l. B B.

<sup>a</sup> Vesal. l. 5. Fig. 6. 7. 8. l. N.

<sup>b</sup> Id. Ibid. l. O.

<sup>c</sup> Tulp. Obs. l. 3. Obs. 21.

<sup>d</sup> Vesal. l. 5. Fig. 6. 8. l. NP.

**46 FOECIS INTESTINALIS MATERIA,**  
 guratum, putrescens, foetidum, stercus de-  
 mum fiat, haud alibi tale. Tum, *f* valvulae  
 hic frequentissimae, magnae, à *g* ligamentis  
 musculosis contrahentibus factae, *b* inflexus,  
 amplitudo, longitudo 8 fere palmarum, re-  
 moram, spatium, colligendis, retinendis,  
 exsiccandis, putrefaciendis, foecibus, exhi-  
 bent. Fibrae dein validae membranae mus-  
 culosae, robore suae contractionis, valent  
 irritatae foeces duras, immobiles, per fistu-  
 lam resistentem, sed lubricatam pinguedine  
 glandularum agere iisque in intestinum  
 Rectum.

110. Cujus *a* perpendicularis fere descen-  
 sus, lubrica maximè sine valvulis aut liga-  
 mento musculofo interna superficies, faciunt  
 ut huc impulsæ citò descendat foex, mole,  
 acrimoniâ, vel utrâque, irriter robustas fi-  
 bras longas accurtantes fistulam, spirales si-  
 mul eam comprimentes, ut ad locum Sphin-  
 cteris usque pulsæ haereat.

111. Laxato tum *a* sphinctere largo, cras-  
 so, carneo, orbiculari, finem intestini recti  
 complectente, contrahuntur *b* levatores ani,  
 qui

*f* Barthol. An. ref. T. 14. F. 3. l. DD.

*g* Id Ibid. T. 11. l. m. Vesal. l. 5. F. 6. 8.

*b* Vesl. l. 5. F. 6. 8. l. N. P. Q. R. S.

*i* Peyer. parerg. I. Ic. 3. l. E.

*a* Vesal. l. 5. F. 6. 8. l. STYd.

*a* Bidlo Anat. T. 47. F. 5. l. BCDD.

*b* Id. Ibid. l. E. E.

qui ab internâ ossium Pubis, Ischii, & Sacri convergentibus fibris Intestini Recti finem petentes, cum dilatant, elevant; hinc inspirati, retenti, rarefacti, thorace arctato compressi, aëris ope, tum diaphragmatis, & abdominalium muscutorum, contractione pressâ pelvi, foece expressâ, laxantur priora omnia, solus sphincter contrahitur.

112. Ex quibus liquet, quae materies foecum? an & constat recrementis bilis, sanguinis, muci, salivae, lymphae? quae causa ejus singularis? & an à fermento stercoreo? cur intestina eô plures glandulas, plusque muci, habent, quo propiora fini? quid pinguedo facit boni ubique circa intestina, maximè ad finem? Cur validissimis lenta alvus, foex dura, levis, pauca? quare verò frequentes his haemorrhoides? cur in exoneratione alvi simul expellitur urina? Cur tenesmus his, qui calculo vesicae laborant? Cur dysentericis toties stranguria? Cur in stranguriâ tenesmus?

## M E S E N T E R I I A C T I O I N C H Y L U M.

113. **C**hylus ille (105.), motu peristaltico (103. 104.), apertis osculis lacteorum impulsus (103.), eodem hoc motu, & adminiculis (86.) enarratis propellitur.

# 48 MESENTERII ACTIO IN CHYLUM.

tur. Quum verô obliquâ in cāvum intesti-  
norum viâ aperiuntur Lactæae, ut multa do-  
cent, & ora minima sint, sola pars fluidior,  
solidior, alba, separata à parte crassiore, ramo-  
sior, magisque cinericeâ, aut flavâ, intrabit.

114. Unde intelligis, cur homo, tam  
variis, acribus, duris, acutis, assumtis,  
non laedatur, sed diu sanus vivat? compara  
fabricam oesophagi, ventriculi, intestino-  
rum, videasque ut differat à structurâ visce-  
rum reliquorum.

115. Causae, quae chylum in lactea pe-  
pulere (113.), permanentes iterum novum  
impellunt, sicque priorem promovent ulte-  
rius, ut fluat per vasa inter duplicatum me-  
seraci posita, ubi a valvulis semilunaribus  
coërcetur, fluxusque versus lumbos deter-  
minatur.

116. a Lactæae in mesenterio humano,  
principiis minimis ortae, plures minores co-  
eunt ad acutos angulos, creant majorem flu-  
vium, iterum à se mutuô recedunt, ite-  
rumque factâ insulâ coeunt in canalem unum,  
qui mox cum similibus eadem patitur, ut  
hinc fiant majores fistulae, quae omnes val-  
vulis plurimis ubique fere interstinctae.  
Hinc permistio, fluiditas, attenuatio auge-  
tur. Haëtenus vocantur Lactæa primi generis.

ACTIO

a Nuk. Adenogr. F. 22. 23. 24. 25.

a Nuk. Adenogr. F. 9. l. decc.

## ACTIO GLANDULARUM MESERAICARUM.

117. **D**ein, rectâ, obliquâ, decussatâ, divisâ, viâ, tendunt ad <sup>a</sup> glandulas vagas, in mesenterio sparsas, eô concurrunt, has intrant, velant, cingunt, sed iterum exeunt, minus ramosae, Chylo fluidiore, aquosiore, turgidae, valvulis pluribus distinctae; Tumque hinc ad cisternam usque lumbarem, Lactea secundi generis vocari solent.

118. Inde equidem constat, chylum ad has glandulas non fecernere quidquam, imô verô dilui ibidem.

119. Quod magis clarescit, si cogitas, <sup>a</sup> glandulas has cavernosas arteriis, nervisque, irrigari plurimis, atque admittere lympham multorum in abdomine viscerum, quae & ibi intrans, humores magis diluit.

120. Ibi ergô remora, conquassatio, dilutio, & forte spirituum ex nervis admistio fit.

121. Inde vasa Lactea magis unita, tendunt ad <sup>a</sup> cisternam lumbarem chyli: saepe <sup>b</sup> trilocu-

D

cu-

<sup>a</sup> Nuk. Adenogr. F. 9. l. E.

<sup>a</sup> Nuk. Adenogr. F. 18. 10. 11. 12. 13. 14. Malpige de gland. conglob.

<sup>a</sup> Nuk. Adenogr. F. 32. H. I.

<sup>b</sup> Cowper Append. ad Bidlo F. 15. l. Abb.

cularem, quô se evacuat copiosissima c lympha omnium fere partium sub diaphragmate positarum, undique vasis lymphaticis alata, atque in communem hunc alveum egesta.

122. Nam valvulae, ligaturae, morbi lymphatici, docent tale esse hujus humoris iter.

123. Qui liquor aquâ, spiritibus, sale subtilissimo, scatens, defoecatissima cruoris pars est: ut ejus officina, vasa excretoria, & dotes sensibiles evincunt.

## DUCTUS CHYLIFERI ACTIO IN CHYLUM.

124. **A**dcôque dilutus admodum Chylus ex his cisternis sub diaphragmate positus, causis jam descriptis (113.), maxime vi Septi medii, & Aortae descendens pulsu, agitur in ductum Thoracicum Pecquetianum ubique valvulis instructum, ex hoc in <sup>a</sup> venam Subclaviam sinistram ibi circiter, ubi jugularis in eam hiat, determinatur ope <sup>b</sup> valvulae semilunaris, parum admittentis simul in venam, nihil in ductum Thoracicum; <sup>c</sup> fluit simul in hunc omnis lym-

<sup>c</sup> Nuk. Adenogr. F. 32. tota. F. 31. tota.

<sup>a</sup> Cowper Append. ad Bidlo. T. 12. l. H.

<sup>b</sup> Lower. de Cord. T. 6. F. 2. l. h.

<sup>c</sup> Id. Ibid. C. 3. pag. 225. Nuk. Adenogr. F. 41. tota.

lymphæ ex omni fere parte Thoracis, viscus fuerit, membrana, musculus.

125. Unde fit, ut ingens illa Chyli, & lymphæ, copia, per fistulam exilem, anfractibus incurvam, pressam, perpendicularem, & facile collabentem, in homine erecto tam facile adscendat? Certè patet si respicis; 1°. ad vim intestinorum contractilem, viresque Chyli expulsum ex iis adjuvantes (103. 104. 86.); 2°. ad valvulas Lacteorum, Cisternæ, ductus Pecquetiani (115. 116. 117. 122. 124.), expediendo motui mirâ efficaciam aptas; 3°. ad pulsus arteriarum meseraicarum, quæ lacteis parallelæ, easve decussant; 4°. ad vim validam diaphragmatis in alveum; 5°. ad pressionem peritonei validissimis causis (86.) acti in pensilem, tenuem, lactea continentem, meseraei membranam; 6°. ad vim propriam contractilem membranarum latera, & ductum Pecqueti, constituentium, post mortem adhuc validam; 7°. ad pulsus validos Aortæ ipsi ductui thoracico vicinæ; 8°. ad motum ipsum Pulmonum, & Thoracis.

126. Videsne igitur ea, quæ Chylo viâ inter intestina & venas mediâ accidunt? videntur sanè ad quatuor imprimis hæc referri posse.

1. Ad motum per intestina, lactea, glandulas, lentum. Laxa enim longitudo priorum, numerus & exilitas posteriorum, id

evincent. Effectus omnium horum est decoctio.

2. Ad motum externum impressum vasis, hinc fluido ; cujus effectus est, propulsio, permistio, attenuatio, floris conservatio. Hunc docemur contemplati  $\alpha$ . posituram vasorum lacteorum sensim crescentium, ubique valvulis praeditorum, in se mutuò coeuntium, à se mutuò iterum recedentium, statim denuò unitorum (116.);  $\beta$ . validam actionem Septi medii, muscutorum abdominalium, viscerum compressorum in fistulas lacteas, in superficie fere meseraei haerentes, & quasi nudas (86.);  $\gamma$ . calorem digerendo aptissimum gradu & humiditate, cujus noti chemici, utpote observati, effectus;  $\delta$ . pulsus Arteriarum mesentericarum & Aortae, omni ferme modo lacteis se jungentium, hasque agitantium.

3. Ad dilutionem, admistu omnis  $\alpha$ . Lymphae totius corporis fere;  $\beta$ . vaporis roriferi humectantis cava, hicque inprimis in haec vasa resorpti Lymphatica;  $\gamma$ . spirituum forte ubique ad glandulas conglobatas Lymphae per nervos admistorum, & cum hac chylo infusorum.

4. Ad assimilationem cum omnibus partibus corporis, antequam ingrediatur in vasa cruoris: dum ab ore usque ad subclaviam perpetuò, ubique, lentè, parcè simul, successi-



cessivè ,  $\alpha$ . illi additur aliquid humoris fere cujuscunque nostri corporis , elaborati , digesti , saepe circumacti , per omnia vasa transacti ; salivae , muci , lymphae & muci oesophagi , stomachi , intestinorum , salivae pancreaticae , bilis utriusque , lymphae totius corporis , spirituum forte à minimis quibusque punctis corporis ;  $\beta$ . tum vi totius fabricae , figurae , situs , motusque , vasorum accuratissimè admiscetur.

127. Quisquis illa ponderat , in chylo jam reperiet principia , quae cruorem componunt ; dum aquam , spiritus , olea , sales , jam commista cernet.

128. Neque mirabitur , què fiat , ut rari mesenterio morbi , licet id. crudis proximum ? cautelam ubique observat sollicitè impensam.

129. Lactea quin etiam , & Thoracicus ductus , vehendae Lymphae , forte & spiritibus , aequè ministrant , quam quod Chylo inserviunt movendo.

130. Chyli venis infusi iter , & mutationem ; cognoscere qui desiderat ; cruoris , cui miscetur , progressum , & efficaciam necesse habet indagare ; quò ergò ordine jam porro ducimur.

# DE FABRICA ARTERIAE, ET VENAE.

131. **H**umor ruber in vivo corpore ubique fere repertus, cruorque appellatus, deprehenditur in homine sano, in vasis propriis, quae arteriae, venae, vel receptacula quaedam inter has media.

132. Arteriae quidem cernuntur esse canales ad sensum conoidei, obliqui, inflexi, ramosi, internè laeves, sine valvulis nisi in corde; rami, vario ortu, plerumque oriuntur acutis angulis versus apicem, rarius rectis, ut in intercostalibus &c., rarissime obtusis, ut in umbilicalibus foetus, &c. Constant tunicis descriptis quinque: *a* extima est tenuis, nervosaque, in exteriori superficie; in interiori valde denso reti vasorum arteriosorum ex coronariis arteriis, aliisque, unâ cum venis intertextis, constat; *b* secunda cellulosa, tenuis, sed valde dilatabilis cellulis inflatis; *c* tertia glandulosa; *d* quarta muscularis, fibris annularibus densissimè compactis, multaque stratorum serie crassis, atque in plures lamel-

*a* Will. pharm. rat. 1. f. 6. C. 3. Ruysch. Ep. resp. 12. 14. Fig. 1. 2. 3. Vicus. vas. syst. p. 80. & seq.

*b* Ruysch. Th. 6. p. 10.

*c* Will. loc. cit.

*d* Will. Ibid.

las separabilibus, valde elasticis, conficitur; quinta denique interna, tenuis, membranacea, fibris in longum porrectis, contractilibus pariter confecta est; totum hoc vas, dum vita veget, micat, atque salit.

133. *a*. Venae similes fere arteriis figurâ, & distributione; sunt amplitudine majores; numero forte plures; membranis omnibus longè tenuiores, inertiores; valvulas habent, solitarias fere ad loca insertorum in truncum majorem ramorum, *b* & binas ut plurimum junctas in venarum majorum truncis rectis, à corde remotioribus, atque perpendiculariter sursum vehentibus cruorem; *c* quae sic factae sunt, & cavis canalium applicatae, ut humorem ex minori ramo in majorem truncum admittant, retrogressum caveant, molemque ferant. Ea verò vasa ipsâ vitae actione non micant, neque saliunt.

134. *a* Quotquot tales Arteriae (132) toto corporeprehenduntur, illae cum Aortae trunco continuatâ junguntur viâ, & corpore, dum truncus ille corde sinistro oritur. *b* Illae verò, quae pulmoni constituendo serviunt, simili modo ex arteria pulmo-

D 4                      nali

*c* Will. Ibid.

*a* Vid. Auct. Eosdem.

*b* Aquapend. Anat. p. 156. T. 4. F. 1. l. l. M N O P.

*c* Id. Ibid. T. 5. l. O O.

*a* Cowper App. ad Bidlo T. 3. F. 3.

*b* Ruyfch. Th. 3. 28. 29. Th. 4. 19.

nali dextro corde oriundâ porriguntur. Ut facies ipsa harum, quando cerâ distentae, docet, utque jam viderunt sine hac arte. Antiqui, ultimos tamen haud prosequuti fines.

135. <sup>a</sup> Venae (133.) autem quotcunque in toto visuntur corpore, eâdem ratione se habent ad venam Cavam; haec verô format amplum, atque membranâ arteriosae simili obductum, <sup>b</sup> finum, qui in cavâ auris dextrae cordis desinit. Pulmoni autem fabricando <sup>c</sup> dicatae venae, per quatuor suos majores ramos ita pariter abeunt in <sup>d</sup> finum similem priori, qui & in aurem sinistram protenditur. Est verô quaedam in hepate diversitas ibi exponenda. Sunt coeterum utraque vasa haec in corde amplissima, inde sensim, decrescunt, & comitatu fere individuo simul porriguntur per omnia corporis loca.

## DE CIRCULATIONE SANGUINIS.

136. **A**nimalis vivi cruor ad vitam requisitus omnis fere ex arteriâ quâdam

<sup>a</sup> Vesal. l. 3. p. 313. in Tabulâ.

<sup>b</sup> Vesal. l. 3. p. 268. in Tabulâ. & p. 313. in Tab.

<sup>c</sup> Ruysch. Ep. 11. F. 3. l. B. Low. de Cord. p. 53. 54.

<sup>d</sup> Ruysch. Th. 4. 19.

<sup>e</sup> Ruysch. Ep. 11. F. 1. l. B. D. D. & \*, Low. de Cord.

dam majori laesa, vulnere magno expellitur brevi, & magno cum impetu; docent id lationes.

137. Neque refert multum, in quam arteriam vulnus inflictum sit; ut fidem fecere incisi canes.

138. Quare in vivo, sic vulnerato, animali cruor ille omnis velociter movetur, & vehementer; maximè si aliae, non vulneratae, arteriae ligantur, dum sanguis ex vulnerata salit.

139. Unde patet sanguini aditus ex quolibet parte corporis cruore plenam in quamlibet arteriam.

140. Atque tota tum massa cruoris per unum id vas movetur; adeoque & ante vulnus moveri prius per vasa debuit.

141. Iterum, quaecunque arteriarum detecta, sique circumductu constricta, fuerit, tumet illa, & vibrat, inter vinculum & cor; flaccescit intra vinculum & extrema corporis; simul vicinae Arteriae liberae vehementius pulsantur; sique inciditur intra cor & vinculum, saliente rivo emittit celerimè cruorem usque ad citam mortem; ubi autem discinditur intra vinculum & extrema, parum extillant sanguinis elabatur. Oportet tamen, ut sit arteria solitaria, nec intermediam anastomosi majori vicinae arteriae juncta in loco supra ligaturam.

142. Ergo vitalis cruor fluit quidem per arterias (140.), sed fluxu eunte à corde ad extrema, ex latiori in angustiorē partem, ex trunco in ramos; itaque hâc lege in arteriam quamlibet derivari omnis sanguis potest, atque ex eâ effundi; non contrâ.

143. Vena quoque major denudata, filoque constricta, tumet inter extrema & vinculum, nec pulsât; depletur intra cor & filum; vulnerata parte priori eructat sanguinem brevi ad mortem, vel animi deliquium; pertusa autem posteriore loco, vix quidquam reddit effluentis cruoris; nec refert quænam vena fuerit, ut probat venasectio.

144. Quare vitalis humor fluit quidem ex omni corpore in hanc venam velociter, sed eâ modô lege, ut iter pateat per hanc ab extremis corporis ad cor, ex angustis venæ versus latissimas oras, ex ramis in truncum; nec aliter. Quod ipsum docent valvulae (133.).

145. Clarè inde constat, arterias corporis omnes assiduô cruorem vitalem velociter motum vehere à corde sinistro per truncos arteriarum in ramos, ex his, ad omnia corporis loca, interiora, exteriora.

146. Contrâ verô, venas omnes corporis, exceptâ eâ, quæ Portarum vocatur in hepate, ab iis locis minimis (145.) assiduô motum cruorem revehere in ramos venarum,

ex

ex his in truncos, inde in finum venosum, tandem in auriculam dextram.

147. Namque ex finu venoso (135.) cruor aggestus per musculum circumtextum pelli potest in auriculam dextram laxatam; etenim nihil obstat, adjumentum verò præstatur à motu venosi sanguinis huc pressi.

148. Quum verò <sup>a</sup> auricula dextra, ut & sinistra, sit musculus cavus, ingens, duplici serie fibrarum firmarum, contrario decursu in tendines oppositos laterum instructus, <sup>b</sup> arteriis venisque innumerabilibus donatus, uno tendine ori venoso dextri cordis thalami innixus, altero duriore in circulum fere formato venae Cavae accretus; patet vi contractili hujus sanguinem valido impetu expressum in cor dextrum laxatum intropelli posse.

149. Tunc enim vacuo corde, longiori reddito, retrotractis versus latera, & versus cuspidem, <sup>a</sup> valvulis tribus tricuspidalibus per papillas carneas teretes, oblongas, ex lateribus cordis dextri ortas, tum retrotractas, proinde apertâ viâ satis, nihil omnino obstat hinc itineri.

150. Fabrica partis, phaenomena in vi-

ven-

<sup>a</sup> Low. de Cord. T. 5. F. 2.

<sup>b</sup> Ruysch. Ep. 10. T. 11. F. 1. 2. 3. 4. 5.

<sup>a</sup> Vicuss. de remot. & prox. mixt. princ. T. 6. l. hhh  
kkkk. Vcsal. l. 6. F. 7. l. KLMO.

ventibus apertis, flatus, injectio, idem confirmant.

151. Si verò cruore sic plena dextra cavitas contractione suarum fibrarum premit sanguinem versus ora, hic juxta parietes assurgens elevat valvulas tricuspidales sic nexas columnis carneis ab opposito latere porrectis, ut integrè collapsae parietibus cordis dextri, nunquam applicari queant, has trudit versus auriculam dextram eousque, donec ibi junctae os accuratè claudant, retrogressum perfectè impedian; ipsae quippe illae columnae ulterius retroagi haud patiuntur.

152. Eadem ope idem cruor (151.) nititur ab inferioribus sursum in valvulas tres semilunares in ambitu alterius oris in arteriam pulmonalem patentis positas, has apprimat lateribus arteriae, viam pandit in eam solam.

153. Sed substantia, figura, nexus, earundem valvularum (152.) indicant retroflu cruoris ex arteria pulmonali in cor dextrum has ita figurari, ut junctae iter accuratè intercludant, sanguinemque omnem sustineant eo exactius, quo urget fortius.

154. Fabrica partis, phaenomena in ventibus apertis, arteriotome, injectio, idem confirmant.

155. Ergò cruor venosus; id est totius cor-



corporis (146.), ex sinu venoso, per auriculam, per cor dextrum, assiduò, cito, violenter, movetur omnis in arteriam pulmonalem solam.

156.<sup>a</sup> Ex sinu venoso sinistro, à quatuor magnis vasis concurrentibus accipiente cruorem omnem pulmonicum (155.) vi musculosae fabricae ejus cruor agi potest in auriculam sinistram laxatam, longe minorem dextrâ, similiter factam tamen & positam; nihil enim obest. Sic inde in cor sinistrum laxatum eadem causâ (148.), ob similem duarum <sup>b</sup> valvularum mitralium conditionem (148. 149. 150.) propelli facilè poterit, eâ viâ regredi nequit (151.).

157. Ut & ob <sup>a</sup> valvulas tres semilunares in Aortae initio positas hîc iterum determinatur iter rectâ in Aortam ob easdem causas ac (152. 153. 154.), maximè si illa quiescit; atque exactè occluditur via retronitenti sanguini. Sermo autem in hisce est de homineadulto, atque consueto mortalibus modo ducente spiritum.

158. Ergò omnis sanguis pulmonicus (155.) ex pulmone, in sinum venosum sinistrum,

<sup>a</sup> Ruysch. Ep. T. 11. F. 1. l. DD. & \*

<sup>b</sup> Vicuss. deremot. & prox. princip. mixt. T. 8. l. h. h. 2. 1. 1. 1. v. Low. de Cord. T. 5. F. 1. l. ddec. Vesal. l. 6. F. 9. l. EGH. FGH.

<sup>a</sup> Vicuss. Ib. T. 9. 222. Low. de Cord. T. 4. 3. bbb. Vesal. l. 6. F. 10. l. BCD.

nistrum, in auriculam laevam; in cor sinistrum, ex hoc in Aortam assiduò, citò, violenter movetur.

159. Qui motus clarè apparet in vivis fieri cum his phoenomenis.

1. Ambo sinus venosi simul implentur, turgent.

2. Ambae auriculae simul flaccescunt.

3. Tum implentur eo ipso momento cruore actò per vim contractilem musculosi sinus venosi proximi.

4. Eo ipso puncto temporis cor utrumque simul contrahit se, evacuatur cruore, implentur arteriae duae magnae & dilatantur.

5. Momento post hanc constrictionem cor utrumque inane jam flaccescit, elongatur, capacitate augetur.

6. Quo vixdum contingente utraque auricula motu musculari contrahit se, cruorem contentum exprimit, in cava cordis propellit.

7. Iterum interim replentur sinus venosi ut in phaenomeno primo, atque eadem ordinis serie omnia redeunt, atque perdurant, donec langueat propinquum morti animal.

8. Quandò auriculae saepius palpitant, ut & venosi sinus, dum semel modò ventriculi contrahuntur.

160. Adeoque sanguis omnis ab omni puncto interno, externo, corporis, & ab ipso Corde & auriculis redux, in cavum dextrum collectus pellitur, ex eo per pulmones agitur totus in cor sinistrum, inde per omnem corporis ambitum, atque ab eo iterum in cor. Haecque est ratio circumcuntis jugiter sanguinis, cujus inventi gloriâ immortale cluet Harvaei nomen; Confirmavit illam Infusio, transfusio, microscopium verò ad oculum.

161. Proinde & Chylus (126.), paucâ valde copiâ simul, pressus assiduò per ductum thoracicum (125.) valvulam venae subclaviae (124.), motu determinato sanguinis semper clausam, elevat eousque, ut ea portio Chyli, quae suo adscensu resistantiam prementis cruoris elevare potest, ingrediat in eam venam, ejus ductu in venam cavam, sinum venosum, auriculam dextram, tandem in ipsum ventriculum cordis primum.

162. Assidua haec, sed parca simul admistio, concursus sanguinis à <sup>a</sup> plagis oppositis contrario veloci motu in unum hunc locum acti, <sup>b</sup> lymphae hûc reducis copiosae motus, faciunt, ut hîc incipiat miscela Chyli & Sanguinis, & ut impediatur omnis concretio.

163. Quo

<sup>a</sup> Verhey. T. 39. F. 1. l. EE. dd. cc. D. B.

<sup>b</sup> Low. de cord. Cap. 2. ad fin.

163. Quo peracto, pulsus in pectini similem <sup>a</sup> fabricam auriculæ, statimque validâ contractione hujus, & omnium columnarum ejus, oppositis undique concussibus, miscetur, dividitur, fluidus conservatur, majori impetu permiscetur forte <sup>b</sup> alteri parti cruoris auriculam præterlabentis, quæ omnia juvantur, augenturque affuso sanguine <sup>c</sup> in cavum auriculæ redeunte à substantiâ cordis & auriculæ, qui procul dubiò mobilissimus, & ingenti impetu intrâ auriculas projectus.

164. Quid autem sanguini, & chylo, huc in cor effuso, fiat, scitur ex proprietate sanguinis, & ex fabricâ cordis: oportet quidem ob dissidia partium solis hîc, firmisque, niti experimentis; talia fanè sunt jam recitanda.

165. Vivi, jejuni, animalis sanguis in ventriculo dextro præsens non sapit alcali, nec acidum, sed falsum ammoniacum, vel marinum.

166. Si componitur cum acidis, vel cum alcalicis, non dat conspicuos motus effervescentiæ, sed quidem mutat colores & fluiditatis gradus.

167. Sa-

<sup>a</sup> Low. de Cord. T. 5. F. 2. l. ccc.

<sup>b</sup> Verhey. l. 2. Tr. 4. Cap. 4. pag. 265. T. 4. F. 2.

<sup>c</sup> Vieuss. nov. invent. de Cord. Ruysch. Ep. 10. T. 11. F. 4. l. A.

167. Saliens ex arteriâ pulmonali incisâ, & vase exceptus, nullum dat signum ebullitionis intestinae, vel effervescentiae; sed fumum fundit olentem, ingratum, acrem; frigescens in quiete coit, tum una pars ejus concrefcit in massam satis solidam, dum altera priori fluidior fit.

168. Abscisso mucrone vivi cordis, sursum erecto apice ejus, cernitur cruor propelli auriculâ contractâ in cavum cordis, non verò ebullire, vel fervere; inprimis id spectabile circâ mortem. Quae phaenomena (165. 166. 167. 168.) & vera in sanguine ventriculi sinistri.

169. Nec Thermoscopium vivo cordi immissum docet majorem ibi, quam alibi, calorem sanguini inesse.

170. Chylus in Thoracico ductu salsum marinum plerumque sapit, aut praedominantem in cibo saporem retinet.

171. Idem exceptus, salibusque oppositis mistus, rarô, & vix ebullit.

172. Exceptus vase solus non fervet, nec ebullit, unquam.

173. Neque id in eo apparet, dum Thoracico continetur ductu.

174. Imô ibi aggregatus, inde in subclaviâ pulsus, ibi sanguini mistus, non fervet, non bullit, nec in venâ, nec in auriculâ, nec in ventriculo cordis.

175. Quin, iisdem factis, ligatâque venâ Axillari intrâ Cavam & intrâ valvulam, nulla ne tum quidem videtur effervescentia.

176. Tandem, quum lymphâ conglobatarum Chylo jam sit admista (105.), eaque ipsa sit proles arteriosi sanguinis, liquet ejus indolem aestimandam ex ingenio ipsius sanguinis quoad hoc negotium; quod & iisdem quoque experimentis cognoscitur.

177. In corde itaque nulla fit ebullitio, effervescentia, fermentatio; sive spectes Cor, sive consideres liquores ingressos; nec est, quod inde vis speretur alicujus momenti.

178. Calor quoque cordis non mutabit indolem, motumve sanguinis, ut causa nova, nec expellet eum ex corde.

179. Sed & nullum in corde fermentum.

180. Causa igitur pellens cruorem ex corde in arterias, ex venis in cor, non est in ipsâ mole sanguinis.

181. Sed quaerenda in eo, quod sanguinem cordis proximè complectitur, id est in corde ipso. Ut verò inventa ibi demonstretur; cohaesio, fabrica, motus, & vis cordis accuratè perpendenda erunt.

## CORDIS FABRICA, VIS, ACTIO.

182. **C**or liberum in <sup>a</sup> pericardio, lymphâ lubricâ irroratum, à quatuor magnis vasis sanguiferis pendulum, <sup>b</sup> septo transverso incumbens, in thorace intrâ mediastini cavum, nullo ambiente pressum nimis, inter <sup>c</sup> medios molles pulmones haerens, commodissimo receptui, & expulsui, cruoris in omnes partes aptatur.

183. <sup>a</sup> Arteriae ejus duae mox suprâ valvulas semilunares sinistri cordis ortae ex Aortâ, <sup>b</sup> opposito itinere unum componentes canalem basi cordis innexum toto ambitu, unde demissae arteriae, variis inter se anastomosibus punctae, in innumerabilia exilissima vascula distributae, omnia sensibilia cordis puncta pervadunt, omnemque fere ejus substantiam cum venis, similiter positis, componunt, accretâ inter vasa pinguedine externâ. Hae arteriae sunt in diastole, dum reliquae corporis arteriae in systole constituuntur. Venae autem suum cruorem partim in <sup>c</sup> coronarias, indeque versus auri-

E 2                      culam

<sup>a</sup> Vesal. l. 6. F. 4. l. B. B.

<sup>b</sup> Id. lb. F. 3. l. D C E F G.

<sup>c</sup> Id. lb. F. 2. l. N O P Q M M.

<sup>a</sup> Low. de Cord: T. 4. F. 3. l. dd.

<sup>b</sup> Ruysch. Ep. 3. T. 1. 2. 3. Thes. 6. T. 5. F. 7. 2.

<sup>c</sup> Low. de Cord. T. 5. F. 2. l. d. cc.

culam dextram inter hanc & cor dextrum, partim intra *a* auriculam dextram & intrâ *d* cor dextrum per singulares venas demittunt: hae venae inaniuntur, dum reliquae corporis venae implentur.

184. Habet Cor, praeter haec vasa (183.), fibras à *a* quatuor tendinibus orbicularibus, ambientibus quatuor ora cordis, ortas, & magnam partem iterum iis insertas. Oriuntur enim inde 1. *b* paucae, tenues, rectâ viâ à basi in apicem per exteriora folius cavi dextri positae, fibrae; quibus firmatur caro ventriculi dextri in Systole, inque expellendo sanguine juvatur. 2. *d* his subjectae in ventriculo dextro à sinistro cordis latere obliquè dextrorsum adscendentes in basin terminatae itinere suo cochleam referunt, 3. *e* his subjacent iterum aliae, à dextro latere cordis in sinistrum latae, utrumque ventriculum ambiendo complexae, ad basin lateris sinistri assurgentes, helicem oppositam facientes cum serie priori (184. 2. *d*). Sunt hae (2. 3.) communes ventriculo utrique acquabili circumductu; constringunt oppositis, synchronis, validis, utrumque ventricu-

*d d* Ruysch. Ep. 10. T. 11. Fig. 4. l. A. Vieuss. Nouvell. decouvert. Vethey. l. 1. Tr. 3. c. 9. T. 21. F. 3. l. bbb.

*a* Low. de Cord. T. 2. F. 1. l. eg.

*b* Id. lb. F. 2. l. acb.

*d* Id. lb. F. 3. l. abcd.

*e* Id. lb. F. 4. l. accbfd.



culum simul comprimendo contrâ septum medium constringentibus, basi apicem adducentibus, fibrarum contractionibus totum cor undique aequaliter; in quo opere juvantur seric aliâ fibrarum, quae 4. *f* vario flexu innexae prioribus (2. 3.), & circumappositae, eas coercent, suoque loco firmant. Vtrum ventriculus sinister proprias habet adhuc binas, densas, fibrarum series, quarum *g* exterior, prioribus (2. 3. & utcumque 4.) subiecta, per totum sinistri ambitum spiritaliter dextrorsum assurgens, septumque partim constituens, in basin sinistri terminata, hoc cavum integrè ambit, similescque iterum (4.) sibi proprias habet. Denique seriei huic (*g*.) supposita est ultima, *b* quae à basi sinistrâ dextrorsum obliquâ spirâ descendentes, ventriculi interiora constituentes, septumque medium absolventes, variâ longitudine, flexu, intortu, spectabiles fibras gerit. Praeter has tandem, *i* columnae carnae, foveae parietum, in sinistro, faciunt simul, ut ventriculus sinister, communi, & propriâ, contractione, fortissimè, arctissimèque, contrahi queat. Dum reliquae fibrae & columnulae in cavo utriusque

E 3

ven.

*f* Id. Ib. F. 5. l. acdb.

*g* Id. Ib. F. 6.

*b* Id. Ib. F. 7. acedb. F. 8. l. a.

*i* Id. Ib. T. 3. F. 1. l. c.

ventriculi natae retinendis in systole, retro trahendis in diastole, valvulis inserviunt.

185. Fibrae illae (184.) ortae à <sup>a</sup> nervis octavi paris magnâ copiâ inter Aortam & pulmonalem arteriam ingressis, hinc auriculis, cordique, insertis, musculari vi faciunt, ut formentur cava cordis, constantia, arctanda accuratè sine destructione fabricae per propriam validissimamque actionem.

186. Sed & hinc patet sinistrum propriâ, orbiculari, dextrum semiorbiculari, & sinistro communi contractione, agi. Quod & inspectio <sup>a</sup> discissi cordis docet.

187. Cor itaque & auriculae, sunt veri muscoli, aguntque vi musculari: dum fibrae omnes (184.) simul breviores factae, longitudinem cordis minuunt, latitudinem augent, capacitatem ventriculorum accuratè arctant, ora ostiorum arteriosorum tendinosa dilatant, opercula venosorum ostiorum ad obthurationem determinant, contenta liquida magnâ vi per ora dilatata in arterias exprimunt. Haec est Systole, violenta cordi.

188. Etenim tum expelli cruorem, atque hâc musculari contractione projici, docet sectâ arteriâ pulmonali, & Aortâ, propè cor in animali vivo aperto, exsiliens sanguis; tum idem expulsus ex corde, apice fur-

<sup>a</sup> Low. de Cord. T. A.

<sup>a</sup> Vesal. l. 6. F. 11. l. I. G.

furfum erecto, transversum circa conum secto; pressio digiti vulneri illi immiffi; tumor, tensio, durities, pallor, fibrarum; Contractio impletionem fequens, non praecedens; depletio brevitatem concomitans.

189. Si nervi paris octavi in cervice ligantur, vel diffecantur, motus cordis languet, palpitat cum angore summo animalis, cessat brevi. Ergò inde origo, atque continuatio, Systoles; quae tamen, ut in omni musculo, cruore coronariarum eget, & humore in cava affluente.

190. Sanguine ità per Systolen (187. 188.) toto fere expulso ex cavis cordis, & ex vasis, fibrae flaccescunt, tenuantur, longiores fiunt, distantia inter basin & apicem augetur, pressio parietum in cava tollitur, valvulae venosorum ostiorum versus apicem cordis per annexas columnulas trahuntur, auriculae contractae implent cava, ut & sinus venosi. Haec est diastole, naturalis cordi.

191. Namque eo tempore cava cordis impleri sanguine evidenter scimus ex arteriotomè circa cor factà, ex corde transversim in vivis secto, erecto, admittente tunc, non eructante, sanguinem; ex ipsa inspectione circa mortem aperti animalis; digiti tunc laxatio vulneri inflicto immiffi. Adeòque non erumpit ex corde cruor ob rarefactionem.

192. Chylus itaque paucus pluri sanguini venoso permixtus, vi cordis mixtus, divisus, conquisatus, omnis in Arteriam pulmonalem propellitur.

## PULMONIS FABRICA, VIS, ACTIO.

193. **C**onsideranda igitur fabrica pulmonis quoad vasa, quibus aërem, & quibus cruorem, habet, ut inde sciatur effectus chylo & sanguini in pulmone accidens.

194. *a* Aërea ejus vasa, *b* rimâ glottide suâ sponte semper apertâ, & formatâ concursu binarum *c* cartilaginum Arytaenoidôn, *d* Epiglottide incumbente sponte elevatâ, accipere, & emittere possunt aërem naribus, vel ore, sorbendum, aut efflandum. Eadem verò rima epiglottide depressâ, & Arytaenoidibus contractis per suos musculos *e* Arytaenoideum, *f* Thyroarytaenoideos, clausa impedit alia praeter aërem corpora. Ubi verò dilatatur per musculos Cricoarytaenoideos & po-

*a* Casser. voc. org. T. 1. F. 2. 3. Ruysch. Th. 3. T. 2 Th. 7. T. 3. F. 3.

*b* Casser. voc. org. T. 1. F. 7. l. 6. T. 13. F. 2. 3. 5. 6.

*c* Casser. voc. org. T. 15. F. 7. 8. l. A. B.

*d* Casser. voc. org. T. 13. F. 2. 3. 5. 6. l. A.

*e* Id. lb. T. 13. F. 3. l. C.

*f* Cowp. app. ad Bidlo T. 5. F. 23. l. g.

g posticos, & laterales, eo facilius admittit, atque emittit aërem.

195. \* Aspera inde arteria cartilaginea, ex segmentis orbicularibus parte posticâ abscissis, ibique membranâ validâ completis, inter se connexis vinculo musculofo forti, facit ut aër semper hiantē fistulâ liberē ire, redire, possit super laevia, lubricaque, membranae latera; ut expandi in orbem queat, & cedere stomacho deglutienti; ut flexo obsequatur collo; denique elongari, accurtarique, facilè ut queat.

196. Ubi dein circâ quartam in thorace vertebram \* bifida, mox in innumerabiles utrimque ramos divisa, propagatur, eâdem fere fabricâ est ac (195.), sed segmenta annularia magis completa; rami ad acutos angulos invicem accumbunt, sensim angustiores, sensim tenuiores, denique ad extremos fines, cartilagineâ indole depositâ, membranacei facti, vi aëris extendentē plicatiles membranulas fiunt sacculi flexiles omni extremo apici cujusque rami adnati, ex quibus vesiculae, ex his lobuli, atque lobi, tandem pulmo quoad aërea vasa totus efficitur.

197. Si ergò Aër, fluidus, gravis, elasticus,

E 5

g Aquap. F. 25. l. 55. & Fig. 24.

\* Vescal. l. 1. C. 38. F. 1. 2. Casser. org. voc. T. 1. F. 2. 3. T. 13. F. 1. 2. 3. 17. T. 15. F. 1. l. G G.

\* Ruyfch. Th. 3. T. 2. Th. 7. T. 3. F. 3.

74 PULMONIS FABRICA,

sticus, glottide in Tracheam & Bronchia admissus inflat hos tubos, ramos, vesiculas, orbicularis amplitudo, fistularum longitudo, augebitur; rami assurgent in majores angulos; lobi erigentur; vesiculae ex planiori per complicationem figurâ in rotundiores extendentur; hinc spatia inter squamosa segmenta, ramos, vesiculasve, augebuntur, puncta contactuum minuentur.

198. <sup>a</sup> Pulmonalis hinc arteria à primo ex corde ortu statim curvata, in innumera- biles ramos divisa, cum asperae Arteriae ramis distributa, ultimis ramis superficiem <sup>b</sup> vesicularum reticulari opere coronat, spacia inter has media simili modo occupat, quae cellulosa vocantur; atque ibi infinitis anastomosis arteriosis gaudens, in Venas exit.

199. <sup>a</sup> Quae simili arteriae (198.) flexu, decursu, texturâ, loco, cruorem arteriâ (198.) advectum, mutatum, vix secretion- nes permanentes passum, revehunt in venas pulmonales majores, in quatuor magna va- sa, per haec in sinum venosum pulmona- lem, in auriculam inde sinistram, & in ca- vitatem laevam.

200. Ex quâ pulmonum fabricâ (194. ad

<sup>a</sup> Ruysch. Th. 3.

<sup>b</sup> Malpig. de pulm. Ep. 1. 2. T. 1. F. 1. 2. 3.

<sup>a</sup> Ruysch. Thes. 4.

ad 200. usque), eorumque mutatione per aërem (197.), atque celeri trajectu sanguinis, & chyli, intelligitur effectus in chyloso cruore productus actione respirationis, nempe:

1. Humor ille vi proximi cordis dextri pulsus in fistulam intortam, conicam, flexilem, elasticam, reprimentem, compingitur, densatur, mutatur in contactu particularum, & in figuris harum, solvitur, conteritur, fluidus retinetur.

2. Motu vesicularum (196.) in pulmone, per inspirationem inflato, sensim paucioribus in punctis pressarum; mutatione spatiorum cellulosorum eodem tempore successivè magis auctorum; motu vesicularum, & spatiorum illorum, in expiratione successivè sensim minorum; Elatere aëris, in quiete retenti post inspirationem, vel expirationem, per calorem assiduè aucto; id fit, ut duobus momentis successivis nec arteriae, venaeve, nec sanguis, aliive in quibuscunque demum vasis pulmonicis humores, unquam sint aequaliter, vel similiter, pressi; sed reciprocè premi, pelli, conquassari, remitti, atteri, minui, resolvi, canalibus trajiciendis adaptari debeant omnia, quae per pulmones fluunt.

3. Chylus adeòque in ore praeparatus, in ventriculo subactus, in intestinis elaboratus,  
in

in lacteis secretus, in mesenterio ad glandulas dilutus, in ductu Thoracis chyliifero magis dilutus & permistus, in venâ cruori confusus, in auriculâ, & corde dextro, accuratius mistus, solutus, subactus, attenuatus, in canalibus conicis, & cylindricis, arteriae pulmonalis validè pressus à postico, repressus à lateribus, figuratur in formam solidarum, & fluidarum, in toto corpore partium.

4. In venis pulmonicis iterum miscetur exactissimè.

5. Et forte lymphâ hîc, ut de sanguine demonstratum, mutatâ in suis organis, diluitur in iisdem venis.

6. Sic videtur induci forma nutriendo apta.

7. Tum fluiditas conservatur, & calor.

8. Summaque permistio fit omnium humorum, particularumque, totius corporis, tam recentium, quam inquinorum.

9. Atque & hic nasci inprimis color ruber, proprius bono sanguini, videtur.

201. An autem partes graves, & elasticae, aeris hîc miscentur cruori pro vitali elasticâ oscillatione, ut docet Eximius Borellus? id nequit fieri in arteriis, nec ullo argumento constat in venis. Quin creditur obesse aer vesicas extendendo venas comprimens in inspiratione; vis comprimens Tho-



racis venas arctans in expiratione; singularis hinc arteriae in venam commutatio; difficilis aeris transitus in meatus parvos, aquae pervios, oleo, & spiritibus; humor lubricus membranae succingentis interiora Tracheae, aeris sanguini infusi noxia.

202. An in usum refrigerii, expellendae fuliginis, aut adducendi spiritus, huc fertur acri exponendus sanguis? juxtà scholas. Sed negat Autopsia, Anatome, Thermometron.

203. Num verò admittere licet, cruorem dextri ventriculi, ob effervescentiam fervidam in dextro corde, aestuantem fere, & ebullientem, in pulmone vi frigidi, nitrosi, aeris condensari, extinguui, refrigerari? Sic Sylvius, sic Chemicorum plurimi. Sed reclamant experientia. An ut aereo, subtili, nitroso, liquore hinc admisto, purpurescat? ita Vir in Arte maximus Lowerus. Sed nec Ille faventem nimis experitur veritatem.

204. Sed, ut à priori, sic ab eventu, scimus, Chylum in dextro thalamo cordis confusum potius quam accuratè permistum sanguini, in sinistro cavo cordis intimè committum spectari; & cognoscimus robore fortium pulmonum fieri omnia (200.), labefactatis vero his, omnia illa minus feliciter absolvi.

205. Postquam ex angustiiis arteriosis in  
venas

venas latiores sic mutatus influit , oppositis urgetur motibus , premitur minus , ab elatere suo rarefcit paulò plus , hinc fpumefcens , floridior , rubicundior , redit in finiftrum cordis fpecum.

206. Eâ lege , ut in auriculâ finiftrâ , licet minore rectâ , iterum magnam partem , mifceatur , fluidus maneat , à concretione , & à feceffu in partes , prohibeatur. Vide & confer ( 163 ).

207. In antro cordis finiftro vix quiefcens chylofus cruor ingenti , veloci , vi Syftoles in arteriam magnam pulfus , protrudit præcedentem , ita movet omnia.

208. Efficacia igitur pulmonum in corpore fano eft majoris momenti , quam aliorum viscerum ; ideòque humor omnis vitalis totus quantus pulmones tranfit , dum per alia viscera tantum certa portio tranfluit ; imò hîc præparatio in nutrimentum , quia chylus omnis hûc derivatur ; quin hîc inprimis officina fanguinis ; atque ejus adaptatio fluori per vafa minima , quae non ita alibi poteft fieri ; quare & hîc fecretioni paratur aptiffimus omni ; denique hîc aptiffimus fit exercendis actionibus cunctis , quae humorum efficaciâ abfolvi in vitâ , & in fanitate , poffunt.

209. Omnia haec fequuntur ex datâ fanguinis & chyli indole , ex datâ fabricâ & actio-

actione pulmonis, ex datâ vi cordis, & ex datâ vi aeris gravis, fluidi, elastici, in vasa figurata aerea pulmonum, & hinc in sanguifera vasa simul.

210. Quid ergò opus aeris, vel fermenti, admistu?

211. Quin tandem explicatae huic pulmonum virtuti quidni imprimis adscribatur mutatio assumti ad nutritionem in materiem, unde acre, volatile, falsum, educi potest? observata quidem Helmontio patri ab aere pendens, non verò explicata, fuit. Videantur super his (ab 193. huc usque) <sup>a</sup> Laurentius Bellini, & <sup>b</sup> Archibaldus Pitcairne, Viri equidem Eximii in eruendâ actione partium ex datâ prius fabricâ; tum <sup>c</sup> Marcellus Malpigijs in scrutandâ partium indole excellentissimus.

## ARTERIAE VIS, ET ACTIO, IN HUMORES.

212. Sed ut porrò intelligi queant ea, S quae sanguini, & chylo, in Aortam, ejusque ramos ultimos, pulso accidunt, assumi oportebit leges hydraulicas, qui-

<sup>a</sup> In lemmat. praemiss. de respirat. in opere de Urin. &c.

<sup>b</sup> In dissertat.

<sup>c</sup> In Epist. binis de pulmonibus.

quibus obediunt humores datâ velocitate, per canales cognitos, versus definitum terminum, circumducti: sunt enim hae alibi demonstratae, & communes cuilibet liquori, per vas quodcunque moto. Velocitates hîc mensurantur ex causis, & effectis, sensu observatis, aut bono ratiocinio cognitis. Canales verò sensu, microscopiis, injectione, ratione, vel hac regulâ noscuntur: ut sensibilia, sic insensibilia in humano corpore.

213. Itaque arteria descripta (132.) impetu distendentis cruoris expandi quidem, tamen eo cessante, suâ sponte se in priorem capacitatem restituere, potest: nam digitum vi immissum valde premit, eo educto sponte se contrahit; in vivo animali plena, in cadavere hominis cum omni suo sanguine extincti parva, & fere vacua, cernitur; flatu distenta resistit, impulsuque aerem fortiter repellit; in minimâ diametro suae contractionis haerens quiescit; quare contractilis potestas pendet à naturâ fibrarum, & à repletis vasculis membranas arteriae constituentibus.

214. Neque est in universo corpore particula ulla sensibilis, quin habeat arteriolam, ut docent vulnuscule, *a* microscopia, *b* injectiones. Hae tamen omnes Aortæ sunt ramuli.

215. Cruo-

*a* Leeuwenhoek ubique in suis opusculis.

*b* Ruyschius in omnibus Ep. & Thes.

215. Cruori pulso in Aortam resistit sanguis arteriosa vasa replens; conica arteriae figura; curvatura ejus; visque elastica; ambientia corpora pondere prementia, & elatere suo; angustia denique vasorum ultimorum. Quare fluit per vasa excessu virium cordis suprâ resistantias aggregatas. Unde & per pulmones vi minori cordis pelli posse spectatur.

216. Inde tamen vis cordis ingens habetur; sive impedimenta, sive valorem excessus supputes; quin id sola docet movendorum copia.

217. Quia ergò omnis omninò sanguis tantâ vi agitur (216.), & ingenti adeò obstaculo (215.) repellitur, in canali pleno, conico, flexili, & fortiter renixo, sequetur necessariò arteriae diastole systolae cordis synchrona, arteriae non naturalis, sed violenta, quum cordi naturalis sit; in corpore sano ubique, eodem tempore, fieri docet vasculorum plenitudo; sentitur ubi maxima, nuda, durâ basi fulta, deprehenditur arteria.

218. Et dum huic diastolae (217.) vis arteriae (213.) fortiter, in contrarium, renititur; simulque ambientium potestas (215.) renixum illum adjuvat; necessariò arteria adjuncta ambientium vi urgetur sanguinem, aliter quieturum, vi illâ, quâ se con-

trahit (213.); fluet inde cruor fluore haud interrupto, saltuoso licet; vocatur haec systole arteriae, quae cordis diastolae est synchrona, ipsique arteriae naturalis, non violenta, adjuvatur regressu valvularum Aortae, & arteriarum coronariarum inanitate flaccidâ.

219. Hi bini motus sunt, qui pulsus arteriarum Medicis dicuntur; in quibus robur, magnitudo, plenitudo, numerus, aequalitas, vel horum contraria, spectari solent quidem; sed ita, ut vix eadem binis sanis adsint communia.

220. Sanguis deinde corde pulsus, nisu obliquo, ad angulum valde acutum, in latera Aortae impingit; ea premit; totâ fere mole suâ in curvaturam ejus incurrit; à figurâ & elatere ejus, ut & à mole resistenti, retropremitur; ergò momento quolibet temporis cuilibet sanguinis particulae conciliatur alius motus, nixus, rotatio, attritus perpetuus, attenuatio, densitas, angulorum detritus, homogeneitas maxima omnibus; atque ex his sequitur totius massae fluor, calor, color, divisio in particulas omnibus vasculis accommodatas, pressio in hiatus laterales, evitatio obstructionis in capillaribus; quae omnia juvantur per anastomoses in arteriis tenuibus, ubi oppositi incurfus, recessus,

com-

a Leeuwenhoek ubique. Ruysch. fere in omnib.

committio, separatio, quolibet fere momento accidens, deprehenditur. Proinde ad explicationem horum nullâ aliâ causâ scientia nostra indiget.

221. Si enim omnia, quae ei adsunt, retinet sanguis, sed solo motu cordis & artèriarum caret, citò concrefcit, magis ad solidi indolem accedit; sed, dum urgetur causis (220.), vitae aptus remanet.

222. Quia verò artèriae sensim augentur numero, & capacitate; alibi arctiores, latiores alibi; omni tempore, & loco, multa perdunt non reddenda; in vasculis minimis resistentia magna, imò fere maxima est; visque impressa multis communicatur ambientibus; erit itaque, coeteris paribus, velocissimus circa cor, tardissimus remotè à corde, motus humorum circumeuntium.

## SANGUINIS NATURA, PARTES, PHAENOMENA.

223. Sed & in ipso sanguine causâ latet ingens hujus in velocitate, & in ipsâ viâ, diversitatis: illi quippe varia inesse docet ortus ejus; secessus spontaneus quiescentis, & extrâ vasa haerentis, in halituosum, ferosum, fibrosum; atque analysis Chémica.

224. Ideòque erunt in cruore 1°. quaedam jam mota, minimâ vi mobilia, ut solida,

lida, laevia, rotunda; erunt 2<sup>o</sup>. tarda, parvâ vi non mobilia, utpote porosa, angulosa, scabra, viscida; unde docemur, per hydraulica, hydrostatica, & mechanica, partes sanguinis eâdem communi vi cordis pulsas, non agi velocitate, constantiâ, directione, iisdem: priora enim rectissimâ viâ, velocitate magnâ & constanti, à corde recedent; atque posteriora tardius, obliquè, vel retrô, urgebuntur per vasa.

225. Quare autem in venis cadaveris cruor mistus, fluidus, non concreescens diu, cernitur; dum in corde, & in arteriis concrevit brevi? forte quia in venas assiduò fluunt liquidissimi humores pressi, nihilque ex iis exhalat, quum in arteriis perdatur continenter fluidissimum, nec in eas redeat quidquam.

226. Et quidem sanguis in vitâ videtur ubique similis ruber; per microscopia verò spectatus constat sphaeris rubris tenuiori, pellucido fere, sero innatantibus; ita ut globi ex sex minoribus conflati rubri sint, sed in partes resoluti pellucidi feri induant ingenium, cujus varii colores sunt. Unde haec materies, moles, figura, color varius, ex ante dictis liquet; difficilius intelligitur quousque haec divisio in minores globulos; scitur verò, quid rubrae crassiores, quid serosae, faciant, & quare adeò necessariae sint in



in sanguine fani, & robusti hominis.

227. Verum ex iisdem hisce definitur facile, quid sentiendum sit de doctrinâ Galenicâ, vel Chemicâ, explicante sanguinis ingenium.

228. Atque concludetur, melius forte diversitates sanguinis in variis, atque inde deducenda temperamenta dicta hominum diversorum, intelligi pendere ab aquâ, sale, oleo, terrâ.

229. Interim & liquet à posteriori, solum motum circumducti sanguinis efficere, atque conservare, ejus misturam, fluorem, calorem, rubedinem: dum augmenta, vel decrementa, absentia, vel praesentia, illius haec secum vel habeat, vel destruat.

230. Quare opus jam erit spectare ea, quae fiunt dum hic sanguis, & chylus, vi cordis, & arteriarum, fertur in capillaria vasa arteriosa circa venulas, glandulas, musculos, excretoria organa, & viscera.

## ARTERIARUM AD CEREBRUM ET CEREBELLUM EUNTIUM INDOLES ET VIS.

231. **A**rteriae Carotidis ortus primò considerandus, & iter: <sup>a</sup> Aorta quidem  
F 3 oriun-

<sup>a</sup> Ruysch. Ep. 3. F. 2. Low. de Cord. T. 1. F. 4. Casfer. voc. org. T. 1 5. F. 1. l. N. N. F. 2. l. K. K.

oriunda corde sinistro, paululum evecta sursum, mox arcuato flexu dat in latere dextro Subclaviam, cui coalescens Carotis dextra aliquo spatio, quasi ex hac subclaviâ orta, assurgit; sinistra verò ex arcu ipso solitariô erigitur. Statim ambae profundo situ, & asperâ arteriâ, defensae, ab incurvatu & compressu liberae, vix ramosae, rectissimo itinere cranium petunt; ubi fere appulsae, *b* carotidem externam largitae, *c* canali osseo munitae, incurvatae antrorsum, depositâ musculari membranâ, *d* datis durae matri ramis; intra cranium defensae lateribus Sella, & durae matris propagine, mox in exteriora piaë matris, & nervorum, datis ramis; cerebro ope piaë matris committuntur, ubi statim in laterales, anteriores, posteriores, ramos dividuntur.

232. *a* Vertebrales verò arteriae, ex superiore parte subclaviarum sursum porrectae, statim inter *b* foramina lateralia septem vertebrarum cervicis receptae, defensae, recto itinere delatae, involucro membranoso vaginali munitae, ramosae, ubi ex vertebrarum foraminibus emerferunt statim sub  
*c* pro-

*b* Barthol. p. 654. F. l. cc.

*c* Low. de C. T. 5. F. 3.

*d* Ridl. anat. Cereb. F. 2. l. hh. 11. Vicuss. T. 17. l. xx. T T.

*a* Cowp. app. ad Bidlo T. 3. 66. 15. 15.

*b* Vesali. l. 1. C. 15. F. 8. l. a.

*c* processu superiori posteriori primae vertebrae retroflexu *d* incurvatae, ibique latiores factae, per magnum foramen occipitis ingressae, depositâ crassiori membranâ, *e* unitae, dein carotidibus junctae, statim mirè dividuntur.

233. Quatuor itaque arteriae (231. 232.) *a* ab oppositis plagis in mutuas aperturas coe-untes, sicque orbicularem in speciem commissae, inde statim ramos emittunt, qui simili apparatu aliis ramis occurrentes iterum tales minores circulos formant, atque eodem artificio per totam piaë matris superficiem in subdivisionem sensui disparentem, fere evanescunt, ut tota haec membrana maximè hâc texturâ constet.

234. Hocce proinde mechanico apparatu agitur ex corde cruor omnis, qui ad tenuem membranam cerebri, & cerebelli, indeque ad substantiam utriusque hujus, pervenit: reliquus enim cruor, qui intra cranium pellitur *a* per arterias binas à carotide externâ ortas, per *b* singulare foramen deinde calvariam

F 4

riam

*c* Vesal. l. 1. C. 15. F. 3. l. V.

*d* Cowp. App. ad Bidlo T. 3. 15. 15. Ridley An. Cer. F. 1. l. E. E.

*e* Ridley An. Cer. F. 1. E E i h h g. d d. c c. Ruysch. Ep. 12. T. 13. Ep. 9. Tab. 10.

*a* Ruysch. Ep. 12. T. 13. totâ.

*a* Ridley An. Cer. F. 2. l. 11.

*b* Vesal. l. 1. C. 12. F. 2. l. R.

riam ingressas , & in durâ membranâ cerebri distributas , solis integumentis crassioribus cerebri & cerebelli dicatur proprius; ut accuratissimâ industriâ impleta per immissam ceram vasa docuerunt Clarissimum hâc in arte Ravium.

235. Unde igitur clarê cernimus , sanguinem ante descriptum à singulari suâ conditione (224.); hâc indole retentâ quam maximê; appulsum ad inferiorem basios cranii superficiem, ibi salivae, mucique, materic liberatum; aut cruore tenaciore vertebrae dato puriorem; flexu suae arteriae retusum; in cavernis juxta latera ephippii à durâ matre factis tardiori parte defoecatum; oppositis nisibus occurrere in vasis descriptis (233.) sanguini per reliquas arterias ibidem appellenti, unde 1. servatâ propriâ naturâ (224.), aut puriori acquisitâ, impetus minuitur nimis compressurus mollem encephali pulpam. 2. accuratissima permistio oritur totius cruoris huc advecti, adeoque similitudo maxima ejus in omni parte. 3. attenuatio, laevigatio, contritus, fluor, aptitudo secretioni, impedimentum concretioni. 4. minor vibratio arteriarum, minor harum in sanguinem actio. 5. supplementum defectus oriundi ex ineptitudine vasorum majorum, minorum-  
ve,

ve, natâ ad transmittendos liquores : quum ab omni plagâ in aliam omnem sit liberum iter.

## C O R T E X C E R E B R I .

236. **S**ed ipsæ illae arteriae sic ordine firmo in <sup>a</sup> tenui meninge intertextae, ut in basi, <sup>b</sup> ab omni puncto hujus perpendiculari fere itinere dimittunt ramulos simili apparatu ἀναστομίαν fabricandos quasi in membranâ insinuatione suâ gyros sulcatos, profundosque, efficientem, in quos moles exterior cerebri, cerebellique, dividitur fere ad medullam usque. Illi verô tractus convoluti in formam intestinorum, in alios minores, similes prioribus, resolvi possunt. Substantia tandem intercepta his maximam partem, & quae in cerebro & cerebello, cerâ injectâ repleto, dein aquâ macerato, & ab omni parte non impletâ abrasâ liberato, superest, apparet congeries vasculorum tomenti instar minutorum, mollissimorum, succulentorum, minimâ vi dissolvendorum, in aquâ simplici per solam suspensionem in pultaceum humorem abeuntium.

<sup>a</sup> Exterior, cinericea, mollis, humidior,  
F 5 haec

<sup>a</sup> Ruysch. Ep. 9. T. 10. totâ.

<sup>b</sup> Id. Th. 1. T. 4. F. 3.

<sup>a</sup> Vicuss. Neurog. T. 3. 6. 7. 11. 13.

haec substantia vocatur Cortex cerebri, cerebellique; cingit ubique, accuratè, totam originem alterius <sup>b</sup> substantiae internae, albißimae, solidioris, exsuccae magis, quae Medulla cerebri & cerebelli vocatur; ita, ut haec ab illâ oriri primò manifestè videatur undequaque, tam in appendicibus, ventriculis, cruribus, medullâ oblongatâ; <sup>c</sup> in interiori verò parte medullae spinalis similis est cortici recondita substantia, quam medullosa ambit, inversâ ratione quam in priori.

238. <sup>a</sup> In cerebello autem adeò haec (237.) clara, ut modus, quo medulla ex cortice prodeat, distinctio, proportio, fabrica, liquidò cerni queant.

239. Quum igitur singulo quoque cordis ictu ingens admodum portio sanguinis, <sup>a</sup> Malpigio una tertia totius aestimata, magnâ & directâ vi impellatur cortici, ille quâdam systole & diastole, licet parvâ, agitur; sed & debebunt adesse vasa venosa ubique ad fines arteriarum, licet visibilia esse nequeant ob tenuitatem suae membranae & molis; debebunt esse quaedam secretoria ex ultimis iis arteriis, ut ubique, exorientia, ut & emissaria tandem; quamvis haud videri queant.

240. Fe-

<sup>b</sup> Id. Ibid.

<sup>a</sup> Vicuss. Neurogr. T. 12. l. gg. T. 13. l. N. N. PP. cc.

<sup>a</sup> De Cerebr. Tr. 1. p. 6.

240. Fecit haec exilitas, ut ratio non satis firma supplere conans, quod negat inspectio, diversa cogitaverit; maximè tamen ubique recepta Malpighii sententia, fabricam glandulae hic omninò inducens, donec contrariam promulgavit Clarissimus Ruyschius, Vir omnes superans in arte detegendi, exponendi, & conservandi minutissima quaeque corporis arteriosa vasa. Quare de glandulis hic agendum prius erit ex inventis praeclaris Sylvii, Stenonis, Wharthoni, Graafii, Malpighii, Bellini, Borelli, Peyeri, Ruyschii, Nukkii, qui facem hic in tenebris praeluxere optimè.

241. Harum quidem 1. aliae simplices, aliae compositae, his plerumque ex illis orientibus, dum communi membranâ vestiuntur aggregatae. 2. simplices humorem proprium per ductus Lymphaticos suos vel chylo, vel cruori venoso, admiscunt; aut in exteriora cutis, vel in superficies membranarum liberarum, ubique in corpore reperiundarum, exhalant: Compositae verò humorem suum in singulâ quâque parte confectum, ab eâ per canaliculum suum in canalem majorem emittunt, & per commune hoc emissarium tandem in cavitates magnas oris inprimis & intestinorum, vel extra ipsum corpus in usus singulares, eructant. Conglobatas quidem dixere primas, posteriores autem Conglomeratas appellarunt.

242. Glandulae simplices fiunt 1. membranâ quâdam exteriori, & tenuiori, cui supposita altera arctê accrevit. Prior fibris circularibus, elasticis, undique comprehendit, arctat, comprimit, exprimit; vasorum parvorum ingredientium & egressorum texturâ maxime constans: posterior crassâ quidem & magis densâ, fibris omni fere versu ordinatis, vasculorumque texturâ intricatâ efficitur, iisdem ferme servitufibus. 2.<sup>a</sup> Arterias excipiunt, harum ramos in membranis illis serie ordinatâ, & firmâ, fulciunt, distribuunt, ad quamlibet minimam particulam glandulae deferunt accuratê ita, ut cera, vel argentum vivum, injecta arteriolas augendo, alia vascula comprimendo, docere falsô videatur totam fabricam arteriosam tantum esse. 3. venas possident simillimo arteriolis cursu dispositas. 4. nervos accipiunt plures, majoresque, quam ulla corporis pars tantillae molis; qui ita quoque in corpusculo hoc dividuntur, ut cuncta occupare videantur. 5. denique <sup>b</sup> vasa Lymphatica appellentia, recedentia.

243. Arteriae autem hae canales sunt conici, inflexi, ramosi, elastici, circumvoluti, ultimâ parte cylindrici, non amplius ramosi, sed jam in venas mutati; antequam  
verô

<sup>a</sup> Nuk. Adenogr. Fig. 18.

<sup>b</sup> Nuk. Adenogr. F. 27. 28.



verô sic mutantur arteriolae anastomofibus infinitis , posituris variis , ad angulos innumerabiles , inter se communicant ita , ut admodum " variâ ratione ultimi hi fines se habeant in variis glandulis.

244. Ideo , cruori arterioso ad glandulas pulso accidit motus magnus ; renixus ingens ; compressio ; pressio in partes mutua ; pressio obliqua ; contactuum permutatio assidua ; applicatio , multiplex ubique hic , ad minima quacque puncta canalium ; rotatio quolibet momento varia in particulâ quâcunque ; pressio opposita ; secessus in ramos ; recursus in ramos ; attenuatio ; attritus , fluoris conservatio ; soliditas ; politura ; secretio ; permistio.

245. Interim plerumque rami ex trunco arteriae orti arctiores sunt trunco ibidem haerente ; sic fit & in minimis ; adeoque & rami ultimi trunco ultimo minores ; trunci ultimi rubram , crassissimam , partem sanguinis transmittunt , initiis venularum infundunt ; rami angustiores recipiunt partes tenuiores , fluidiores , pellucas , aperturæ suae diametro minores , per vim obliquam , oppositam , validam , pressas.

246. Sed humor hic subtilis , crassiore orbus , non est sanguis amplius , sed alius , isque varius ; sudor , perspirans , materies pororum ,

rorum, lachryma, cera adiposa, cerumen, mucus, saliva, sputum, linimentum, lymphæ, serum, bilis, semen, oleum, lac, pinguedo, &c. propterea rami ultimi (245.), amisso priori nomine arteriæ, appellantur ab indole humoris sui; quumque iterum sæpe induant omnes arteriæ proprietates, habebunt & suos tenuiores ramos, & venas; hinc arteriæ & venæ æquæ sunt lymphaticæ, quam sanguiferae; nec cognoscitur ubi nam huic progressui finis sit; sed saltem inde ortus, progressus, finis, munus, lymphaticorum vasorum intelligitur.

247. Tamen rami cujusvis forte talis arteriæ (245. 246.), non magis jam ramosi, sed recti, in membranulâ glandulosi folliculi minimi tenuissimâ digesti, osculis in fine apertis suos humores eructant in cavum commune ab illâ membranulâ factum, ubi undique collectus quodammodo hæret, estque lymphæ glandulosa, ibi confecta, & aggregata.

248. Quin credibile sit nervos glandularum quoque simili apparatu, suos spiritus hic evomere, lymphæ illi (247.) miscere, sicque suppeditare dotes ex ejus naturâ pendentes.

249. Interim arteriæ lymphaticæ (246.) suam lympham, suis traditam venulis valvulosis, vocatam nobis Lympham vasculosam, adferunt ad eas sæpe glandulas, diver-

diversoque apparatu in eundem folliculum (247.) immittunt, lymphae glandulosae, spiritibusque miscent, amissum subtilissimum reddunt.

250. Tum compositus ille humor (249.) per venas Lymphaticas egredientes, vi contractili fibrosae membranae, motu arteriae, pressu musculorum, agitur in alias glandulas ibidem eadem (249.) denuo passurus, indeque in cisternam lumbarem, ductum thoracicum, vel venas corporis sanguiferas. Atque hae quidem videntur glandulae toto corpore Conglobatae.

251. Verum aliarum alia ratio, dum folliculus ille (247.) suum receptum liquorem statim per suum emissarium expellit in cavum quoddam commune; ut in sinus frontales, cryptas maxillae superioris, cellulas ossis sphenoidis sub ephippio, latebras ossium spongiosorum in naribus, cavitates narium, lacunas tonsillarum, mucus secretus deponitur, colligitur, mutatur. Sic oris, meatus auris, faucium, laryngis, asperae arteriae, bronchiorum, oesophagi, ventriculi, intestinorum, glandulae mucilaginosae se habere videntur. Quae glandulae simplices excretoriae vocari poterunt.

252. Rursum aliae simili apparatu (251.) confectos humores per emissaria propria ex cavo orta emittunt extra cutim.

253. Hinc

253. Hinc distantia Arteriae à corde ; situs ratione cordis , & trunci unde oritur ; varia ejus complicatio ; diversa per eam velocitas ; proportio singularis rami ad truncum ; tum diversa vis exprimens externa , & interna ; mora in cavo communi ; distributio inde in loca iterum per suam structuram humores immutantia ; liquidissima pars secreti exhalans , vel separata ; faciunt ut ex eodem cruore multiplex varietate humor variis locis secernatur , secretusque mutetur mirabiliter.

254. Causae illae (253.) variis locis corporis variae , solae , vel combinatae , deprehenduntur reipsa in fabricâ sensibus detectâ , vel ex eâ deducuntur summâ cum evidentia per leges Mechanicas certas , & per cognitionem naturae humorum omnibus facilem , & praesentem : ergo innumerabiles species secretionum , & secretorum , intelligi possunt.

255. Prorsus ut non sit opus fingere huic operi (254.) poros certâ , variâ , immutabili , figurâ praeditos : maximè , quum repugnet legibus naturae tales adesse , aut , praesentes si sunt , ita agere.

256. Longè minus licet precario advocare ad id negotii (254.) fermenta ulla , specie massae spissae , vel fluidae , concepta ; sive ea fermentantia , praecipitantia , coagulantia ,

lantia , solventia , immutantia , assimulantia , cogites : nulla enim his causa , origo , materies , locus , admistio , efficacia , proportio , perennitas , effectus , finis , adscribi ullatenus possunt.

257. Verum ex glandulis hiscè descriptis simplicibus ( 242. ad 254. ) , aut ex aliis , quae iis quam simillimae , adunatis inter se per vasa communia , unâque omnibus communi membranâ connexis , glandulae nascuntur compositae , Conglomeratae dictae. His unum plerumque commune emissarium est , quod excipit humorem ex cunctis emissariis partium immixtum , eum colligit , & in cavum aliquod majus effundit. Tales Innominata Oculi , Parotis , Pancreas , &c.

258. Imô & commune receptaculum illud ( 257. ) , in emissarium desinens ( 257. ) , 1°. saepe abit in vas quasi arteriosum , flexum , humores immutans , eosque deinde arterioso apparatu in alveum patentem effundens , ut in teste masculino , Higmoriano ductu , epididymide , vase deferente , vesiculis seminalibus , exemplum habetur : 2°. aut statim eructat in emunctorium commune.

259. Hinc autem certô scitur , ope glandularum separari à sanguine arterioso aquam , lympham , serum tenue , hisque permistos sales , tum spiritus , atque oleorum partes

subtilissimas ; haec verô omnia vel stagnantia certis locis colligi , mutari , accumulari ; vel per minora vasa pelli usque in minutissima loca corporis , ad motum , nutrimentum ; inde per suas venulas redire in cor , aut exhalare ; eam denique partem cruoris , quae ab hoc opere in arteriis superest , ingredi venas sensim latiores , misceri simili sanguini , dilui lymphâ , redire in cor.

260. Quare sanguis arteriosus circâ cor dilutissimus , sensim crassescens , in fine arteriae , id est in principio venae , crassissimus , facilê concreturus , maximê viscosus , est : ideô requirit vas impos obstrui , & admissionem humoris diluentis , id est lymphae functae suo munere , & reducis versus cor , tum & spirituum : oportet autem haec ei contingere antequam denuô agatur in arterias pulmonales : nam aliter uni tantum circuitui absolvendo par esset sanguis.

261. Inde cognoscitur locus , ubi vitae constantia , & sanitas , maximê periclitatur ; scitur quantum boni vasa majora , humores crassiores , vasa minora , humores subtilissimi , robori , constantiae , flexilitati , corporis tribuant ; intelligitur cur venae sensim patentiores , laxae , concursui humorum , & dilutioni aptae , haec agant ante novum reditum sanguinis in cor.

262. Sed tamen glandulae quaedam aliâ fabricâ

fabricâ construi videntur ; ita sc., ut arteria humores advehens cruorem crassiores det venae sociae per anastomoses ex arteriâ in venam patentes ; deinde verò solitaria pergens , atque in gyros complicata , ultimò suo ore eructet in receptaculum commune humorem singularem , praeparatum , sanguine ortum , sed ab eò diversum. Videatur Leal Lealis *ἐν ἀρεμιαπζόντων ὀργάνων*.

263. Quum igitur Hippocrates, Wepferus, Malpigijs, corticem cerebri follicitè conspectum conferrent cum fabricâ glandulae ; deprehensâ evidenti oculis similitudine, censèbant corticem cerebri verè glandulosum esse ; Malpigijs verò definivit glandulas has ovalis figurae à compressu vicinarum angulosas, tortuosè locatas, parvas, aliis nexas primò paulò majores constituere, ex his iterum majores condescere, tandem harum aggregato fieri intestinis convolutis similem molem, atque ex his corticem exteriorem. Ita ut arteriolae Carotidis, & Vertebralis, ramuli minimi, hic convoluti in structuram glandulae, infinitis minimis osculis exhalarent subtilissimum ex cruore appulso humorem, cum instillarent folliculo suo, inde pellendum deinceps in emissarium, reliquo inde per venulas reducto in sinus. Confer (236.).

264. Malpighianae quidem sententiae faver oculus ; microscopium ; coctio cerebrum quasi in moleculas glandulis similes dividens ; affusi ad corticem atramenti deterfio, assurgentes , & rimis distinctas , moleculas describens ; cerebri morbofi in lapidem mori fructui similem concretio ; ejusdem contusi ex aperturâ fracti cranii in fungum quasi glandulosum corruptio ; partium cerebrum externum constituentium per hydro- pem in sphaerulas evidentes mutatio : Illa quippe cuncta evincunt , eum hic esse apparatus , licet subtiliorem , ac alibi in glandulis.

265. An verô ultimus ille ramulus potius rectâ continuatione fiat ipsa fibrosae , mox tractandae , substantiae cerebri , origo , ut ex <sup>a</sup> Ruyschianis dictis pateret , nullo certê argumento satis firmo constat ; prae tenuitate evanescentibus ab acie nostri visus ultimis hisce. Interim tamen maximê probabilis haec videtur sententia , propter multas , gravesque , rationes , statim commemorandas ( 269 &c. ) : effectus saltem in utroque casu fere intelliguntur iidem esse.

266. Ultimi proinde hi ramuli ( 265 ), vel  
folliculi

<sup>a</sup>. Ruysch. Th. 6. p. 55. 56. Ep. 12. T. 13. 14. 15. in omnibus figuris.



folliculi illi minimi glandulosi (263) <sup>a</sup> emittunt tenues fibras, albas, compactas, quibus adunatis fit callosum, medullosumque, corpus, cui cortex incumbit & nectitur crescens, tam in cerebro, quam in cerebello: ita ut nullibi sit corticalis substantiae finis, ubi non deprehendatur simul ipsius callosi, vel medullosi, corporis inchoamentum.

267. Quinimò corticalis illa machina ita se accommodat meduloso corpori, ut non modò cerebro, & cerebello, extrinsecus accrescat; verum & <sup>a</sup> appendices extimas corporis callosi, ventriculos ad exortum spinalis medullae, oblongum spinalis medullae extrà cerebrum tractum, comitetur; ita tamen, ut <sup>b</sup> ibidem intra partem medullosam conditus cortex haereat, sinu medio intercepto, vasis arteriosis numerosissimis irrigatus.

268. Adeoque in omni loco *ἰσχυράλῃς*, ubi arteriolae (263.) minimae, nec visibiles, venulis invisibilibus, tamen necessariò hic admittendis, occurrunt; ibidem corticalis haec moles deprehenditur, tam in recessibus, circumvolutionibus, hiatibus, interstitiis, appendicibus, quam in superficie externà cranium spectante.

G 3 269. Ab

<sup>a</sup> Id. Ibid.

<sup>a</sup> Malpig. de Cereb. p. 3.

<sup>b</sup> Ruysch. Th. 1. p. 43. 44.

269. Ab omni ergo *a* puncto corticis quum exoriatur aliquid medulloſi, id in initio ſui ortus tenuiſſimum quoque erit; junctum aliis ſimilibus ſenſim craſceſcit, ſicque tandem ſenſibile evadens conſtituit medullam cerebri, *c* corpus calloſum, *d* medullae oblongatae crura, *e* Thalamos nervorum opticorum, *f* medullam oblongatam ejusque crura, tubera, tum *g* cerebelli medullam, ejusque *b* producta in medullam oblongatam cerebri, quae, his acceptis, in *i* pyramidalia, & olivaria, corpora, & in medullam ſpinalem exporrigitur; ab hac verò medulloſa mole, tam *k* intrâ cranium, quam *l* intrâ thecam vertebris unitis fabrefactam, oriuntur omnes, quotquot ſunt, nervi.

270. Quod verò prima haec filamenta ſeparata, & diſtincta à ſe mutuò ſint, licet adunata unum compactum corpus efficere videantur, clarè quidem patet conſideranti horum *i*. ortum, elementa, progreſſum dum

*a* Vieuff. Neurogr. T. vi.

*b* Id. Ibid. B. B. B.

*c* Id. Ib. T. 3. F. D. T. vi. C. D.

*d* Id. Ib. T. vi. F. F. T. vii. DD.

*e* Id. Ib. T. vi. HH. T. vii. F. F.

*f* Willis Cer. F. i. C.

*g* Id. Ib. F. viii. S. T.

*b* Id. Ib. F. viii. P. T. R.

*i* Ridl. Cereb. F. i. o n.

*k* Will. Cer. F. i. Ridl. Cer. F. i.

*l* Will. de Nerv. T. xii. Vieuff. Neur. T. xx.

dum adhuc solitaria; 2. piscium, leporum, ovium, boum, cruda, vel cocta cerebra, in quibus manifestae apparent fibrillae depresso cylindricae pectinatim sibi mutuo appositae; 3. vasa sanguinea tenuia inter ipsas fibrillas interposita, manifestam divisionem facientia; 4. interpositum corticem in medulla medullae spinalis inter ambientem medullam; 5. fibras albas per medium corticis affusi dispersas in parte posticâ medullae spinalis adhuc intrâ cranium latentis, & ad latera ejusdem principii adhuc in cranio, omnium optimè in appendicibus callosi corporis, & in cerebello ipso; 6. collectionem, & dispersum, fibrarum medullofarum, in medullam oblongatam, & ab eâ in nervos.

271. Decursus harum fibrarum talis quidem cernitur; 1. ab omni parte *a* sphaerae corticalis *b* medullam ambientis, natae distinctae fibrillae centrum quasi sphaerae petunt, sic primò medullam formant, deinde verò reflexae ex eâ colliguntur *c* suprâ quidem in callosum corpus & fornicem, *d* infrâ verò in crura anteriora & posteriora medullae

G 4 oblon-

*a* Vieuss. Neur. T. II. III. IV. V. VI. Will. Cer. I. 2.

3. 4. 7. 8.

*b* Vieuss. T. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Will. Cer. T. III. IV.

*c* Will. T. III. IV.

*d*. Vieuss. T. VI. L. FFHH. Will. T. III. L. DD. EE.

oblongatae, inque <sup>e</sup> tuber annulare; 2. <sup>f</sup> à cerebello similiter ortae, collectae, committuntur praecedentibus jam collectis, ita quidem, ut <sup>g</sup> tribus diversis viis his uniantur; 3. hinc omnes, ex utrâque hâc origine unitae in unum fasciculum, jam constituunt unam medullam spinalem; 4. <sup>b</sup> ex cortice intrâ hanc condito ortae similes fibrillae undique, & ex quolibet hujus puncto, apponunt se cavae superficiëi medullae, cum eâ uniuntur, illique incrementum dant novum.

272. Quum itaque sic constet sibi haecce fabrica, evidens est ratio molis, figurae, positionisque, corticis Cerebri; atque patet has commodê tales non potuisse obtinere, nisi fierent cavitates, ventriculi dicti, quorum proinde necessitas liquet, dum simul id boni praestant, ut mutuum impedimentum tollatur in omni parte cerebri, libertate sic toti medullae conciliatâ; inde etiam manifestatur origo tuberum, quae in medullâ deprehenduntur variis locis, dum diversis nempe plagis accedunt novae fibrarum medullarium copiae.

273. Quin credibile est admodum fibrillas cerebelli medullosas à loco inferiore suae  
com-

<sup>e</sup> Will. Ib. L. O. O. T. 1. L. C.

<sup>f</sup> Vicuss. T. XII. L. G. G.

<sup>g</sup> Id. Ib. L. M. G. N.

<sup>b</sup> Malpig. Cer. p. 3. Ruysch. Th. 1. p. 43.

commiffuræ furfum adfcendere verſus anteriora medullæ oblongatæ, atque nervis ibi oriundis ex medullâ cerebri dare ſimul quafdam à cerebello ortas, ſervatâ ſemper accuratâ diſtinctione originis, progreſſus, muneris: nam id manifeſtum eſt contemplanti varias <sup>a</sup> inſertiones medullæ cerebelli in medullam oblongatam cerebri, ejusque inde aſſurgentem molem; tum etiam ex conſideratione ipſius <sup>b</sup> nervi ſpinalis ex ipſâ thecâ vertebrarum retrogreſſi in cranium, ut ſe jungat nervo ibidem paris octavi. Reliquæ autem cerebelli fibræ ſic miſcentur fibris cerebri, ut forte vix ulla ſit plaga totius medullæ oblongatæ, & ſpinalis, ubi non deprehendantur fibræ tam cerebri, quam cerebelli, miſtæ, adeoque ad corpus cujuſcunque nervi componendum ubique omnino concurrentes ad diverſos planê, & diſtinctos, effectus.

274. Quicunque cogitat 1. corticis expoſitam naturam (263. 264. 265.), atque inde oriri fibrillas medulloſas diſtinctiſſimas (270); 2. tum ſimilitudinem hujus apparatus cum omni parte aliâ totius corporis; 3. ingentem copiam tenuiſſimi, puriſſimi, mobiliſſimi, cruoris arterioſi non ſpoliati parte

G 5 ſubtri-

<sup>a</sup> Vieuff T. XII. L. MM. GG. T. XIII. L. RR. Will. T. III. L. II.

<sup>b</sup> Will. T. I. L. MMLL.

subtilissimâ , magnâ vi à corde propinquo huc appulsi ; 4. laticem tenuissimum intrâ ipsam substantiam medullosam dissectam semper tactu , visu , inprimis per microscopia , ubique deprehendi ; qui in aegritudine cerebri male affecti saepenumero multum augetur ; 5. venas à piâ matre , cortice cerebri , & cerebelli , cruorem in sinus venosos reducem per venas cordi reddere ; 6. assidua , ordinata , proportionalia , ipsorum horum staminum , à primô vitæ puncto ad ultimam vitæ metam , incrementa , nutrimenta , propagines , & reductiones : Ille judicabit , fibras has canaliculos tenuissimos pervios esse , qui in se excipiant humorem corporis humani omnium quidem subtilissimum , qui fabricâ mirificâ corticis præparatus , secretus , atque vi in has fistulas impulsus est , ex omni quidem parte hujus in medullam oblongatam collectus.

275. Si enim iterum juvat perpendere 1. ingenium illius sanguinis , qui arteriis carotidibus , & vertebralibus huc appellitur (224. 235.) , ejusque discrimen ab omni residuâ cruoris massâ ; 2. structuram subtilissimam , in tomentosum quasi halitum evanescentem , & mollitie quasi suâ sponte fluentem , arteriolarum à carotidibus & vertebralibus ortarum , suoque imperscrutabili implexu , & contextu , corticis texturam com-

componentium (236.) ; 3. naturam singularem illius humoris , qui canalibus his contentus (274.) , sponte quam citissimè exhalare , nec ad ignem concreescere , sed penitus in auras abire deprehenditur , dum coeteri humores corporis cōire ad ignem , vel foeces multas derelinquere solent ; 4. vim , celeritatemque , quam huic inesse docent effectus in nervis , musculisque , assiduò observati ; Ille facile credet , partes hoc fluidum componentes esse solidissimas , tenuissimas , mobilissimas , simplicissimas , fluidissimas , omnium humorum nostri corporis.

276. At verò , dum spectatur *a* microscopiis rubra cruoris pars esse crassissima totius massae humorum salubrium ; interimque ferum , cujus partes longe tenuiores , divideat in corpuscula incredibili ratione minora , ut in *b* foetu in ovo incubato oriente patet , ubi successivè adeò attenuatur humor albuminis , donec aptus evadat fluere per vascula ultrâ imaginationem parva Embryonis omnia ; atque in minimis insectis infinita , diversaque , vasa suis penetrantur humoribus , quibus tamen *c* minora longe in semine humano cernuntur ; patebit clarè humoris illius tenuissimi partes longè minores con-

*a* Leeuwenhoek ubique.

*b* Malpig. in 2. tractat. de ovo incub. & Bellin. de Ovo.

*c* Leeuwenh. sparsim de His.

concupiundas esse, quam vulgò quidem putari solet.

277. Atque licebit asserere, longè alienae indolis esse hunc humorem, quam qui compareretur salibus quibuscunque demum ullâ arte demonstrandis; quoniam omnes ejus proprietates hinc recedunt quammaximè. Longè minus olea illi componi possunt nota hætenus; quippe quæ meatibus harum fibrarum inimica sunt. Neque spiritibus ex vegetanti materie fermentando productis similis est; quia hi fibras, si sinceri habentur, exsiccatas mox ineptas reddunt suis muneribus. Quare aquae subtilissimae forte spiritus hi maximè conveniunt, utpote quae miscibilitate, mobilitate, soliditate, blanditie, simplicitate, absentiâ elasticitatis, eis similis sit: licet tamen ex aliâ materie productos mutatio liquoris in ovo incubato doceat.

278. Rursum convincimur, copiam ingentem esse hujus humoris, & quolibet momento vitae illibatae recentem iterum fieri: etenim magnitudo carotidum & vertebraliū; harum iter rectum, expeditum ab omni impedimento; copia ingens cruoris appulsi; motus major, quo urgetur; magnitudo corticalis compagis, id evidentissimè docent.

279. Et quoniam apparatus hujus totius encephali munitur tegmine ossco; nullâ com-



comprimitur pinguedine ambiente, musculo, vel alio quocunque demum corpore; ipsaeque arteriae, & sinus tuto itinere, semperque eodem, decurrunt, crit acquabilis horum confectio.

280. Interim medulla oblongata, & spinalis, constantes fibris medullosis collectis, emittunt intrâ cranium <sup>a</sup> viginti diversis locis decem dicta falsò paria nervorum, quum reverâ plurimi horum multis, distinctissimis, magnisque, nervis constant; ex <sup>b</sup> medullâ autem spinali extrâ cranium egressa oriuntur simili modo triginta nervorum paria, admodum composita; & unum par ex thecâ vertebrarum colli circâ quartum par vertebraliū nervorum, ramis sensim in adscensu auctum & spissitudine, pari octavo jungitur.

281. Nervi hi omnes, dum intra medullam latitant, pulposi, in ipso exitu à medullâ membranæ piæ nanciscuntur vaginulam, quâ defensi pergunt ad duram membranam, quae pertusa est in patentes vaginas protensas usque ad foramina cranii nervos transmittentia, ibique adscitâ sibi hâc vaginâ transeunt novem priora paria, & par accessorium, mirabili, tutoque, itinere ex cranio; reli-

<sup>a</sup> Will. Cer. T. I. D. E. F. G. H. I. Kk. Ll. N. O. Ridl. Anat. Cer. F. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

<sup>b</sup> Vicuss. T. xx. F. 1. 2. 3. Tab. xxi.

reliqua verò triginta & unum paria per artificiosa spatia, inter commissuras apophy-  
sion vertebrarum nata, deorsum lata descen-  
dunt; unde hinc emergentes mox a firmi,  
duri, muniti, disperguntur per omnia, vel  
minima, puncta omnium partium solida-  
rum, quae notae hactenus sunt.

282. Involucra verò (281) horum ner-  
vorum a vasis sanguiferis, lymphaticis,  
aliisque arctissimâ texturâ ubique investiun-  
tur, unde nervum, ut talem, non faciunt,  
tamen ejus colligendis, firmandis, deducen-  
dis, fibrillis necessaria sunt, & pariunt in-  
tellectum multorum in nervis phaenome-  
nôn, & morborum.

283. Ubi verò ultimi nervorum fines in-  
gressuri partes, ad quas pertinent, iterum  
deponunt acquisitas prius tunicas, moxque  
expanduntur vel in speciem tenuissimae mem-  
branulae, vel in mollem pulpam.

284. Si porrò attento quis animo intelli-  
git, 1. quod medulla (270. 274.) tota vas-  
culosa impendatur constituendis nervorum  
fibrillis, imò in eas ipsas solâ continui por-  
rectione abeat; 2. quod compressâ, di-  
scissâ, putrescâtâ, exesâ, medullâ cerebri  
aut cerebelli, omnis actio per nervos inde  
oriundos exerceri sucta statim aboleatur, li-

a Ruysch. Th. III. T. 4. F. 4.

a Ruysch. Ep. XII. p. 26. 27. Tab. 13. L. C. D.

cet nervi in integritate suâ & membranis intacti perstent ; 3. quod nervi ipsi ubique laxi, penduli, curvi, retrogressi, obliqui, sint, tamenque promptissimè motus, sensusque perficiant ; 4. quod tamen compressi, constrictive, licet integri, nervi omnem movendi, sentiendique, facultatem amittant in iis partibus, quae inter ligaturam & extrema loca, ad quae porriguntur illi nervi, ponuntur, illibatâ potestate suâ inter ligaturae locum & intra medullam cerebri, cerebellique ; Ille certissimè concludet, fibrillas nerveas humorem medullae (275. 276. 277) assiduô recipere, transmittere, ad omne punctum totius corporis distinctissimis viis deferre, hocque solo usu omne suum munus integrè absolvere.

285. Nec ullâ proinde veri speciei ferri potest sententia asserens nervos omnem suam exercere actionem vibratione ex tensâ fibrillâ pulsâ pendente : dum repugnat naturae mollis, pulposi, flaccidi, nervi (284. 4.) ; & maximè accuratae distinctioni, quâ representantur sensuum objecta, & peraguntur motus musculares.

286. Quemadmodum ergo arteriosus cruor, & lympa, in omnes plagas corporis his vasis instructas movetur perpetuô ; ita intelligimus omni momento vitae, à cerebro, & cerebello, vi cordis & arteriarum, per

per nervos in omne punctum solidi corporis propelli humorem cerebro & cerebello corticali paratum.

287. Tenuitas tandem tomenti vasculosi Ruyschiani in cortice, quod tamen adhuc tantum arteriosum inprimis est, adeoque incredibiliter crassius ultimo laterali inde derivato emissario, docet quam gracilia sint nervosa illa stamina cava: sed magna moles ἐκπεφύλας, comparata cum hac exilitate cujusque fibrillae, demonstrat earum numerum ultra imaginationis limites magnum: rursus ingens, perpetua, violentè acta, copia humoris huc appulsi facit, ut certa sit horum canaliculorum perpetua plenitudo, apertura, actio.

288. Interim tamen persuademur, motum hujus liquidi per haec vascula nimio impetu carere: etenim arteriolarum numerus, exilitas, curvatura, textura; ut & nervorum numerus, exilitas, inflexio, variis locis variata durities, evincunt aequabilem, perpetuum, sed lenem satis, esse ejus fluxum.

289. An igitur mirum Tibi videtur, quod humoris hujus praesentiam, & motum, non assequatur oculus? quod ligaturae, vulnera, puncturae, suctiones, antlia aëria, injectio, non valeant oculo eum exhibere? quod cavitates nervorum nullâ arte queant aciēi visus objici? Certè qui haec eo animo  
tentat,

tentat, nescit naturam horum vasculorum, & liquoris ipsius. Qui verò oculum fugientes, & artem eludentes, cavitates vasculorum ideò negat; ignorat sanè rationem corporis nostri in origine, progressu, operationibus, excretionibusque; nescitque insectorum fabricam; non attendit denique ad ea, quae plantis manifestissimè accidunt.

290. Crassius ideò quoque error est, lympham ex sectis caudae bubulae nervis stillantem, satis spissam, agnoscere pro eo, quem jam descripsimus, humore. Nec liquor carotidi vivi animalis injectus nervos tingens cavos nervos demonstrat. Nec tumor in nervis juniorum ligatis assurgens argumentum est eidem quaesito.

291. Humor ille, ob simplicitatem, subtilitatem, mobilitatem, volatilitatem perfectam, appellatur Spiritus nervorum, isque vitalis, vel animalis. De quibus postea.

292. Quum verò quolibet momento reficiatur novus, adeòque priorem posterior urgeat, videtur ultimò functus suo munere ex ultimis filamentis impelli venulis Lymphaticis minimis, tam circa glandulas, quam alibi, inde venis Lymphaticis paulo majoribus, rursusque ex his ad Lymphatica vasa communia, quae valvulis praeditae venae sunt, tandem in venas, & cor; sicque

H

verè

verè instar reliquorum humorum circuitum per vasa perpetuum absolvere.

293. An verò probabilius videtur, humorem hunc ultimò in viis cœccis fisti? an potius crederes refluerè in primam, unde effluxit prius, scaturiginem? an tandem putabis exhalare ex corpore? sane vix hæc verisimilia fiunt.

294. Cruor tandem cerebri & cerebelli, spiritibus secretis orbus, in *a* venas cerebri & cerebelli depellitur, ex his venis in *b* Sinus, seu receptacula venosa magna, inde, sine comite arteriâ, per foramina cranii in *c* saccos venosos, inde rursus in jugulares internas, subclavias, cavam, cor.

295. Lympha interim hîc, ut ubique, à cruore arterioso secreta, in omni parte cerebri, & cerebelli, ut & omnis illa, quæ in ventriculos continenter effusa fuit, redit in *b* Lymphatica hic vascula, in *c* infundibulum, *d* glandulam pituitariam, venas jugulares, cor. Ita ut & hujus per *ἐκέφαλον* circuitus perpetuus fiat.

296. Quao

*a* Vicuss. T. 1. in punctis nigris. T. 2. L. DD. T. 3. J. GG. H. H. Ridl. F. 3. l. kk.

*b* Ridl. F. 4. L. pp. eccc.

*c* Ridl. F. 4. \*\*. Vicuss. T. 1. GG. HH.

*a* Vicuss. T. vi. L. BDB.

*b* Ridl. F. 3. l. 44.

*c* Ridl. F. 2. N. 3. F. 1. L. 2.

*d* Ridl. F. 2. N. 11.

296. Quae omnia edocti intelligemus responsa ad haec quaesita: Cur cerebrum, & cerebellum, cum suis appendicibus, thecâ osscâ muniuntur, & quid inde boni? quare theca vertebralis toti datur spinali medullae? cur muscoli, glandulae, pinguedo, hic absunt? cur arteriae carotides & vertebrales hic non comitantur suas venas, sed distincto itinere, per alia longè foramina feruntur? cur sanguis intrâ cranium in Sinus, certis locis positos, evacuat, & cur non rectâ iterum exit? Cur venae oppositis viis in Sinus se evacuant? Cur figura cerebri sphaerica? unde, & cui usui, ventriculi? quid facit plexus Choroëides? quid boni à falciformi, & ab altero, processu durae matris? cur cerebellum ventriculis caret, seorsum ponitur, tutius reconditur, quam cerebrum? cur nervi molles, sub mole cerebri & cerebelli exeuntes, non comprimuntur, sed liberi exeunt? an omnium nervorum origo, & finis, terminatur in glandulâ Pineali?

297. Patebit sane attendenti ad haec omnia, quod adorandâ sapientiâ sic fabrefacta hîc vasa sint, ut aequabilis, non impediendus, hic sit humorum motus circulatorius, & secretorius: pariter ut calor foveatur perpetuus aequè arterioso, quam venoso, sanguine, qui deficeret aliter in vasculis tenuissimis: denique ut commodissime Lympha

redux venoso cruori committi, & permisceri, posset, in quocunque demum situ caput positum fuerit.

298. Cruor porrô ab ἰσχεφαίλω redux, perfunctus hujus munere, lymphâ dilutus cerebrosa, mistus novo chylo, lymphae, bili, cruori venoso, forte & spiritibus simul in venas iterum infusis, corde receptus, ex eo in pulmones pulsus, per eos iterum mutatus (200), rursus induit eam indolem, quam habuerat, antequam cerebrum peteret.

299. Si enim nihil crudi illi inhaerescit, certe omni hoc novo apparatu iterum evadit aptissimus, qui ope fabricae cerebri & cerebelli denuô spiritus novos suppeditet.

300. Quare etiam credibile est, certam totius sanguinis portionem (224.) ita ire, & redire, hanc viam, ut vix misceatur alterius indolis cruori, sed hic patiaturs circuitum frequentiore, celeriore, acquabilioreque.

301. Denique, si contemplamur ingentem molem cerebri, cerebelli, medullae oblongatae, medullae spinalis, comparatione habitâ, molis verè solidae reliqui corporis; numerum maximum nervorum inde egressorum, & ubique distributorum; cerebrum, & carinam, id est medullam spinalem, esse basin in embryone, unde reliqua viscera, & partes, deinceps generantur, teste egregio  
Mal-



Malpigio ; vix ullam esse particulam corporis, quae non sentiat, vel non se commoveat ; credemus fere , omnes partes solidas corporis contextas esse fibris nervosis, atque iis constare.

302. Non erit quoque absurdum credere, quod in toto corpore vas minimum ex arteriâ ultimò exortum evadat simillimum fibrillae minimae nervi, quoad magnitudinem, humorem contentum, proprietates reliquas.

303. Portio sanguinis illa, quae caput petebat, sed per arterias laterales vecta non impendebatur conficiendis spiritibus, a durae matri, cranio, pericranio, musculis, & reliquis incumbentibus cranio partibus adfertur.

304. Quae dura mater, periosteum internum cranii, est basis, in quâ ordinatae hae arteriae minutos ramos immittant ipsis cranii ossibus, tum minutissimos ubique illi propagent ; hi autem inter lamellas tenues ossicas distributi, aliis occurrentes, plexus subtilissimos constituunt ; quibus nutritio, calefactio, medullae in diploë secretio, cranii ossi pro ratione contentorum incrementum incrementum, perficiuntur. Unde, his peractis, venosus redit quam ocyssimè.

H 3 305.

<sup>a</sup> Ridley Cer. F. 2. 3, totis. Ruysch. Th. 5. T. 2. F. 4. Th. 8. 2. 3.

305. Hinc sanguis, qui soliditate, tenuitate, mobilitate, fluiditate, proximè æquat cruorem capiti datum, impellitur in arterias subclavias, axillares, brachiales, manuumque; ubi similiter per vascula minima actus efficit, ut in illis partibus sit maxima agilitas, motus, robur, calor, sudor, atque nisdem etiã de causis celerrima circulatio.

306. Verum simul, ut alibi ubique, ita & hîc, sanguis allatus, secretus, per minima vasa distributus etiã fertur in ossa, medullam, membranas, musculos, pinguedinem, glandulas, cutim, ubi evanescencia prae tenuitate summâ vascula redeunt in referentia vasa, sensim majora, iterumque humores suos deponentia in venas manus, brachii, humeri, cavam, & cor.

307. Est enim sciendum ad finem arteriolarum ubique, & hîc, adesse machinulam similem fabricae glandulosae (250), à quâ vas oritur, quod avehit humorem ibi secretum, eumque varium, lymphaticum, serosum, oleosum, qui etiã inde suis vasibus iterum reductus, cruori infusus, illi permixtus, redit per venas cum reliquo cruore in cor. Hydrops omnis, maxime anasarca; assurgens tumor lymphaticus in partibus, quarum venae ligatae; ulcera fistulosa; hydatides; phlyctes.

phlyctenae; scabies; granula hordeacea in pinguedine frequentissimè reperta; haec docent: & simul patet, eadem in omni plagâ corporis similiter occurrere.

308. Illa deinde pars sanguinis, quae rarior texturâ, immobilior, crassiorve, fertur, juxta leges Hydraulicas, in <sup>a</sup> truncum descendentem Aortae; cujus pars sincerior <sup>b</sup> intercostales arterias intrat, quae functa suo munere, & obitâ citissimâ post priorem (305) circulatione, in <sup>c</sup> Venam sine Pari se exonerat, sicque in cavam, & cor redit. Quo admirabili apparatu id fit, ut liberrima hic, nec impedita à copioso sanguine venae Cavae fiat sanguinis circumductio: dum partes in eam venam se exonerantes, nempe intercostalia loca, & magna pars membranarum in thorace positarum, haud ferant impedimenta, sine maximo & praesentissimo quidem, vitae periculo. Quam eandem ob causam <sup>d</sup> hic est laxum ex arteriis in venas iter: unde intelligitur ratio celeritatis in his viis, ut & frequentiae acutissimorum hic toties accidentium morborum.

H 4 309.

<sup>a</sup> Casser. Tab. l. vi. T. ii. l. Q.

<sup>b</sup> Id. Ibid. l. uu.

<sup>c</sup> Barthol. Eustac. de Ven. sine pari Tab. 4. F. 1. 2. Vesal. L. iii. T. pag. 268. L. EEG & pag. 287. in figurâ.

<sup>d</sup> Ruysch. Thes. 8. p. 5.

309. <sup>a</sup> Arteriae dein phrenicae, & pericardiodiaphragmaticae, sanguinem recipientes intercostali, & vertebrali, similem, citissimo & hic absoluto itinere in phrenicas se venas, inde in cavam exonerant, faciuntque etiam ad liberam, velocem, citò instauratam, humorum circulationem.

310. Statim deinde, superato Septo transverso, Aorta descendens <sup>a</sup> lumbis, abdomini, foemoribus, cruribus, pedibus, prospicit, eâ lege, quae explicata (306. 307.); unde redit cruor per <sup>b</sup> venas valvulis circa inferiora instructas.

311. Verum ab eodem hoc trunco <sup>a</sup> hic sub diaphragmate propagantur rami arteriosi ad omnia viscera abdominis, quae commodè in chylopoea, uropoea, & spermatopoea possunt dividi, & fabricâ glandulari fere agunt.

## ACTIO LIENIS.

312. <sup>a</sup> **L**ocus Splenis, atque propinquitas <sup>b</sup> arteriae Coeliacae, tùm quoque ejus officium pro alio viscere, ut & motus

<sup>a</sup> Casser. Tab. l. vi. T. 2. l. xx.

<sup>b</sup> Ruysch. Ep. 2. p. 11. F. 4. l. E. E.

<sup>a</sup> Casser. Tab. Lib. vi. T. 11.

<sup>b</sup> Aquap. T. 4. F. 1. 2. T. 5. 6. 7. de venar. ostiolis.

<sup>a</sup> Casser. Tab. l. vi. T. 1. 11.

<sup>a</sup> Vesal. Liv. F. 6. l. 7. F. 10. l. oop.

<sup>b</sup> Vesal. l. 111. pag. 297. fig. l. m. βγδδ.

tus humorum ejus, requirit, ut jam primò agatur de eo.

313. Situs quippe in hypochondrio sinistro pendulus à diaphragmate, adhaerescens sinistro reni, omento, atque hinc quasi ventriculo, facile excipit varietatem pressionis. atque agitationes perpetuas sursum, deorsumque, motu septi transversi, & muscutorum abdominalium. ( 86. ).

314. Accipit purum, arteriosum, mox corde expulsum, sanguinem, ex <sup>a</sup> primâ arteriâ notabili sub septo ortâ, nempe Coeliacâ; dum ejus <sup>b</sup> primus ramus huic furculum dat, & tertius ramus tres saepe truncos ei impertit, aut quandoque ex ipsâ aortâ arteria illi conceditur eâ lege, ut hepar, pancreas, intestinum duodenum, & ventriculus, ab eodem vase suas accipiant, ac lien, arterias: ut constet sanguinem sic suppeditatum simillimum esse illi, qui dictis modò partibus impenditur.

315. <sup>a</sup> Arteriae illae, satis magnae, & jejunariae incredibili mensurâ majores, <sup>b</sup> corpus ejus ingressae statim distribuuntur per totam ejus molem, divisae in innumerabiles ramos, quorum fines abeunt in canaliculos minimos adunatos, sicque collectos, ut videantur

H 5

deantur

<sup>a</sup> Vesal. loco citato.

<sup>b</sup> Lower de Cord. 213. 214. 215.

<sup>a</sup> Drelincourt de lienosis.

<sup>b</sup> Ruysch. Th. 7. T. 1. F. 1. L. A.

deantur glandulas constituere parvas, sicque evanescere, ubique circâ venae splenicæ ultima.

316. Anatomie comparativa, in homine, bove, ove, talpa, erinaceis; morbosa diathesis in cadaveribus, petrefactis tuberculis in splene scatentibus; tum conspectus in liene macerato; docent non improbabilem arteriolarum illarum (315) in glandulosam fabricam degenerationem (242 ad 254.).

317. Quum tamen etiam directè ex his arteriis in venas transitum esse docuerit \* artificiosa vasorum impletio; videntur omnes lienosarum arteriolarum fines non eâdem ratione terminari, sed diversitatem hic obtinere satis notabilem; quam tamen oculo distinctè offerre hætenus ars nulla potuit, maximè ob friabilitatem tenerrimi visceris summam.

318. Tamen id saltem clare patet, eam hic esse partium structuram, quæ ubique in corpore, ubi secretio perficitur, adest; adeoque & illam hic certò fieri: nullum tamen hic commune vas emissarium ex splene prodit, & \* lymphatica ibidem comperta, totamque membranam investientia, inter binas tantum membranas splenicæ decurrunt; nec, in interiora non penetrantes, oriuntur a ultimis

\* Ruysch. Th. 2. p. 38.

\* Drelincourt de lienos. Glisson. de splene. Malpigh. de lien. C.

timis his arteriis (315), sed ab iis vasis; quae nutriendo lienari corpori inserviunt.

319. Quum itaque <sup>a</sup> anatomicae comparativae doceat, in plerisque brutorum deprehendi eandem structuram; forsitan & in homine non erit dissimilis; licet ob summam fluxilitatem ibi non possit ad oculum demonstrari. Est verò ea talis: Vena Splenica, valde magna, lienem ingressa, ramos quaquaversum porrigens per omnem ejus massam, foramina satis conspicua habet, dein ulterius distributa fere evanescere videtur ad fines arteriolarum, ubi & nervus simul; unde apparet & ab extremis illorum vasculorum (315), & etiam per foramina haec satis ampla lateraliter venam hanc impleri; adeoque ultimis venosis osculis haurire cruorem à glandulosa illa structura reducem; sed per orificia illa majora, quae in sinum venosum patent accipere eum humorem, qui ex adjacentibus receptaculis eadem evacuari potest.

320. Si enim arteria splenica aerem inflatum in lienem elotum, venam dein lienari accuratè constrictam, distribuerit per totum corpus meabile ejus; tumque, ligatam quoque arteriam, in aere siccatus discissus conspicietur splen; apparent praeter arterias, venas, & nervos, multae vacuae, distencae, distinctae cellulae, membranis erectis constructae, variac

<sup>a</sup> Malpighi de liene. & in posthumo p. 42. 43.

riae figurae, & capacitatis; quae patienti orificio in se mutuô patent, & etiam in foramina illa majora finui venoso inscripta.

321. Latera membranarum, quae cellulas dictas constituunt, arterioli minimis irrigantur; sed & corpuscula ovalis figurae, parva, alba, mollia, copiosissimâ, in membranis cellulas illas formantibus disposita adfunt instar racemorum glandulosoformum, quae omni sensibili dote glandulas exprimunt.

322. Interim & multi, magni, diversi, nervi soli lieni porriguntur, perque eum ubique distribuuntur, quum interim motus vix sensibilis eo viscere exerceri videatur, neque verô sensus acutus illi inesse, aut in eo requiri, observetur: quare credibile admodum habetur, & hos canaliculos subtilissimum suum humorem huc conferre, & etiam instillatum miscere aliis hic deprehensis venosis liquidis.

323. Proinde videtur primaria actio Lienis haec esse; 1. quod sanguis arteriosus, lymphâ dives, sincerus, in glandulis minimis (316) subtilissimam lympham praeparat, secernat, per emissaria sua singularia in cellulas (320. 321.) effundat, partimque forte venae splenicae quoque immittat; 2. superstitem ab hac actione sanguinem venulis minimis reddere, hinc venae communi spleni-



splenicae injicere videtur ; 3. alia autem arteriolarum copia , quae latera cellularum investit ( 321 ) , forte hic infundit attenuatum arteriosâ fabricâ cruorem , lymphâ plenum , in cavitates patulas cellularum , ut in cellulis penis virilis observatur contingere ; 4. eo quoque creditur copiosus ille nervorum spiritus advehi , deponi , misceri , assiduô iterum suppeditari ; 5. omnes hos humores , sic praeparatos , confusos , stagnantes promomento , vi arteriosi cruoris , impetu nervosi succi , contractione propriarum binarum membranarum & vaginae , constrictione fibrarum hic copiosarum , agitatione septi transversi & musculorum , vasorum , atque viscerum abdominis , premi , misceri , attenuari , similia ac in pulmonibus pati.

324. Quibus causis ( 323 ) cruor hic fluidus , solutus , spiritibus scatens , lymphâ abundans , difficulter concreescens , intemistus , non facile in heterogenea secedens , purpureus ruber , conficitur , talisque ex hoc viscere per venam ingentem lienarem emittitur.

325. Estque igitur hic ( 324 ) lienis effectus ; ideoque non habet emissarium , ut alia viscera , per quod humorem singularem suâ fabricâ factum emittat , sed effert omnia mista simul.

326. Apparet quidem manifestissimè , quod  
omnis

omnis hujus actionis fructus in liene nascatur, sed neutiquam ei inserviat: verum quum omnis, sic confectus, humor eat in unam venam Portarum, & hepar; patet usum splenis inservire hepati; adeoque explicari commodè non posse, nisi prius effectus & munus hepatis explicata sint.

327 Verum multa, satis aliter obscura, intelligi ex datâ doctrinâ, & proinde eam firmare, possunt; ut. V. C.

Quid facit situs, moles, vicinia, suspensio pendula, Lienis?

Quid docet situs, ortus, capacitas, arteriae splenicae?

Cur ablato liene, animal solito salacius, & quamdiu? docet id situs arteriae Spermaticae.

Quare exsectum splenem sequitur mictus frequentissimus? docet Renalis arteria.

Unde voracitas ingens animali splenem secto? indicat id situs arteriae Coeliacae.

Quâ causâ primis ab extirpatione diebus borborygmi, vomitus, nausca? patet ex iisdem, & ex situ nervorum stomachici & splenici.

Quamobrem tumor dextri hypochondrii, & incrementum hepatis, post ablatum lienem?

Quae ratio, quod splenicis, & hypochondriacis, aegrotis, omnia dicta modò etiam adsint simul cum pallore?

Ob-

Ob quam causam contingit eisdem adeo in-  
risum pronos esse?

328. An igitur lien in solum aequilibrium  
ponderis, & ad *συμμετείαν*, confectus? an  
est inutile pondus? an naturae dormientis  
error? vel sentina, & cloaca expurgans  
atrae foecis à sanguine? an faber est, & fo-  
cus, acoris vitalis, cujus irradiante calore  
ventriculi actio animetur? an hic sedes luxu-  
rici, venerisque tam vigilis, quam ludicrae  
in insomniis? an eo labefactato venus irrita,  
& sterilitas? an hic latet somni blandities  
nata, fotaque? an rectius veteres risus, lae-  
titiae, saturnique seculi, hic posuere thro-  
num? sanè disparent haec omnia ad lucem  
lieni aperto per Malpigium affusam mentis  
ficticis ludibria: nec magis probabile fit ner-  
vos huc delatos sorbere, perque suam regio-  
nem distribuere spiritus confectos; neque  
etiam omnem cruorem hinc accipere plus-  
quam perfectionem generalem.

## OMENTI ACTIO.

329. **D**Um verò praeparatus ille sanguis  
(324), ex omni <sup>a</sup> parte splenis,  
per varia vasa venosa, tandem in <sup>b</sup> venam  
magnam splenicam infunditur, ut ejus ductu  
in

<sup>a</sup> Vesal. l. III. Cap. v. l. aaaa T.

<sup>b</sup> Id. lb. l. TT. F.

in <sup>c</sup> venam portarum , indeque in <sup>d</sup> jecur , agatur , in ipso hoc itinere admiscetur venosus ex omento sanguis per <sup>e</sup> suam venam ; idque constanti lege naturae.

330. <sup>a</sup> Omenti autem nexus , situs , structura , insertio , considerata ab Illustri <sup>b</sup> Marcello Malpigio ; collata verò cum iis , quae industria anatomica in variis brutorum corporibus detexit ; docet nos , ibidem ab arteriis omentosis , circà sacculos pinguedinis in plexus reticulares tenuissimos distributis , ibidemque in venulas similiter hic positas definientibus , ope lateralium emissariorum intrà sacculos pinguedinis secerni oleum tenue , & subtile , sanguinis , ibidemque colligi , atque retineri ; ita ut tandem ex sacculis his adunatis , inque ductus quosdam patentibus , collectum hoc oleum expelli , atque ad hepar usque promoveri queat ; eaque ratione affundi sanguini illi lienoso eò pariter deferendo.

331. Credibile simul apparet , aperturis vasculorum minimorum patentibus ubique in superficie totius omenti se insinuare tenuissimum vaporem , qui assurgit assiduò in calido ventre à subtili rore huc instillato per oscula tenuissima vasorum exhalantium ; quo depre-

<sup>c</sup> Id. Ib. FFB.

<sup>d</sup> Id. Ib. AA.

<sup>e</sup> Id. Ib. 5.

<sup>a</sup> Vesal. l. v. Fig. 4.

<sup>b</sup> Tractat. de omento. &c.

deprehenduntur semper tepescere, & humectari superficies omnium corporum intrâ peritonacum haerentium. Necessariô autem statuitur humor hic subtilissimus esse, & admodum volatilis; id enim docet ejus ortus, natura, odor ex aperto abdomine se diffundens, perpetua consumptio, & refectio iterum.

332. Quum porrô omentum non observetur in homine aliud habere vas excretorium præter binas venas, <sup>a</sup> Epiploicam dextram, & <sup>b</sup> sinistram, probabile fit cruorem Omenti venosum lymphâ (331.), & oleo (330.), divitem, omnem affundi, misceri, cruori in hepar fluxuro.

333. Unde intelligitur, cur in quiescentibus ita augeatur in immensum omenti moles? cur in animalibus nimis motis contra planê gracilescat, & ejus vascula potius sero quodam plena videantur, quam oleo? item quare in emaciatis, hydropicisque, fere semper tenui repleantur vasa ejus sero? denique quod, pro augmento motus, requiratur eô major quoque collecti olei copia versus venam splenicam derivanda. Et tandem omentum visceribus omni fere pingui carentibus prope adhaerescere.

334. Verum eidem illi sanguini (324.)  
I quo-

<sup>a</sup> Vesal. III. C. 5. L.

<sup>b</sup> Id. lb. S.

quoque miscetur ille venosus, qui à texturâ ventriculi redit per *a* venas Breves, *b* Gastro-epiploicam sinistram, *c* Gastricam majorem, *d* Gastro-epiploicam dextram, *e* & Pyloricam; qui orbus quidem eâ lymphâ, quam fecit destillare intra cavum ventriculi, sed ideò quoque miscetur variis locis cruori ab omento redeunti (332.); & forte secum vehit multum subtilissimi humoris, quem ex tenuissimâ parte alimenti, & potulenti, hausit ex vasculis ventriculi absorbentibus.

335. Quin & ex *a* pancreate exiles ramuli, & *b* hæmorrhoidalis interna, eo adducunt etiam suum cruorem, forte acriorem paululum reliquo.

336. Denique omnis sanguis, qui in mesenterium, & ad intestina, advectus erat ope arteriæ mesentericæ *a* superioris, & *b* inferioris, ibique suo perfunctus munere in venas mesentericas rediit, tandem omnibus his humoribus ante ingressum in hepar admiscetur: atque postremus hic caret quidem

*a* Vesal. 111. C. 5. 00.

*b* Id. Ib. Z.

*c* Id. Ib. N.

*d* Id. Ib. H.

*e* Id. Ib. D.

*a* Id. Ib. M.

*b* Id. Ib. eddc.

*a* Vesal. 111. pag. 297. 2.

*b* Id. Ib. λ.

dem emissâ in cavum intestinorum lymphâ (91.), sed iterum bile tenui, & lymphâ, simulque parte Chyli forte quâdam dotatus (106.), materiem adfert hepatis conficiundae bili non ineptam.

337. Igitur sanguis, qui statim per venam portarum in hepar fluet, est fluidus, solutus; spiritibus, lymphâ attenuatâ, bile, dives; atque partim ope respirationis hic validè agentis (86.), partim quoque, licet leniori, vi circumpulsi sanguinis, omnes hi diversi, & ab diversis plagis adducti, humores bene miscentur in magno illo alveo in quem concurrunt, ut transfluxui, secretioni, in venas transitui, aptentur.

## A C T I O H E P A T I S.

338. <sup>a</sup> **V**ena igitur Portarum formata ex tot venis, hic in unum hunc tubum coeuntibus, sursum elata ingreditur <sup>b</sup> hepar circa <sup>c</sup> medium cavae superficiei, inter tubercula, *πύλας* dicta; adscitâ mox firmâ, fibrosâ, arteriae tunicis simili, tunicâ, ut vaginâ, robustior, spatium semipollicare emensa ingentem satis, & amplum

I 2

4 si-

<sup>a</sup> Vesal. 111. C. 5. l. BD.

<sup>b</sup> Vesal. v. F. 22. b.

<sup>c</sup> Id. lb. F. 20. G.

*d* finum format, in quem appulsus, collectus, retardatus, diversus ille humor proprio sui concursus motu, & actione respirationis, subigitur, miscetur, ut acquabiliter divisus pergat.

339. Statim verò exuit deinde naturam venae, ac sinus, atque in *a* quinque magnos dispersa ramos, indeque in *b* innumerales minores, iis attingit omne fere punctum corporis hepatici, ita ut ultimò ubique ex oculis evanescant, sicque constituent praecipuam massae ipsius hepatis partem.

340. *a* Arteria dein hepatica, ex *b* ramo dextro arteriae coeliacae orta, hepar ingressa juxta πύλας, insinuans se in vaginae adscitae substantiam, per eam distributa & divisa ad minima usque, omnia quoque vel minima loca attingit, sicque haud modo tunicae huic, sed omnibus partibus prospicit, licet crassâ hâc vaginâ non egens, eam intimè adcô in majoribus vasis non penetret: & accedunt dein aliae ex diaphragmate, & ex ligamento suspensorio, inferentes se priori suis ramis: *d* ultimae denique ab ipsis Cysticis arteriis.

341.

*d* Glisson. Hep. C. 25. F. L. H. ABB.

*a* Id. Ib. r. 2. 3. 4. 5.

*b* Id. Ib. Cap. 33. F. 1. F. r. & c. m. m. m. & c.

*a* Glisson. Hep. C. 33. F. 1. f.

*b* Vesal. 111. p. 297. f.

*c* Ruysch. Ep. 9. p. 12.

*d* Ruysch. Ep. 5. Tab. 5. F. 3.



341. *a* Vena autem cava, sursum versus diaphragma tendens, gibbae ejus superficiei se insinuans, in loco hujus nexus per *b* patentia in se & distincta foramina accipit à jecore emissos ramos tres majores, pluresque minores alios; qui *c* collecti ex innumerabilibus parvis per totum hepar ubique dispersis, tandem huc referunt sanguinem à venâ portarum illatum, licet *d* pauciores numero, & minores capacitate, videantur esse, quam rami illius.

342. Ubicunque fines ultimi duarum modò dictarum venarum juncti, adeò tenues evadunt, ut in *a* mirabilem, tenuissimam, fasciculatim dispositam, penicillis similem, materiem abeant, ibi formati apparent *b* globuli quasi distincti, ex invisibilibus ferme vasculis nati, à vicinis separati; sunt haec corpuscula simillima his, quae vocantur glandulae simplices; aggregato horum lobulos; iis unitis lobos; atque his denique hepar, fieri, persuadet inspectio inspectorum, piscium, quadrupedum, avium, ortus nascentis jecoris in hisce, morborum, injectionum, oculus nudus.

I 3

343.

*a* Vesal. V. F. 18. EDC. F. 22. f.

*b* Id. 111. pag. 277. A. B. D. C. C.

*c* Glisson. Hep. c. 33. F. 1. En. & c. F. 2. En & c.

*d* Ruysch. Th. 2. p. 28. T. VI. F. 1. 3. 4.

*a* Id. Th. 1. 30. 31.

*b* Malpig. Ep. toto tract. & in posthum. 30. 31.

343. Quibus iisdem locis (342), ubique, semper, invenitur exiguus canaliculus, ex iis acinis (342) invisibili origine ortus, Portae ramos individuo comitatu sequens, eâdem vaginâ involutus, *a* ad cōtenaciter illi adhaerens, ut vix queat separari, sensim concursu similium fistularum crescens, tandem ad truncum venae portarum in *b* unam fistulam notabilem definens, qui Porus hepaticus, aut biliaris, appellatur; quo assiduē humor à cruore diversissimus recipitur, & deducitur, Bilis Hepatica vocanda (340).

344. Contemplatio fabricae (338) venae Portarum, (341) Cavae, & pori hepatici (343); consideratio motus humorum in venam Portarum actorum (337); natura humoris in poro biliario contenti; experimenta anatomica ligando, discindendo, bilem colligendo, instituta, docent, quod à sanguine venâ portarum advecto, in minimis iis locis separetur humor fluens mox per ramulos pori hepatici extrâ jecur, dum reliquus ab hac operâ sanguis ramulis venae cavae impulsus extrâ jecur fluit per venam cavam versus cor.

345. Quod ipsum clarius docet distributio hepatici nervi eâdem semper, & ubique, hic viâ, ut vena portarum, divisi.

346.

*a* Ruysch. Th. 1. 30. 31.

*b* Glisson. Hep. C. 33. F. 1. L. c. & Ib. F. 2. l. c. & Id. Ib. Cap. 37. F.

346. In hominibus porrô <sup>a</sup> hepatis cavo adhaeret <sup>b</sup> infinuata vesica fellis ovalis, capax, in <sup>c</sup> canalem exeuns cysticum ita, ut cervix fundo altior sit, inde <sup>d</sup> cum poro biliario ad angulum acutum jungitur suo ductu, facientibus his unitis ductum communem majorem prioribus, obliquè descendentem, qui ad angulos acutos appositus <sup>e</sup> duodeno penetrat exteriorem ejus tunicam, dein inter hanc & alteram descendens, mox perforatâ & hac, inter secundam & tertiam longo itinere progressus, foramine rotundo in cavum intestini liberè exeuns, docet, non omni tempore, nec in quâlibet circumstantiâ, sed tantum laxis intestinis, intestinis bilem hic ab hepate infundi posse; contractis verò iisdem fortiter neutiquam.

347. Contemplatio hydraulica hujus fabricae (346), comparata jam prius enarratis (344), demonstrat quam clarissimè, quod ab hepatis omni puncto, & à vesicâ fellis, per meatum communem feratur humor naturali viâ in intestina ibi loci, ubi pulsus ventriculo chylus primò retardatur.

348. Docent interim <sup>a</sup> experimenta, ex

I 4

cavo

<sup>a</sup> Vesal. V. F. 20. BB. F. 12.

<sup>b</sup> Id. Ib. H.

<sup>c</sup> Id. Ib. F. 12. 13. b.

<sup>d</sup> Ib. abc.

<sup>e</sup> Ib. d.

<sup>a</sup> Bohn. act. lipf. 1682. p. 20. ad 23. & 1683. 126. 127.

cavo vesicae felleae in hepar, porum biliarium, intestina, item ex poro hepatico per hepar in vesicam, ductum cysticum, intestina, viam esse patulam, & facilem, denique & ex poro hepatico in cysticum, ex hoc in illum; docuit anatome, quandoque, <sup>b</sup> ut equis, abesse vesiculam; <sup>c</sup> aliàs meatum hepaticum vesicae cavo infundere humorem suum; bilem hepaticam (98.) aliam planè à vesicariâ; unde credibile admodum, 1. bilem hepatis naturaliter deorsum, 2. quandoque in vesicam, 3. aliquandô retrò in hepar & in venam cavam, inde per corpus fluere; 4. stagnando in vesicâ acquirere dotes bilis cysticae, 5. forsan autem portionem amarescentem maximè fieri glandulis, in membranâ vesicae positis, arteriis cysticis irrigatis, ut in membranâ meatus auditorii; 6. tumque dein permisceri refluenti hepaticohumori in vesicâ ipsâ.

349. Quae magis firmanur inventis à <sup>a</sup> Glissonio, <sup>b</sup> Verheyen, <sup>c</sup> Peralto, numerosis fistulis ex hepate, & ex poro hepatico, in vesicam felleam implantatis, atque in eam humorem inde perpetuò devehentibus.

350.

<sup>b</sup> Needham form. foet. p. 104. &c.

<sup>c</sup> Wepfer. Cic. aquat. p. 176.

<sup>a</sup> De Hep. C. 13.

<sup>b</sup> Traët. 11. C. XIII. pag. 94. &c. Tab. XI. F. 6. DDD. 123.

<sup>c</sup> Perault essais T, I p. 340.

in 350. Ex quibus omnibus (338 ad 349) patet veritas horum dogmatum: 1. arteriam hepaticam, vitae, nutritioni, calori, propulsioni humorum hepaticorum, secretioni eorum, & expulsiui, inservire, 2. ab ejus extremis ubique copiosa hepatis lymphatica invisibilia, ab his lymphatica visibilia, prodire, quae non in venam portarum, sed in cisternam lumbarem desinant. 3. Esse venas recipientes sanguinem arteriâ hepaticâ advectum, ab hac operâ superstitem, devenientes illum in portionem venae αζύγης, quae sub septo. 4. Omnia viscera abdominalia χυλοποιήσι inservientia, splenem, omentum, ventriculum, pancreas, mesenterium, intestina, uni jecori inservire, inferendo venosum, sed mirê mutatum, sanguinem. 5. Venas posse mutari in arteriis simillima vasa, fabricâ, mole, usu. 6. Ex venoso cruore fieri secretiones. 7. Portionem cruoris corde pulsam bis arteriosam, bis venosam, fieri, antequam in cor redeat. 8. hîc tardissimum esse trajectum humorum. 9. ideôque necessarium nexum, situmque, jecinoris ad septum transversum. 10. facile in his, qui carent motu corporis, gluten, calculos, vermes, sordes, circâ hoc viscus generari, unde morbi plurimi. 11. splenis totum munus esse, ut serviat jecori bilem paranti. 12. inde esse tantam horum à se mutuô tam in morbis,

## 138 A C T I O H E P A T I S.

quam in sanitate , dependentiam in omni quidem circumstantiâ. 13. materiem bilis, ut analysi chemicâ innotescit, habere diversam hîc à coeteris humoribus originem. 14. esse & hîc singularem admodum circumductionem sanguinis, cui similis nullibi in corpore hætenus detecta habetur. 15. esse aliquam similitudinem inter sinum venae portarum & cor, inter ramos quinque hujus sinus & inter arterias ex cordis cavitatibus ortas. 16. Non alibi majorem nasci difficultatem curationi morborum topicorum. 17. interim tamen nullibi tot viscera, vasa, humores, causas, concurrere ad creandum humorem quemcunque in corpore, quam quidem hîc loci ad producendam bilem. 18. hinc eam esse utilissimum, universale, efficacissimum, auxilium ad mutationem peregrini humoris in naturam inquilini. 19. adeoque bilem non esse excrementum. 20. eam duplicem. 21. hepar potius χυλοποίησι, quam αίματοποίησι, operari.

## A C T I O R E N U M.

351. **Q**Uum igitur de pancreate, mesenterio, ventriculo, intestinis, satis actum sit jam antea, ordo requirit Renum nunc porro explicetur Actio.

352. <sup>a</sup> Illi quidem situ, nexuque, sic se habent, ut vicinarum partium motu juvari in excretionem queant, maximè dexter; atque <sup>b</sup> sub circumexpansi peritonaei membranâ defensi; <sup>c</sup> pinguedine ficciore involuti; <sup>d</sup> accipiunt incumbentes glandes; atque deinde ex <sup>e</sup> aortâ descendente ramum insignem, vel plures, nacti, inde ramos quatuor, vel quinque, majores, ex his alios multos minores, atque inderursum arcuatos tenuissimos, visum fugientes, per omnia loca renum distributos, accipiunt; illi harum arteriolarum ramuli, <sup>f</sup> vermiculari reptatu, mutuis concursibus uniti, separatique, glomeres quasi constituunt; ex his verò ultimis videntur oriri venae reducentes minimae, tum <sup>g</sup> fistulae laterales, tenues, fere pellucidae, urinam ab arteriolis separatam accipientes, devehentes, atque ubi unitae corpora pyramidalia polygonia multa constituerunt, tandem desinunt in <sup>h</sup> duodecim plerumque corpora, papillas

<sup>a</sup> Eustach. de Ren. pag. 34.

<sup>b</sup> Id. Ib. p. 10.

<sup>c</sup> Id. Ib. p. 11.

<sup>d</sup> Id. Ib. p. 15. Tab. 1. Fig. 1. 2. Tab. 2. F. 1. 2. 3. Tab. 3. F. 2. 3.

<sup>e</sup> Id. Ib. varietatem pingit. Tab. 1. 2. 3. 4. in omnibus fere. maximè. T. 5. F. 2. 56. 23. 1.

<sup>f</sup> Ruysch. Th. 2. T. 6. F. 7. Th. 3. T. 4. F. 2. 3.

<sup>g</sup> Id. Ib. F. 3. A.

<sup>h</sup> Id. Ib. C. & Fig. 6. Th. 4. F. 1. Malpigh. de Ren. C. xv. Bellin. de ren. Fig. 10.

pillas dicta, membranacea, in quibus collecta plura fistularum renalium ora oblique, ubique, & undique patent, tam extus, quam intus.

353. Interim deprehenduntur in renum substantiâ <sup>a</sup> corpuscula, rotunda, parva, cava, minimis vasculis coronata undique, venulis, nervisque instructa, imô & <sup>b</sup> fistulas uriniferas attingentia; quin etiam crinacea, testudines, morbi, concreta in renibus, videntur eadem maximè firmare, ut & conspectus renum in foetu. Quare videretur duplici apparatu urinam hic secerni, operosiore glanduloso, & simpliciore Ruy-schiano; quod nec repugnat consuetudini naturae alibi, ut v. g. in Hepate.

354. Sed & altera pars arteriae renalis necessariô impenditur vitae, sustentaculo, calorigue, subministrandis ipsi substantiae renis; atque ab hujus cruore videtur <sup>a</sup> lymphilla illa oriri, quae tantâ copiâ à renibus re-dux, bona, non excrementitia, alveo chyli redditur, in circulum redit, nec lotium sapit. Quin & orientur inde procul dubiô & suae propriae venulae.

355. Etenim à radiculis ultimis arteriolarum

<sup>a</sup> Malpig. de ren. c. 1. 11. Ruy-sch Th. 3. pag. 39. 40.

<sup>b</sup> Malpig. Ib. C. 111.

<sup>a</sup> Nuk. adenogr. pag. 61. 62.



rum renalium (452) <sup>a</sup> venulae minimae or-  
tae, collectae majores factae, in ramos divi-  
sione arteriis similes unitae, tandem in <sup>b</sup>  
truncos numero incertos adunatae, in venam  
cavam vario modo emittunt cruorem, ab  
hoc munere superstitem.

356. <sup>a</sup> Papillae porrô renales (352) ex-  
tillant illatum fistulis uriniferis lotium in  
amplam cavitatem ab expansâ membranâ pel-  
vis factam; unde collecta, retardata, per-  
missa, in ductum angustatâ pelvi factum,  
Ureterem dictum, pellitur; inde deferenda  
porrô ad vesicam.

357 Namque à papillarum (356) ambitu  
orti membranacei <sup>a</sup> undecim, vel duodecim,  
canales, eas excipientes harumque extillantem  
humorem, in tres magnos ramos abeunt, qui  
collecti in unum faciunt pelvim amplam;  
quae definit in <sup>b</sup> fistulam unam membrana-  
ceam, fortem, <sup>c</sup> arteriis, venis, nervis, lym-  
phaticis vasculis, fibris motricibus, instruc-  
tam, quae vocatur Ureter; qui rectâ deor-  
sum primô, mox inflexus, sub peritonaei  
sem-

<sup>a</sup> Eustach. de Ren. T. 5. F. 2.

<sup>b</sup> Id. Ib. T. 1. 2. 3. 4. varietates dat.

<sup>c</sup> Id. Ib. T. 5. F. 1. Ruysch. Th. 3. T. 4. F. 3. E. Th.  
4. T. 1. F. 1. D.

<sup>a</sup> Eustach. de Ren. T. 5. F. 1. 2.

<sup>b</sup> Vesal. V. F. 22. q.

<sup>c</sup> Ruysch Th. 111. T. 4. F. 2. E. Nuk. Adcnogr.  
Fig. 34. K.

semper lamellâ decurrens, ad <sup>d</sup> partem posticam vesicae, binorum fere digitorum à cervice inferiori distantia, inseritur; & perforatâ exteriori tunicâ spatio digiti minoris inter hanc & interiorem obliquè decurrens in cavum vesicae se penetrat, urinamque renalem tuto itinere eo infundit, ipsâque fabricâ suâ impedit, ne ex cavo vesicae in ureteres reasurgere, utcunque pressa, queat.

358. Microscopia; injectiones; ligaturae; anatome comparativa in erinaceis, gliribus, testudinibus, ursis, bobus, avibus, foetibus humanis; dissectionio cadaverum morbis renum obnoxiorum; renes monstrosi, haec omnia ita se habere docent.

359. Unde mechanica secretio urinae intelligitur fieri vi cordis propinqui, artiarumque validarum, quâ urgetur cruor aquosus in innumerabiles flexus, gyros, resistentias, oppositos motus, concussus, permissiones, tandemque pars ejus liquidior per fistulas parum modò angustiores, quam sunt illa vasa sanguifera, fecernitur, propellitur, colligitur, ejicitur.

360. Non ergo fingenda hîc attractio, emulsio, vel similes facultates.

361. Neque opus erit ullo fermento uropoeo: non enim est locus, nec causa, non tempus, nec materia, nec admistio, nec effectus.

362. Nec magis , ob easdem rationes (361) , licet fingere virtutem fundentem , aut praecipitantem.

363. Quin & sponte cadunt , quae tanto molimine , ut optima , finxit Helmontius de Stercore hic liquido , vel scoriâ lotio in *αερόλαξιν* à calculo admistâ.

364. Et liquet facillimè omnes humores , qui sunt minus crassi quam urina , hâc viâ effluxuros , si modò applicantur his vasis. Unde & intelligitur causam esse , quae impediât , ne huc fluant ( 223. 224. ) , aut , si cō fluxerint , mox sequi debilitates citas , & maximas.

365. Eritque etiam urinae nunquam definens , sed continuata semper , secretio primaria causa renum , urcterūque , sanorum , nec obstructorum , nec proprio callapsu , vel pressu , concretorum.

## VESICAE URINARIAE A C T I O.

366. **I**N pelvi , sub superexpansâ peritonaei lamellâ , tuto defensa haeret & Vesica Urinaria , tribus diversis membranis constans , nempe exteriori à peritonaeo , mediâ muscularibus diversis fibris constanti ,  
inte-

interiori <sup>b</sup> glandulis mucosis instructâ, quae impedit resolutionem ab urinâ acri, stagnante, futuram. Quando igitur urina acrimoniâ, copiâ, diuturnâve remorâ, rodit, distendit, irritat, deterfô muco oritur molestus sensus; quo excitatur idem ille motus, qui expositus (111.); quo urgentur vi magnâ omnia abdominalia contenta in membranam pelvi superextensam, hinc in vesicam, quumque eo tempore nihil resistat, inferius pellitur urina magnâ vi in <sup>c</sup> aperturam ad cervicem vesicae, eam extendit, vascula circumposita premit, sphincterem orbicularem superat; <sup>d</sup> qui haeret in superiori parte cervicis suprâ prostates, sub rectis exterioribus fibris, cum suis transversis carneis, non valde crassis, fibris; unde eâdem vi urina pellitur in <sup>e</sup> cavum urethrae; atque flaccidâ tum urethrâ, ex hac extra corpus.

367. Simulac cessat actio ista (366.), non pressae amplius fibrae sphincteris propriâ vi se contrahunt, vesicam firmiter claudunt; tumque in viris muscoli urinam exprimentes, agentes, lotij reliquias expellunt: quum enim <sup>a</sup> hi oriantur ex superiori, externa,

<sup>b</sup> Graaf de organ. gen. T. v. Drake Anthropol. l. i. Cap. 20. Tab. 111. b.

<sup>c</sup> Graaf. Ibid. E.

<sup>d</sup> Fallop. obs. p. 440. Graaf. Ib. T. x. x.

<sup>e</sup> Graaf. Ib. E. M. K. & T. xi. Yo.

<sup>a</sup> Couwper. myotom. ref. F. x11. CCbec,

ternâ , parte urethrae , sub offe pubis , & cingant partem ipsius urethrae extrinsecus , parte inferiori uniti , sicque procedentes ad perinacum , ibique separati adscendentes inferantur utrimque ad corpora cavernosa penis ; facile haec eorum actio intelligitur ; quâ in senibus deletâ , molestum fit reddito lotio stillicidium.

368. Est verô urina adeô multiplex , ut prius distinguenda sit , antequam de ejus indole dici vera queant.

369. Namque à copioso , aquoso , potu , fit cruda , copiosa , lenis , insipida , inodora , aquea , facile retinenda.

370. Sed quae redditur à chylo jam facto est magis cocta , parcior , acrior , falsa , parum foetens , plus urgens.

371. Illa iterum , quae chylo jam in serum verso habetur , rubicundior , coctior , longè parcior , falsior , foetidior , acrior , valde stimulans , adeoque diu retineri non potens.

372. Tandem verô haec , quae post diuturnam abstinentioniam , ex humoribus valde & diu attritis , ut & ex deterfis solidis partibus oritur , haec demum paucissima , acerrima , falsissima , foetida , ruberrima , vix retinenda , & putrefactae proxima , deprehenditur.

373. Cur igitur calore , motu , sudore , abstinentiâ à potu , redditur talis ut ( 372. ) ? & contrâ ?

374. Quare lotium tenuius, acrius, foetidius, falsius, ipso sanguine?

375. Continet ergo urina aquam cruoris; falem ejus acerrimum, subtilissimum, volatilisissimum, alcalino proximum; oleum acerrimum, tenuissimum, volatilisissimum, putrefacto proximum; terram quoque maximè tenuem, satis volatilem, valde attritam.

376. In aquâ tamen urinae adest subtile, foetidum, fortiter adhaerescens oleum, adeo attenuatum, ut aquae misceri intimè queat, sed difficillimè inde separari; an potest ergo spiritus dici?

377. Sal nativus urinae saponaceus, ammoniaco quidem affinis, ab eo tamen diversus; sal autem fixus ex marino sale assumpto inprimis adest; itaque urinosus sal non est acidus, non alcalinus, nec ammoniacus, nec muriaticus, sed propriâ indole donatus.

378. Oleum urinae, ex attritâ pinguedine attenuatum, videtur unum, simplex, ab omni alio diversum; licet pro admistu salis, vel terrae, multiplicis ingenii videatur primò.

379. Terra denique ejus adeo tenuis, reliquisque intricata, apparet; ut intra priora se abscondens planè lateat; ab iis separata simplex, inodora, insulsa, insolubilis, alba, fixa, est.

380. Nec nutriens, subactumque, serum; nec chylus bonus; vel lac, unquam in urinâ.

Unde

Unde id cavetur? an non per crassitiem horum, & per exilitatem, gyroſque, canalium uriniferorum?

381. Neque enim unquam redditur in ſanitate, quae craſſior ſit cruore, ſero ejus, chylo, lacte. Inde aquea diuretica. Maxime ſalibus miſta. Praeprimis ſi haec frigida potantur. Liquores fermentati (56) minime diuretici; & quidem eo minus, quo pluri abundant pingui. Vina autem acida, oligophora, valde cito in urinam meabilia.

382. Hinc etiam ſcimus reſpondere, unde copia, color, odor, ſapor, ſpiſſitudo, contenta, ſupernatantia, inſidentia, ſubſidentia, urinae? nempe ex varia copiâ diverſae aquae, ſpiritus, olei, ſalis, terrae, ingrediente miſcelam lotii, pro variato inprimis gradu attritus diverſi. Quod ipſum prae coeteris clare docet phosphorus.

383. Quin evidens & inde erit ratio obſervati, quod aucto motu ſaepe cruentum lotium, abſque labe renis, abſque calculi praefentis ſuſpicionem.

384. An ergo ſanitati incolumi ſervandae neceſſaria urinae per renes ſeparatio? an vero aliis excretionibus ſubſtitutis ſuppleri poteſt? & quid tandem boni facit? reſponſio habetur ex dictis (à 368 ad 383.).

385. Quum itaque motus humorum; fabrica corporis; ligaturae; injectiones; au-

topfia ; morbi interceptâ urinâ orti ; doceant quam clarissimê , his solum viis commodê exire ex cruore lotium : quid opus est fingere in ventriculo , & in intestinis , meatus ex cavo horum humorem mittentes in cavum peritonaci ? deinde iterum in membranâ superextensâ pelvi & circumductâ vesicâ , tum & in corpore vesicae ubique similes poros , qui ex cavo peritonaci absorptum in cavum vesicae ducant directê ? rursus nullam , quae resistat huic intropulsui , remorâ ; sed iter expeditissimum ? denique fingere phænomena , quae hoc requirant , dum profectô non observentur ulla , quae id urgeant ; nulla argumenta , quae id evincant.

386. An autem credibile habetur , renes quidpiam facere ad semen , & quidnam illud ? sanè situs arteriae Emulgentis , & Spermaticae , aliquid latere docet.

387. Tandem ; cur ex urinâ sabulum , calculusque , tam saepe oriuntur ?

## MUSCULORUM ACTIO.

388. **P**ostquam visum , quid fiat sanguine per viscera actô ; facile intelligitur , inquirendum esse in illum , qui per musculos ubique in corpore pellitur , deinde verô & in illum , qui movetur in iutegumenta  
exter-



externam superficiem corporis , aut internam cavitatem , cingentia.

389. Vix autem ullibi major obscuritas in minutissimis vasculis , & instrumentis , efficit opinionum diversitatem summam , simulque difficultatem electionis optimae.

390. Etenim partes corporis humani solidae vel moventur agitato humore , qui per eas fluit cum impetu ; vel moventur ope musculi , qui illis movendis alligatur ; eo autem divulso , dissecto , corrupto , motus hic posterior cessat ; motus autem hic est voluntarius , spontaneus , aut mistus.

391. Agunt omnes musculi , dum breviores redditi annexa solida trahunt , vel premunt , aut humores premendo expellunt.

392. Quare in eo omnis difficultas , ut assignetur fabrica , & causa contrahens , musculi : quarum una certè ab alia multum pendet.

393. Omnis simplex musculus hætenus cognitus constat uno modò <sup>a</sup> ventre carneo , <sup>b</sup> unoque tendine ; rursusque dividi potest in alios planè similes , sed semper minores ; hi verò iterum , & qui nascuntur ab illis , in minores semper similes maximo ; & quidem divisio hæc procedit eousque , ut tan-

K 3 dem

<sup>a</sup> Low. de cord. Tab. 3. F. 3. acc. F. 5. parte superiore.

<sup>b</sup> Id. Ib. b.

dem in incredibilem adeo subtilitatem abeant, quae omnem omnino imaginationis vim exsuperet. Determinat autem ratio, quod tandem finis sit. Ultimus ergo ille, quum toti musculo similis sit, habebit & suum ventrem, & tendinem, planè ut major; vocabitur autem fibra muscularis. Quarum unita adunatione musculus propriè dictus fit.

394. Patet ex dictis, fibras has (393) non esse arteriosas, nec venosas, neque etiam lymphaticas, vasa; verum alterius naturae, & longè minora his, organa. An vesicularia? an uno tractu facta?

395. Quum igitur cogitatur nervos ad omnem musculum ingredi unâ cum ejus arteriis & venis; eos dein, deposito ibi involucrio externo (281. 282), distribui ita per omne musculi corpus, ut nullum assignari queat punctum, in quo non inveniatur pars horum; dein quod omnes nervi hic evanescant; quod alibi in corpore extrema nervorum in explicatas quasi membranas abeant (283.); concluditur, habitâ ratione naturae minimi nervi (274.), has fibras (394. 393.) esse nervi ultimi, involucriis orbiati, expansionem tenuissimam, intus cavam, figurae ut musculus (393), plenam spiritu (275. 276. 277. 291.), qui datur à nervo illo,

e Leeuwenhoek in observ. Transact. Phil. p. 126.  
Hook in Epist. ad Leeuwenh.

illo, ab origine ex cerebro, vel cerebello, vi cordis assiduô.

396. Ex fibris his unitis fiunt fasciculi, qui iterum habent membranam singularem, quâ involvuntur, & ab aliis distincti separantur, quod verum est, quousque sensus penetrat; est verô membrana hæc tenuis, cellulosa, intus oleo plena, quod in quiescentibus accumulatum motu consumitur, defendendis, inungendis, lubricandis, fibris inserviens, ab arteriis suppeditatum, ut injectio argenti vivi docuit.

397. Verum *a* arteria fertur ad musculos; quæ ibidem eâ magnitudine, copiâ, contextu,prehenditur, ut incautus judicaret fere hæc unâ totum corpus musculi conflare. Hac inprimis distribuuntur inter fasciculos (396), & in membranâ eos distinguente, forte & in externâ superficie uniuscujusque fibrillae (393); ubi in *b* plexus reticulares, in secretoria oleosa (396), in *c* lymphatica minima, & forsân in fibrillas cavae nervis similes, desinunt; quæ fibrillae etiam poterunt desinere vel in cava fibræ nerveæ muscularis (393. 394.), vel & ipsæ similia facere.

398. Saltem clarum est ex arteriis in musculo

K 4

culo

*a* Ruysch. Thes. IV. T. III, F. 1 & 2. totis.

*b* Id. Ibid.

*c* Nuk. adnogr. F. 41. Hgg. Kii.

culo ramum quemlibet habere sibi respondentem venulam, quae unita alteri majorem facit, unde venae sanguiferae musculorum, & vasa lymphatica fiunt.

399. Tendo autem muscoli ritè examinatus discerpitur in tot fibrillas, in quot musculus; cā lege, ut cavitas fibrae muscularis gracilescens ex suā amplitudine obtusā, concrescens in unum, acutum, corpus, fiat fortior, durior, siccior, angustior, vasculis fere destituta; ex unione compactā talium fit tendo totus, *ἀπὸ τῆς ἑωσις* hinc optimo nomine, licet ex aliā opinione, dicta. Ex binis talibus musculis (392. ad 399), opposito situ nexis, fiunt fere omnes \* conspiciendi musculi.

400. Omnis ergo musculi rubedo à cruore, quo eloto pallet.

Moles verò à repletis arteriis, venis, cellis oleosis, lymphaticis, imprimis pendet.

Hinc in senio, macie, *ἀρεσφία*, coctione diuturnā, elotione accuratā, adeò immittitur.

Et tamen in senio, macie, *ἀρεσφία*, motus manet; quem musculis non rubris exerceri posse infecta quoque docent, in quibus oculo non apparet caro.

401. 1. Fibrae (393. 394.), fasciculi (396), arteriae (397), nervus (395),  
in

in vivo, & in mortuo, sunt distractilia sine rupturâ; utcunque tensa; vi contractili prædita; scissa multum se accurtantia; tunc molem suam minuentia; & in undulatam quasi superficiem se contrahentia; proprios succos expellentia; hinc semper sunt ubique in statu sibi violento; semper renituntur suae elongationi; semper nituntur se accurtare; plus in vivo, minus in mortuo; ergo requirit antagonistam.

2. Compressio fortiter; contusio planè; obstructo integrè; suppurato; exsecto denique, cerebro, cessat integrè actio omnium musculorum voluntaria, omnis sensus, omnis memoria. & contrâ. Sed durat actio musculorum spontanea in corde, respiratione, vasis, visceribus, vitalibus. libero, sano, aperto, cerebro contra.

3. Iisdem factis (2. hujus) in cerebello, statim definit actio cordis, respirationis, & etiam vita, & vis voluntaria proin unâ cum omni sensu; sed diu supermanet motus quasi vermicularis in ventriculo, intestinis, & desinens adhuc restitui potest. restitutis his idem fit, ut (2 hujus.).

4. Compressio; ligato; corrupto; discisso, nervo musculi (395), omnis motus, vitalis, voluntariusque, in eo integrè perit; & si truncus nerveus sic patitur, cujus rami diversis dantur musculis, omnibus his idem

## 154 MUSCULORUM ACTIO.

fit. soluto, integro, eodem contrâ.

5. Factis iisdem in quacunque parte medullae spinalis, perit actio omnium musculorum, quorum nervi sub loco affecto ex medulla oriebantur. & contra.

6. Quin & iisdem peractis in arteriâ, ad unum, pluresve, musculos distributâ, omnia eadem.

7. Musculi agentis <sup>a</sup> tendo (399) vix ad sensum mutatur; <sup>b</sup> Caro (393.), accuratur, durefcit, pallet, tumet, protuberat; <sup>c</sup> tendines ad se invicem accedunt; annexa tendinibus pars ducitur versus eam, quae minus mobilis tendini nectitur; hæc actio musculi Contractio dicta; quae longè major, fortiorque, quam insita contractio (i. hujus.), nec naturalis; hinc superaddita.

8. Musculi non agentis tendo idem; caro longior, mollior, rubra, subsidens, planior; hic status vocatur musculi Restitutio; quamvis fere vi antagonistae fiat; eo enim irritato facta contractio in altero sponte remanet à vi (i hujus) non aequilibrato, sed praevalente.

9. Uno antagonistâ agente (7 hujus), si alter non agit, sed est ut (8.); tum fit flexio artus; si ambo simul agunt, firmatur im-

<sup>a</sup> Low. de Cord. T. 3. F. 2.

<sup>b</sup> Id ib. bbcc.

<sup>c</sup> Id ib. aa.

immobilis ; si neuter agit , fit indifferens , ut moveatur eo , quo minimus excessus alterutrius ducit , sive additione , vel subtractione , fiat.

10. Fiunt verô hæc mutationes ( 7. 8. 9. hujus ) momento vel minimo temporis vicissim , in totâ carne totius musculi simul ; adeoque reciprocê abesse , adesse , possunt , nullo tamen vestigio in corpore relicto.

11. Injecta tepida arteriæ musculi quiescentis , vel mortui , facit , aut resuscitat , ejus contractionem ; licet diu â morte hoc tentetur.

12. Musculi contracti moles auctior potius , quam imminutio videtur , in omni experimento.

13. Flexi artus per vim externam , renitente licet voluntate , agentem , musculus flexor ipso hoc flexu induit statum ( 7. hujus ) contractionis , ac si proprio motu ageret , tamen haud adeo validê.

14. Voluntate nihil determinante , omnes musculi voluntarii , in omnibus suis vasis , æquè pleni , motique sunt , â sanguine , & & spiritibus , æquabiliter per eos motis , idque in toto corpore simul.

402. Ex quibus certô exploratis phaenomenis ( 401 ) liquidô constant proprietates causæ latentis , moventisque musculos : nempe

## 156 MUSCULORUM ACTIO.

1. Debet posse abesse, & adesse, in musculo.

2. Adeoque in eum ingredi, egredi ex eo.

3. Id est aliunde in eum derivari, aliorum exire.

4. Hocque nictu citius ipso momento voluntatis efficacis.

5. Et in ipso temporis momento, quo contrahitur musculus, internè foras urgere ad omne punctum superficiei villi muscularis etiam in partes oppositas.

6. Hoc est debet aequaliter distribui simul per omnem carnem musculi.

7. Itaque fibrarum membranas dilatare; implere; ex oblongâ figurâ in rotundiorē mutare; diametrum minorem augere; majorem minuere; tendines sibi invicem adducere.

8. Denique oportet, ut à cerebro, cerebello, origine nervorum, oriatur, & possit superare eas resistentias, quae hic satis validae obsunt.

9. Concludendo igitur requiritur corpus fluidissimum, tenuissimum, celerrimum, vi intrâ musculum applicandum.

403. Quae requisita (402.), in liquore nervorum inveniuntur, non in ullo alio; adeoque hic pro verâ causâ agnoscendus est; nec difficulter intelligitur ejus actio.



404. Ponatur enim, à quâcunque demum causâ Spiritus celerius fluere à primâ origine nervi unius, quam per reliquos; influet plus in fibram huic nervo patentem; hæc ergo plus dilatabitur; vim elateris amittet eo tempore; patietur, & ager, quæ dicta (402. 7.); perennante eâdem causâ id plus continget; adeoque brevissimo tempore integrè turgebit; & manente eadem determinatione contracta manebit; quod dum contingit in infinitis quoad sensum fibrillis simul, totus musculus ita se habebit.

405. Necessariò sequitur, celeritate hæc (404) in uno nervo auctâ, alios tanto minus urgeri, adeoque his laxatis, tanto plus excessum virium in contracto auctum agere.

406. Quibus binis de causis (404. 405.) turgentes omnes fibrae musculi vi magnâ arctabunt sibi interposita intervalla, & vasa sanguinea ibi posita; unde venae evacuantur; arteriae compressæ crassiora, id est rubra repellunt. subtilissima verò vi cordis, & suâ, in exilissimos canales urgent; sicque, expulso cruore, totum corpus musculi subtili humore per nervos, & arterias, concurrentes allato, agere cernimus, jam omni conditioni satisfactum est: nam trahetur id, quod est affixum tendini tracto; si modò resistit minus vi trahente, quocunque minimo excessu.

407. Desinente verò hâc causâ (504.); elater fibrarum; aequata vis aliorum; circumpositae partes extrâ suum tonum actae ab illo contracto musculo; simul restituunt aequabile in omnibus partibus aequilibrium cum aliis. Omni ergò phænomeno, omnique requisito, sic est satisfactum intellectu fabricae, & causae, hic in corpore certò praesentis. sed tantum assumpta potestas in origine nervi celeritatem augens. verum id commune omni hypothesi, nec explicari haec potest (27. x.).

408. Nihil ergo juvat incorporea facultas Galenica musculos inflans. nec spiritus nitrosus nervi cum oleo cruoris mistus, accensus, rarefactus. Longe minus acidus spiritus nervorum cum alcalinis cruoris. nec ebullitio aetheris & succi arteriosi. nec vis attractilis inter minutissima humorum hîc loci aucta, vel minuta. nam repugnant haec sensui, organis, materièi, misturae, proportioni, durationi, copiae, phænomenis. Imò nullam omninò necessitatem habent.

409. Verum in omnes musculos totius corporis simul contingens aequabilis ille influxus, tum temporis in cor contractum influere non potest; sed in nervis ejus aggeritur; unde hoc per auriculas, venam cavam, & pulmonalem in cavitatibus; per arterias coronarias in substantiâ; per nervos  
in

in villis musculosis impletum; uno momento violentissimè contrahitur; mox laxatum iterum impletur, sicque alternè semper agit, & quiescit. De alterno respiratoriorum musculorum dicetur postea (601. &c.).

410. Quanta verò haec sit vis muscularis, solus ille intelligit, qui novit 1. locum, ubi tendo trahens inseritur parti trahendae quoad distantiam à centro immoto circa quod fit flexio. 2. obliquitatem directionis per angulos determinatos, qui hîc plerumque valde acuti. 3. pondus ipsius partis movendae. 4. pondus corporis appensi, & elevandi, unâ cum loco, in quo applicatur. 5. duplicationem summae harum virium requisitam, ut fiat tractio versus terminum fixum. Quae ex mechanicis incomparabilis Joh. Alph. Borellus demonstravit.

411. Quomodo autem tanta vis per nervos dari queat musculis, sola docet hydraulice, & hydrostatice, Mariotto explicata.

412. Illa autem vis muscoli dirigitur mirabilibus, mechanicis, auxiliis, quae sunt. 1. <sup>a</sup> fasciae membranosae, latè expansae, musculos & tendines subjectos ambientes, & coërcentes, ut ad carpum, & ad pedes. 2. fasciae latae, musculosae, ut in cubito, dor-

<sup>a</sup> Vesal. 11. Tab. 11. 12345. lb. AA. c.

<sup>b</sup> Id. 11. T. IX. o.

fo, *c* femore. 3. fit & *d* Trochleis cartilagineis, ut in trochleari oculi; vel *e* offeis, ut in pterygostaphylinis. 4. Alio musculo transmittente, & dirigente; ut in *f* stylocerato-hyoïdeo. 5. hypomochliis tendines musculorum sustinentibus, elevantibus, dirigentibus; ut *g* patella in genu, *b* ossa sesamoïdea ad articulationes digitorum. 6. appendicibus ad ossa enatis, ut sunt *i* trochanteres in osse femoris. 7. circumductione musculorum ipsorum circa ossa, ut *k* marsupialis, sive obthurator internus.

413. Vis autem trahens musculorum augetur quam maxime musculis ex multis musculis minoribus compositis, qui omnes junctis in unum tendinibus in fortiorem virtutem conspirant, ut v. g. in *a* deltoïde, *b* pectorali, *c* bicipite humeri, *d* tricipite femoris; quo enim plures fibrae, eo fortior musculus; quo longiores fibrae, eo major aptitudo magnae flexioni.

414.

*c* Id. II. T. III. Φ.

*d* Cowp. App. ad Bidlo. Fig. 34. b.

*e* Id. Ib. Fig. 8. cc.

*f* Casser. de voc. org. T. I. Fig. 1. DF.

*g* Vesal. II. T. 8. kk.

*b* Id. I. Cap. xxv. F. 1. TV V.

*i* Id. I. Cap. xxx. F. 1. Q. a. Fig. 2. V. a.

*k* Spigel. I. IV. Tab. xxix. QQ. & Tab. xxx. o.

*a* Low. de Cord. Tab. 4. Fig. 1. totâ.

*b* Vesal. II. Tab. III. Δ.

*c* Id. Ib. Tab. vi. lump. Θq.

*d* Spigel. I. IV. Tab. xxxii. B. AAAACCC.

414. Cognoscitur actio singularis uniuscujusque musculi facilè , si scitur ejus nexus , directio , & mobilitas comparata partium , quibus adnectuntur tendines.

415. Ergo musculi voluntarii nervos habent ultimò oriundos à cerebro.

Illi verò , qui spontaneis , vitalibusque , motibus serviunt , à cerebello nervos accipiunt.

Motus in fibris à morte superstites à contractione spontaneâ vasorum , & fibrarum.

Nec contractio musculi à contractione spontaneâ , nec à contractione nervi , ullo modo venit.

Licet succus nervorum validè agat in musculum , tamen non laedit fistulam nerveam : Ut ex hydraulicis.

Musculus nimis diu fortissimè tensus dolet , inflammatur , moritur. cur ? exemplo est tetanus.

Musculis alternè motis , & laxatis , cruor reciprocè magno impetu exprimitur , & admittitur.

Unde attenuari , dissolvi , atteri , hac ope , ut in pulmonibus , ita ubique , & sæpe , potest.

Effectusque hinc agilis , exercitatae , & alacris , vitae , comparati cum vitae sedentariae effectis intelliguntur.

In nimio otio , sanis corporibus oleum

collectum vasa, fibrasque, arctat, & fere comprimit.

Animal nimis exercens motum musculorum totum gracilescit.

Senectus, & vita laboriosa, musculos fere totos tandem in tendines, hos verò in cartilagines & ossa, permutant.

## FUNCTIO CUTIS.

416. **O**Mnibus musculis supersternitur sub cute <sup>a</sup> membrana cellulosa, arteriis, venis, nervis, lymphaticis, cellulis oleosis, ornata; valde dilatabilis, & in omnem dimensionem excrecere potens, collecta inprimis pinguedine in cellulis rotundis stagnante, quamvis tenuis & oleosa sit; haec, ab arteriis lento motu in appensos folliculos secreta, inservit defendendis, lubricandis, inungendis, musculis; acri autem reddito sanguini temperiei est; & motu violentiori agitato cruori, musculisque suppositis inprimis inservit.

417. Incumbit illi pingui strato (416.) congeries nervorum subcutaneorum densa; in formam quasi membranae contexta; ab integumentis duris nervorum admodum tenax, ac spissa reddita; arteriis, venis, lymphaticis.

<sup>a</sup> Malpig. de omento, & adipos. duct. Ruyssch. Th. 2. & 3. pag. 60.

phaticis vasis, ubique etiam contexta; unde emergunt dein pleraque alia incumbentia.

418. Enim verò nervi illi, ex eâ texturâ assurgentes, formant pyramides, quae deponentes involucrum exterius à durâ matre datum, per eas exuvias formant reticulare corpus à *a* Malpigio primò in pedibus, manibus, linguâ, detectum, à Celeberrimo *b* Ruyschio nitidius ostensum; quod pertusum ergò tot foraminibus, quot papillae assurgunt, *c* papillas eas nervosas, jam molles, transmittit, firmat, ordinat.

419. Ab iisdem nervosis intertextis staminibus certis locis assurgunt tenuia acuta corpora, *a* pili dicta; quorum alii ex ipsis pinguedinis interpositis glandulis profundè oriuntur; atque infernè propulsa in aëre siccantur; defendendae cuti, & firmandis poris, inserviunt.

420. Ab arteriis autem subcutaneis ramuli innumerabiles dispersi, intertextique, emittunt vascula subtilissima, extrorsum patentia, quae in sanitate vaporem tenuem, volatilem, odorum, falsum, invisibilem, emittunt, sub epidermide halantem; laxatis

L 2

verò

*a* Malpig. de Ling. & de organo tactus.

*b* Ruysch. Ep. 1. F. 4. 6.

*c* Id. lb. F. 5. 7. Malpig. Posth. Tab. xix. Fig. 2.

*a* Malpig. Posth. 93. 94. 95. Tab. xvi. Fig. 10. Ruysch. Thes. 5. 2. Th. 8. 50. Ep. 1. 9.

verô his fistulis, aut humoribus nimium agitatîs, formâ sudoris exit.

421. Sed & venae subcutaneae, pari apparatu factae (420.), vasculis minimis in exteriora patentibus, in se desinentibus, nihil exhalantibus, extrinsecus insinuosos liquores accipiunt, ac lymphae primô, dein sanguini, miscent: ut multa, & certa, experimenta docent.

422. Sed & in cute exteriori meatus sunt ampliores, perpendiculares, profundi, cylindrici, in quos internè ubique ad latera desinunt ora exhalantia sua liquida; quae ibi collecta, stagnantia, siccata, in pastam abeunt vermicularem, in aëre nigrescentem; causam saepe multorum morborum cutaneorum.

423. Superincumbit his *a* Epidermis integrè à subjacentibus separabilis, in plures lamellas divisibilis, vasis constans nullis, quae ullâ arte visibilia reddi queunt; nullo sensu praedita; tota squammosa; *b* squammis adeo parvis, ut incredibile; in *c* sulcos, areasque, exsculpta, quae ad apices digitorum spirales, maximèque spectabiles; in medio horum sulcorum tutò condita haerent vasa sudorifera, in utroque autem sulci latere parallela

*a* Ruysch. Th. III. Tab III. F. 2.

*b* Leeuwenhoek Transact. 106. 127.

*c* Malpigh. de organotactus.



rallela priori series papillarum nervearum : unde liquet vasa sudoris , vasa exhalantia , papillas tactus , hoc tenui , nec impediante sensum , nec incremente , munimento defendi.

## SUDORIS EXCRETIO.

424. **S**ub ipsâ cute, suprâ pinguedinem, in toto ambitu corporis glandulae miliares ; arctè junctae ; arteriâ, venâ, nervo , instructae ; vasculum emissarium dantes , quod per foramen in corpore reticulari (418.) assurgens, patenti orificio sudorem eructat sub Epidermide (423) ; atque tegitur valvulâ cavâ, elevatili, rotundulâ , sub cuticulâ positâ , potente transmittere , & coërcere, humorem : hoc est princeps sudori organum ; cui dein accedunt alia vascula Ruyschiana (420.).

425. Sudor sic secretus varius est pro varietate coeli, soli, sexus, ætatis, temperiei, emunctoriorum, victus, vitæ, temporis coctionis ; fere ut de urinâ dictum (368. &c.):

In corpore sano vix adest, nisi peccato sex rerum non naturalium. Primo effectus semper nocet. Per accidens aliquando prodest.

L 3 426.

\* Malpig. de organo tact.

## SANCTORIANA PERSPIRATIO.

426. **S**unt praeterea vascula exhalantia sub squamulis epidermidis, oblique patentia, eâ quidem subtilitate, ut supputentur 125000 hiare in spatio unius vulgaris grani sabuli à Leeuwenhoekio; his perpetuô transpirat humor subtilissimus ex omni corporis puncto, vocatus ab Inventore primo Sanctorio, cui uni inventi, & perfecti, hujus dogmatis gloria debetur.

427. Hujus exhalatio fit totâ epidermide externâ, tum & cuticulâ oris, narium, faucium, laryngis, pulmonum, oesophagi, ventriculi, intestinorum, vesicae, uteri: inde copia ejus omnium aliarum excretionum aggregatas foeces exsuperat: etenim in aëre Italo, aetate vegetâ, vitâ beatâ, victu moderato,  $\frac{1}{2}$  assumptorum aequat.

428. Summa hujus subtilitas; non turbata aequabilitas; copia maxima; levitas simul ad sensum, & pondus auctum ad stateram; augmentum post somnum; demonstrat perfectissimam sanitatem praesentem esse; simulque est praecipuum auxilium illi conservandae.

429. Recessus verô ejus ab his (428.) certissimus fere, & primus, morbi nuncius, forte & causa.

430. Efficiunt, conservant, augent, & restituunt hanc, viscera, vasa, fibrae, robusta; motus corporis exercitatus ad primum initium levissimi sudoris; venus modicè exercita, excitata corporis salubri robore, non mentis consilio; somnus septem, vel octo, horarum bene tecto corpore, nec gravato nimio stragulorum pondere affectus moderatae laetitiae; juventa; cibi solidi, leves, fermentati, non pingues, interpolatis levissimis aromatibus; aër purus, serenus, siccus, gravis, frigidus.

431. Omnia verò, quae contraria his; ut & omnes reliquae excretiones magis auctae, eam minuunt, impediunt, depravant.

432. Hinc nobis constat, quatenam sit hujus perspirabilis materia, causa, effectus, necessitas, ususque, inprimis ad flexibilitatem, mollitiem, refectionem perdit: maximè quidem, ut papillae nervae humidae, vivae, ab objectis affici aptae, & transmittendis horum impressis effectibus promptae sint, & maneant.

433. Atque intelligitur, aucto sudore (425.), ampliatisque ejus vasis, necessariò perspirationem minui, ejusque vascula comprimere.

Item motu violento, & nimio aestu, perspirabile hoc in sudorem verti.

Motu verò moderato, & calore me-

diocri , quam maximè adjuvari.

Nihil verò ei expediendo plus conducere quam frictiones lenes , diuque continuatas.

Sudorem autem diuturnum , & magnum , lassare , & debilitare maximè.

Eumque debilibus , atrophicis , phtificis , syncope laborantibus , moribundis , semper & necessariò contingere.

Cur autem statim à pastu , & diu post eum , in homine sano perspiratio minima?

Quare intrâ horam quintam à pastu & duodecimam maxima perspiratio?

Quamobrem vectio in equo , rhedâ , navi , motusque imprimis validior suprâ glaciem , aut in nive , adeò eam promovent?

## NUTRITIO, INCREMENTUM, DECREMENTUM.

434. **U**T humanum corpus omnes illos humorum , vasorum , musculorum , motus exercere posset , neque interim destrueretur , requirebatur in vasis , musculis , & fibris , flexibilitas facilis ; ad hanc verò obtinendam debent partes cohaerentes partim à contactu mutari , partim in eo permanere : id fieri nequit , nisi magnae partes ex gracilissimis , tenuibus , curtisque , conflarentur ; nec hoc contingeret iterum , nisi inter has decurreret continenter humor renovatus

vatus, concretionem impediens; ergo totum corpus, quâ flexile, necessariô ex parvis vasis conflare debuit.

435 Ipso tamen eo motu, in vasis tam tenerae fabricae, assiduô, & violenter, exercitato, tam per circumductionem humorum perpetuam, quam actiones musculares, necessariô minimae partes ex solidis deterruntur, detritae liquoribus miscentur, moventur, exhalant; interim fluida continuo attritu imminuta, ad exhalantia vasa appellantur, atque ex corpore evanescunt, hinc ex conditione suâ vivum corpus citô destruitur.

436. Ideô ad constantiam vitae similis continuandam opus est, ut tantum, & tale, in humoribus, solidisque, perpetuô restitatur, quantum, & quale, per motus illos, perditum erat: hoc Nutrire dicitur, & ipsa hæc actio Nutritio.

437. Humores quidem perdit, quoad materiem, ex cibo, potu, æere; quoad dotes requisitas, per vires concurrentes corporis, hucusque expositas, reficiuntur, debitisque suis vasis applicantur: quare de hac parte jam actum.

438. Nutritio solidarum partium, paulô obscurior, intelligetur ex intellectu sequentium.

439 Omnis pars solida nostri corporis consti-

stituitur ex aliis minoribus, majori quam maximè similibus; vasa ex vasculis; ossa ex ossiculis; progrediturque haec fabrica ultrà omnem limitem sensuum quâcunque arte adjuutorum, ut Malpigijs, Ruyschius, Leeuwenhoekius, Hookius, accurato experimento evicerunt. tamen videtur in infinitum usque divisio haec vix procedere, quantum alimenti, humorumque, natura docet.

440. Porrò microscopia, injectiones, vulnera minima, medicamenta vesicantia, atrophia, exsiccatio, docent solida nostra, comparata cum humoribus, valde pauca haberi; quin imò fere demonstrabile est, ex consideratione ortus, & generationis, vasorum, & ex resolutione maximorum vasorum in minima sua constituentia, omnem totius nostri corporis solidam massam meris modò nervis, ut elementis suis, absolutè constructam esse.

441. Et profectò omnis illa massa, incredibiliter parvâ particulâ exceptâ, concrevit ex iis, quae antè erant subtilissimum, quod fere nascitur, colliquamenti liquidum, ipsi ucco nervorum simile, ut docet iterato tractatu de ovo incubato, Observatorum princeps Marcellus Malpigijs.

442. Nec enim prius nutrit ovi albumen, quam vi incubatus ex spissitate sui humoris transiverit innumerabiles gradus fluiditatis per

per diversas undas denique in subtilitatem illam terminatos: sed & tum adhuc datus Embryoni ille liquor crassissimus est, & in longè subtiliores transmutandus in ejus vasis, visceribusque.

443. Ex hoc autem subtilissimo humore orta solida prima tenerrima, liquidis similima, iterum transeunt per gradus infinitos intermedios, donec ad solidissimas partes perventum sit, id docuit in ovis Malpigijs; in embryonibus, foetibusque incomparabilis industriae in his indagandis Ruyschius; imò & ipsa partium diversarum accurata enumeratio.

Quare hinc patet solida in primo suo ortu à liquidis, unde orta sunt, tantum differre quiete, cohaesione, figurâ.

444. Ergò particula talis jam fluida fiet pars solidi inde formandi, simul ac aderit vis cohaesionem ejus cum reliquis partibus solidis efficiens, quomocunque id confecerit.

445. Quae cohaesio in fibrâ jam factâ optimè producitur, si in solido sit locus capax à perditâ solidi particulâ relictus; simulque in fluido particula respondens mole, figurâ, naturâ; tum & vis, quæ eam illi loco vel intrudat, vel accommodet.

446 Fiet ergò nutritio vera solidorum in vasis minimis, quorum adunatione maxima fiunt; id est in nervis, aut vâsculis his similibus (440. 302.).

447. Quod-

447. Quod quum fieri nequeat, nisi liquido in haec vasa advecto: nonne Tibi clarum, materiem ergo proximam nutritionis esse humorem subtilissimum nerveum, eive simillimum?

448. An non & hinc credis, nutritionem esse ex ultimis, perfectissimisque, naturae actionibus? ut enim illa bene fiat, omnes priores actiones bene se habuerint necesse est.

449. Chylus igitur replere vasa, non reficere solida, potest,

450. Idem in pulmone vi respirationis attenuatus, mutatus, subactus, mistus, transitui vasculorum aptus redditus, propior est quidem, sed nondum apta, huic operi materies.

451. Iterato dein pulmonum, viscerum, vasorum, effectu fit serum, blandum, tenax, plasticum, vix sapidum, fere inodorum, ad ignem crassescens, in alcohole itidem; albumini ovi simillimum: adeoque tale fluidum, in quo adsunt omnes conditiones, quae in eo humore, unde certâ experimenti fide novimus solo incubatu omnes solidas partes corporis animalis fieri assiduô. Itaque iterum gradu propiori accedens, nondum tamen nutrimento apta: longè minus ruber cruor: neutrum vasa minima ingreditur.



452. Ut verô incubationis calor, sic actio viscerum, vasorumque, in circumactum hoc serum, introducit mutationes diversas; donec pars abeat in humorem tam subtilem, ac hîc requiritur; consumpta hæc reparatur ilicô; estque hæc tandem vera, proxima, nutrens, materies,

453. Quae quam sit simplex, insulsa, inodora, docet ignis, putrefactio, ars chemica; meram enim, levissimamque terram modo relinquunt.

454. Deprehenditur tamen, non nisi his gradibus (449 ad 453), praeparari posse ultimam materiem (452.).

455. Quin & idem humor sæpe nimis repetitis circuitibus acrior, liquidissimis orbus; densus; evectis oleis, salibusque âsper; inde huic secretioni ineptus, redditur.

456. Inde necessitas novi chyli, adeoque alimenti, & potulenti, ad hanc requiritur nutritionem.

457. Modus, quo, & causa, quâ, hæc fit, intelliguntur ex his sequentibus.

458. Humor rectâ pulsus per canalem plenum; conicum, aut cylindricum; elasticum, vel rigidum; si fluit ex lato in angustius; vel cum renixu quodam contrâ suum motum facto; nitetur producere latera sui canalıs juxtâ axin longitudinis. id fit ubique in corpore, exceptis forte venarum, & receptaculorum cavis.

459. Hoc autem nisu, vel minimo, assidue repetito, sensim, & insensibiliter, vasa haec elongabuntur, & elongando attenuabuntur magis, magisque, idque brevi tempore.

460. Hinc ultimae vasorum extremitates, utpote in nobis tenuissimae, minus cohaerentes, id est dissolutioni proximae, efficientur perpetuo.

461. Itaque fines ultimi vasorum reddentur tam subtiles, tamque debiles, ut vix differant à fluidis.

462. Dum igitur ille motus (458.) perpetuo pergit in propulsione continuata (458 ad 462), necessario haec duo fient; primo nempe ultimae particulae tenuissimarum harum fistularum avulsae iterum quasi in speciem humoris abripiuntur; in quacunque demum parte corporis haeserint: deinde vero particulae minimae, quae fibrillas exilissimas adunatione sua componunt, ita separabuntur à se mutuò, ut vacua interstitia relinquant in iis locis, ubi ante cohaerebant: fiet autem & hoc ubique, & contingent haec ambo assidue, & ubique, quamdiu vivitur: maximè ubi vita valida, actionesque corporis violentae.

463. Idem vero humor, quo haec (462) fiunt, continet abundantes tales particulas, quales fuerunt, quae sic separantur, vel perduntur; eas defert, apponit, applicat, ad

ad illa ipsa interstitia, ipso iterum illo impetu, quo nititur canales destruere; dein interceptas his meatibus fingit, figurat, affigit, ita ut similiter adhaerescant ut priores: enimvero materies, præparatio, applicatio, vis motus, semper manent eadem: ergo accurate, quod perditur, restituitur; manent igitur, ut fuerant, solida; hoc est nutriuntur, conservantur, perpetuò.

464. Id autem, hac in re, Conditoris nostri sapientiam ineffabilem effert, quod eadem causa, quae destruit inevitabiliter, simul etiam destructum reficiat eadem operâ; deinde quoque, quod pro rato, quò majus dispendium, eò largius supplementum; denique, quod illae partes, quae actione corporis præprimis consumuntur, præcisè præcoeteris semper refarciantur optimè.

465. Clarum est, vasa illa quò teneriora, recentiora, propiora causae moventi, eò facilius elongari, distendi, destrui, refici, posse.

466. Ergo corpora nostra, quò propiora primæ suæ origini, eò plus excrefcere.

467. Dum interim pergit actio illa (458), vasa majora à liquore suo magis extensa fiunt, sed simul vascula minima, quae contexta majorum membranas faciunt, compressa, exsucca, concrefcencia, redduntur, unde firmitas fibris, jactura autem ejus vasculi.

468. Quin

468. Quin etiam vasa olim nostra, deinde mœra ligamenta dura fieri observantur, & necesse est.

469. Tandem concretis humoribus vascula coalescere eâdem necessitate persuademur.

470. Harum denique causarum (467. 468. 469.) concursu, robur, durities, rigiditas, crassities, solidi nascitur.

471. Ergò vasorum numerus, in Embryone maximus, crescente ætate, sensim decrescit.

472. Eâdem ratione contrâ debilitas decrescit, robur augetur.

473. Itaque in junioribus humorum copia, & vis, solida exsuperat.

474. In senibus solida vi, & copiâ, fluida exsuperant.

475. Unde incrementi, status, decrementi, mortis purê senilis, intelligitur modus, causaque, & diversa facies.

476. Qui verò omnem hanc historiam considerat, dein ea, quae corpori accidunt simul cum illâ comparat, videt reverâ omnia hæc ita fieri: namque tota cuticula ubique, perpetuô, desquamatur, perit, renascitur; pili, ungues, dentes, assiduô rasi, abscissi, detriti, renascuntur; ablatae vasorum, ossiumque, partes brevi recrescunt, ab omni parte; sordes ab extremis vasculis in toto corpore, deterendo, vel exhalando, collectae,

lectae, microscopiis spectatae, exhalando, vel diluendo, in aquâ examinatae, docent ex solidis & fluidis has fieri; eadem lotu, tritu, razione, paratae, similes sunt prioribus.

477. Inde quoque intelligitur, quod aucta moles corporis quoad totum habitum in torosis, carnosis, obesis, non fiat auctis solidis; sed iis in majores cavitates, humoribus aggestis, stagnantibusque, plenas, extensis. hinc obesitatem obesse, debilitare, suffocare. Ideoque inter repletionem & nutritionem quam maximè distinguendum esse Medico: quum haec roboret, densetque vasa; illa verò debilitet, laxet, extendat, eadem.

478. Quin ratio ex his patet, quare fabrica nostrorum solidorum à liquoribus contentis non dissolvatur? item unde contingat, machinam nostram tamdiu subsistere posse agilem? quam ob causam, nervis corruptis quomodocunque, percat nutritio partis eo nervo praeditae? idemque simul & in arteriâ obtineat? cur in Embryone nulla, in foetu pauca, in senibus provectissimae aetatis plurima sint solida; imo nervi, tendines, arteriae, receptacula, in his cartilaginea, dein ossa, fiant?

479. Tandem scitur quotuplex, quamque multiplex, sit circuitus humorum nostrorum? tum quanti, quamque varii ha-

178 NUTRITIO, INCREMENTUM, &c.  
beantur effectus ejusdem ? rursusque quomodo solvi debeat problema, quo quaeritur tempus accuratum, quo omnes humores semel transeant per cor ? tum & alia similia, quae praecipiti & incauto facilia, sed penficulatê excutienti difficillima, & impossibilia, solutu, ferme apparent.

480. Ordo requirit, ut de Somno agatur, & Vigiliâ: sed quum in iis semper dicendum sit de quiete, aut exercitio, Sensuum interiorum, externorumve, & de iis, quae cõ spectant, series rerum jam ducit ad indagandos Sensus externos; primoque de Tactu, ut communi, universali, simplici.

## DE TACTU.

481. **P**apillae molles; pulposæ; medullosæ; nerveae; pyramidales; ex nervis subcutaneis duris, exutâ membranâ exteriori, emollitis, ortae; hinc admodum sensiles factæ; affluente affiduô tenuissimo liquore humectatae; epidermide tenuissimâ defensae, illibatâ suâ sensilitate; intrâ sinus, foveasque, sub cuticulâ latentes; in locis tactui exercendo propriis, nempe linguâ, apice digitorum in manibus, pedibusque, contractiles; iterumque emissiles; sunt organum corporeum, quo explorata corpora, Tangi dicuntur.

482. In

482. In quibus id mirum , quod reliquâ superficie corporis perpendiculares , circâ apicem digitorum manus , pedisque , juxta longitudinem digitorum exporrectae jaceant, hinc ibidem *a* epidermide adscitâ , ut vaginâ , complicatae , exsuccae , densentur in ungues , defendendis papillis , earumque callositati impediendae , aptos.

483. Tactus igitur fit , si apex digiti applicatur objecto explorando , attentione mentis emittuntur papillae , leniter teruntur supra superficiem , sic imprimitur motus quidam hisce papillis , cujus effectus ad sensorium commune delatus , menti excitat ideam , calidi , frigidi , humidi , sicci , mollis , duri , laevis , scabri , figurati , moti , quiescentis , distantiae , titillationis , pruritus , doloris.

484. Cur , deterfâ , maceratâ , ablutâ , exustâ , epidermide , dolor â tactili ? Cur crassâ , durâ , callosâ , cicatrice corruptâ , epidermide , tactus perit ? quae causâ miri motus â tremore , & â Torpedine pisce , tam ingrati , sensimque in stuporem abeuntis ? unde ad unguium superficiem internam , cuti subjectae affixam , & ad radicem eorum , tam atrox dolor ? Cur ibi sensus acutissimus tactus , ubi ungues , & ubi sulci cuticulae spirales fiunt ?

M 2

D E

*a*. Malpig. posthum. pag. 99. 100. & Epistol. ad Spon. primâ. Ruysch. Th. 111. Tab. 3. F. 2.

## DE GUSTU.

485. *a* **I**N dorso linguae, maximè ad apicem & latera, sub cute ejus, latent papillae obtusae, quae in exsertâ, vivâ, calidâ, humidâ, gustando corpori applicatâ, linguâ emergunt; in mortuis evanescunt; in famelicis inprimis eminent; oriuntur à corpore nervoso incumbente carni musculosae linguae, unde assurgunt per reticulare corpus pertusum, plane ut in cute dictum (417. 418.); dein erectis vaginulis membranae exterioris Linguae supponuntur, iis defenduntur contrâ asperitatem, acrimoniam, calorem assumtorum; sunt autem hae vaginae porosae, & sic eminentes, ut pressius cibus, potusque, quam maximè in eas incurrant, ut objecta excipiant.

486. Atque patet, credibile esse papillas, tam numerosas, oriri a *a* nono pari uni linguae dato, perque eam distributo; quinti verò paris ramum ejus musculosis inservire motibus, ut & alibi facit.

487. Evicit experimentis sedulô factis, & accuratè, *a* Laurentius Bellini, has papillas esse

*a* Malspīg. de Ling. Fig. 2. 1. 2. 3. Ruysch Thes. 1. Tab. 4. Fig. 6.

*a* Willis Nervor. Fig. 9; F. φ. ♂. Du Verney de L'ouye. T. xi. F. 1. Q.

*a* Tractatu de organo gustus.



esse illud organon, cui applicata objecta sapida saporem excitant, reliquas verò oris, linguae, faucium, palati, co nihil facere.

488. Illa in vegetantibus, & animalibus, materies, ex quâ ars elicit salem, & oleum, mista, vel separata, est objectum verum gustus, adeoque sal, sapo, oleum, spiritus; quod idem etiam in fossilibus verum est.

489. Excitatur igitur gustus, si materies gustanda (488) attenuata, in salivâ plerumque soluta, ore calefacta, motu oris Linguae applicata, intrâ poros vaginalium membranae carum insinuata, penetrans ad superficiem papillarum ibi latentium (485.), eas afficit, movet, sicque impressum motum ad sensorium commune defert, in mente ideam salis, acidis, alcalicis, dulcis, vinosi, spirituosi, amari, aromatici, calidi acris, austri, aut compositi ex his, excitat.

490. Porro facile patescit causa, quâ tam diversus sapor excitatur ab eodem objecto, pro varietate aetatis, temperiæ, morbi, sexus, consuetudinis, aliorum prius gustatui applicatorum.

Cur autem sapidissima dolorificis proxima; ut salina, aromatica, spirituosâ, si nudis nervis applicantur, aut excoriatae linguae?

Quare sapida citò instaurantia?

Quamobrem aqua, olea lenia, terra infusa, insipida sunt?

## DE OLFACU.

491. **N**Ares patulae, ex lato in angustum neunt, sursum tendentes, duplicatae, aptissimae sunt, quae cum aëre attrahant, adducant, superficiei suae applicent, volatiles, odoratas partes; maximè dum arctantur simul actione unita Constrictorum alarum nasi; qui a carnei ab anticâ parte inferiori ossium quatuor maxillae superioris ad alas narium inferuntur.

492. Caput autem capacitas naris utriusque id spatium; in quod hiant 1. a sinus frontales; qui plerumque formantur inter remotas ossis frontis laminas, sub eminentiâ supercilio subjectâ, & patenti dein foramine hiant supernè in cava narium proximè ad os nasi superius; recipiunt intra se membranam narium mucosam, quâ tota eorum cavitatis interior superficies ambitur, tegitur; in quâ mucus generatus destillat in

a Cowp. Myotom. ref. pag. 37. app. ad Bidloo. Fig. 35. D.

a Palfin. osteolog. nov. Tab. 11. Fig. 1. E. Tab. 1. Fig. 1. I. Higmore. disq. anat. Tab. XVI. Fig. 3. C. E. Fig. 4. C

narium cava. 2. <sup>b</sup> Antra Higmoriana magna, in maxillâ superiore formata; <sup>c</sup> foramine patulo se aperientia in cava narium; recipiunt quoque eandem membranam; conficiunt, colligunt, excernunt in nares cavae, mucum. 3. <sup>d</sup> Cellulae ossis cuneiformis, sub osse spongioso superiori narium per foramina frequenter distincta patentes in cava narium, recipiunt membranam narium mucosam, eâ investiuntur, mucum fecerunt, & hâc ipsâ viâ emittunt.

493. Sunt praeterea in his narium cavis recondita, & artificiosè, variis locis, disposita quatuor officula Spongiosa dicta narium, in utrâque nare duo; <sup>a</sup> unum superius unitur anterius parti superiori ossis maxillaris, ubi unitur apophysi ossis frontis ad internum oculi angulum; <sup>b</sup> alterum inferius in inferiori parte cavitatis naris junctum ossi maxillari. Sunt haec quatuor officula mirè fabrefacta ex tenuissimis ossis lamellis, pa-

M 4 pyro

<sup>b</sup> Higmor. Disquis. anat. Tab. xvi. Fig. 1. M. Fig. 11. M. Fig. 111. F. Cowp. apud Drake l. 111. Tab. xviii. F. 2. & 3. Fig. 1. 1.

<sup>c</sup> Palfin. Osteol. Tab. 1. Fig. 1. Q.

<sup>d</sup> Id. Ib. P. Tab. 11. F. 2. HH. Fig. 13. LL. MM. Cowper apud Drake l. 111. Tab. xvii. Fig. 4. F.

<sup>a</sup> Palf. Osteol. nov. Tab. 1. Fig. 1. ooop. Cowper apud Drake Lib. 111. Tab. xvii. F. 4. 1. & Fig. 5. collarâ Fig. 6.

<sup>b</sup> Id. Ib. tr collarâ Fig. 2. Cowper apud Drake l. 111. Tab. xvii. F. 4. K.

pyro tenuioribus, sic convolutis, vel appositis, ut forment plurimas cavernulas cavas, intra quas ita se insinuat membrana mucosa, ut intret, exeat, superficies inter lamellas accuratè investiat, & cavum liberum relinquat; cava haec horum officulorum, & omnium cellularum, liberè hiant in cavarium.

494. Nares investiuntur *a* membranâ crassâ, molli, myriadibus vasculorum arteriorum ornatâ, tum simul instructâ rotundis, glandulosis, corpusculis; tum & vasculis tenuissimis, exstillantibus lympham tenuem. Membrana haec sollicitè se insinuat in cava sex Sinuum (492.), & in cellulas quatuor ossium spongiosorum (493.), unde, mirabili instituto, in angusto hoc narium cavo valde augetur explicatae hujus membranae superficies; ita tamen, ut una pars alteri haud obstet.

495. *a* Nervi olfactorii absque durâ matre ad *b* os Ethmoides progressi, fibrillas suas teneras applicant *c* foraminulis in eo osse repertis, vaginulis à durâ matre penetratis, per has fibrae exeunt osse cribriformi, statim-

*a* Ruysch. Thes. 1. 16. Thes. 6. 3. Thes. 3. Tab. 4. Fig. 5. Schneider de Catarrhis.

*a* Vesal. v 11. Fig. 12. C. D. du Verney de l'ouïe. T. XI. F. 1. hH.

*b* Id. l. 1. Cap. 12. Fig. 3. I.

*c* Palsin. Osteol. Tab. 11. Fig. 4. cac.

statimque distribuuntur per totam illam amplam superficiem (494.), usque in omnes sinus, & cellulas (492. 493.) accuratè.

496. Unde certè liquet, latissimam esse horum nervorum expansionem, nec ullibi in nostro corpore nervos tam molles, adeoque nudos, proindeque tam facilè afficiendos, laedendosque, deprehendi, quam quidem hic loci.

497. Proinde omni illâ, ingenti quidem, glandularum in eâdem membranâ copiâ; tum & vasis arteriosis hic tam copiosè distributis in formam fasciculorum, assiduò hic praeparatur, excerniturque, humor blandus, fluidus, inodorus, insulsus fere, excolor, qui nervos (496.) humectet, lubricet, defendat ubique, & in omnibus cavernulis descriptis; idem ille quiescens, stagnans, collectus, inspissatus, semper factus, in quocunque demum situ corporis, deprehenditur alicubi & defluit, vocatur mucus: cujus effectû id fit, quod aliter haud contingeret, nervos hos tenerrimos, nudos, ingenti annorum numero bonos permanere.

498. Ne tamen facile in tophum mutandus hic liquor, intra cava sua nimis diu stagnans, crescens, crassescens, ineptus fieret exire per angustas horum receptaculorum portas, distribuitur huc etiam "nervi quinti

paris ramus ex <sup>b</sup> unione cum nervo paris sexti huc delatus; quo irritato, <sup>c</sup> intercostalis, <sup>d</sup> vagusque, adeoque & nervi musculorum respirationi servientium, moventur, unde sternutatione factâ vi aëris, violento impetu pulsi, irruentisque in has cavernas, abstergetur mucus.

499. Illa autem pars ex animalibus, vegetantibus, fossilibus, est objectum olfactus, quae in spiritu, oleo, sale, sapone, horum haeret, si adeo dividitur, ut in aëre volitare queat: patet autem experimentorum enumeratione, quod id subtile, quod oleo inhaerens spiritus dicitur, sit primum illud, quod odorem excitat; hoc enim absolute separato à corporibus odoratis, residuum vix fragrat, eo autem affuso aliis, fragrantia conciliatur.

500. Animali spiranti per asperam arteriam abscissam, & extra collum per vulnus patentem, nullus à violentissimis olfactus.

501. Expellenti aërem ex pulmone per nares nullus odoris objecti extra positi olfactus.

502. Cohibenti animam pariter odoratus fere nullus.

503. Sed adducenti per nares fit.

504. Quo

<sup>b</sup> Id. lb. bb.

<sup>c</sup> Low. de Cord. Tab. A. bb.

<sup>d</sup> Id lb.. cc.

504. Quo autem fortius adduxerit, & reciprocatis citò vicibus expulerit quis aërem, eò melior olfactus est exercitatio.

505. Motu, calore, tritu, miscelâ diversorum, miscelâ cautâ salium ad objecta odora oleosa, odor rerum odoratarum auge-  
tur.

506. Fit igitur olfactus; dum odora effluvia, aëre contenta, motu inspirationis per nares adducta satis fortiter, eâ vi applicantur ad fibrillas olfactorias nasi figurâ, officulorum positu, eis oppositas, sic agunt in eas, hancque actionem sensorio communi communicantes excitant odorem, acidi, alcali, aromatici, putrefacti, vinosi, & sic porrò.

507. Hinc rursus poterimus intelligere, quam magna affinitas sit inter odora, & sapida, vel gustus, & olfactus objecta?

Quare odores uno saepe momento vitam reddant?

Quâ causâ aliquandò morbos, & mortem, & omne fere genus operationis medicamentariae & venenatae exerceant?

Quamobrem in diversis hominibus odor idem ejusdem odorati adeò oppositos effectus edat.

Quomodo animalia, quibus rostra, nares, longissima; officula spongiosa maxima; acutior odoratum nansciscantur?

Qui

Quî corpuscula exilissima exhalantia, mole unde exspirant vix ad stateram imminutâ, tam diuturnum, & validum, odorem largiri queant?

Quâ ratione foetor exhalans ex putrefactis partibus animalium, & vegetabilium, semel impressus naribus, tam pertinax, molestusque, longo tempore inhaeret?

Fortissima odorifera, nonne sternutatoria?

Quis usus humoris, & muci, in naribus assiduô generati, distributique?

Cur evigilanti hebes odoratus; post sternutationem acuitur?

Estne ille humor repurgando cerebro serviens? & quousque hoc verum?

An mucus in initio dum generatur, crassus? an postea talis fit?

Unde nasi interioris tam magna communicatio cum musculis respirationi servientibus, & cum visceribus abdominalibus?

Estne sternutatio convulsio, hinc adeo delassans, saepe dolores creans, aliquandô lethalis?

## D E V I S U.

508. **S**ylva densa, eminens, arcuata, in assurgente parte ossis frontis posita, Supercilium dicta; rigidi, erecti, arcuati, pili, in margine exteriori palpebrae



pebrarum enati ex suis bulbillis, Cilia dicti; faciunt ut corpuscula volitantia in corneam supernè, infernè, lateraliter, facile in oculum non incidant.

509. *Musculus Depressor superciliarum*, ortus utrimque ex osse nasi, ubi jungitur apophysi anteriori ossis frontis, & tendinibus inseritur tenuibus sub elevatâ parte supercillii, facit ut magis fiat defensio oculi à foribus (508.), & etiam umbra oculo in lumine vividiori posito; dum contractus supercilia palpebrae superiori adducit, & ad se mutuò simul appropinquare cogit: *a* Frontalis autem musculus supercilia iterum elevat, ubi opus est.

510. *Palpebrae* ambae, membranaceae, tenues, plicatiles, vasculosissimae, superficie internâ semper humidae, *a* arcu lato, cartilagineo, munitae, ubi se invicem contingunt, apertae, vel clausae, vel motae repetito nictu, oculum similiter defendunt, purgant. *b* *Musculus* enim *Elevator palpebrae superioris*, angusto carneo principio ortus ex imo fundo orbitae ossae, supergressus attollentem musculum oculi, dispersus in tenuissimas tendinaceas fibrillas, inseritur integrae parti superiori tarsi palpebrae; motus

*a* Vesal. II. Tab. III. A.

*a* Vesal. I. Cap. xxxv. Fig. Ruysch. Th. 2. T. 1. Fig. 3.

*b* Fallop. Obs. pag. 424. Bidloo Tab. 11. F. 4. A.

tusque palpebram superiorem sine rugis elevat. <sup>c</sup> Musculus autem Orbicularis, ortus ex ossē nasi majore, sparsis per utramque palpebram orbicularibus fibris, sphincteris instar se contrahendo palpebras sibi invicem jungit moderato motu, bulbum oculi premit fortiori contractione. Aperitur verò palpebra inferior contractione spontaneâ <sup>d</sup> fibrarum muscularium, in genâ distributarum.

511. Ne autem collisu assiduò nictantes palpebræ excorientur, in limbo utriusque <sup>a</sup> glandulae granulosaë, subflavae, humorem quasi ex adipe & cerâ mistis conficientes, hoc ipso margines inungentes, adfunt.

512. <sup>a</sup> Glandula Innominata, magna, lata, compressa, scabra; conglomerata; sita intrâ orbitam versus angulum externum oculi propè rimam asperam; adipi involuta; arteriis, venis, nervis, lymphaticis, ductibus hygrophthalmicis praedita; ex arterioso cruore humorem falsum, aquosum, pellucidum, blandum, parvâ copiâ semper, majori copiâ frictu oculi, aut actione compri-  
mentis orbicularis, conficit; intrâ oculi bulbum & superficiem internam palpebrae superioris

<sup>c</sup> Cowp. app. ad Bidloo Tab. 8. F. 33. B. Bidloo Tab. 11. Fig. 4. BC.

<sup>d</sup> Id. Ib. E. D. G.

<sup>a</sup> Valsalv. de aure pag. 3. Ruysch. Th. 2. Tab. 1. Fig. 5. BB.

<sup>a</sup> Bidloo Tab. XI. Fig. 3. C. Fig. 5. BC.

rioris dimittit; oculum humectat, lubricat, lavat, à concretionem cum palpebris servat. Hic humor abundans Lachryma dicitur. Cui forte similis exiguis in palpebrâ superior glandulis conficitur in usus eisdem, ac prior.

513. Humor certè uterque (512), unâ cum absterfis fordibus, <sup>a</sup> figurâ, & determinato concursu limborum palpebrarum, qui clausi relinquunt liberum in angulo oculi majore his excipiendis spatium, carunculâ spongiosâ ibi positâ formatum, determinatur in illud spatium; ibi crassior pars affixa, & collecta ad scabritiem dictae carunculae, in lemas siccata averritur; liquidior vero imprimatur mirabiliter determinato motu in dilatata <sup>b</sup> foramina posita in extremo cujusque palpebrae angulo, quae Lachrymalia Puncta dicuntur; à quibus educti canales Lachrymosi concurrunt post carunculam illam in saccum lachrymalem positum in canali nasali, qui fit concursu ossis unguis, & ossis anterioris maxillae superioris; ex quo apertâ semper fistulâ ducitur in cavum nasi immediatè sub ossè spongioso inferiori. Unde scitur causâ, cur lachrymantibus stillicidium per nares; & quare sanis lachrymosus omnis humor evanescat?

514.

<sup>a</sup> Inspiciatur oculus apertus.

<sup>b</sup> Ruysch. Thes. 2. Tab. 1. Fig. 3. C.

<sup>c</sup> Vesal. 1. Cap. 12. Fig. 1. A C.

514. Sic igitur oculi , quâ exponuntur aëri , conservantur humidi , nitidi , pellucidi , lubrici , mobiles , calidi , ab omni il-  
lapso aspero , vel acri , citò liberandi , aequa-  
biliter expansiles à causâ intus distendente.

515. Fabrica oculi , ejusque inde pendens actio , optimè intelligitur , si à nervo opti-  
co incipiens quis contemplatur dein eo or-  
dine , quo hinc pendent , omnes reliquas  
ejus partes , & munera.

516. *a* A summâ regione substantiae me-  
dullaris , quae sub corporibus striatis cere-  
bri , *b* prodeuntes nervi Optici ; *c* deorsum  
tendentes ; *d* sub infundibulo uniti accuratissi-  
mè ; dein iterum secedentes ; *e* ad foramina  
rotunda orbitarum ossæarum oculi fundis in-  
sculpta perveniunt ; totâ hâc viâ molles ,  
*f* porosi , solâ membranâ tenui cerebri vesti-  
ti ; *g* vasis plurimis arteriosis instructi sub  
suspensio cerebro tutò decurrunt ; in transi-  
tu per haec foramina meninge durâ investi-  
ta , eam ut vaginam validè priori tunicae  
adnatam adsciscunt , sic intra orbitarum os-  
sæarum

*a* Vieuss. Neurogr. T. VII. F. F. du Verney. de l'ouie  
T. XI. F. I. l. I.

*b* Id. Ib. T. XI. H. H.

*c* Will. de Cer. F. I. EE. Vieuss. Neurol. T. V. HH.

*d* Will. Loc. cit. EE.

*e* Id. Ib. F. V. DD. Vieuss. de Cer. T. XVII. Fig. 1. GG.

*f* Ruysch. Ep. 13. T. XVI. Fig. 5. Fig. 4. C.

*g* Ruysch. Ep. T. 13. D.

searum cava se penetrant, ibidemque & ipsa dura mater plurimis arterioliis irrigata spectatur.

517. Ossea haec orbita interna, periosteo succincta, plurimâ pinguedine infarcta, hoc quasi pulvinare bulbum oculi excipiens firmat, defendit, lubricat, mobilitatem conciliat.

518. Dein vagina illa a durâ matre data nervo optico, orbitam suprâ pinguedinem dictam ingressa, mox se explicat in globum fere perfectum, membranaceum, quasi coriaceum, durum, toti oculo obvolutum, fissim gracilescens, antèrîus tenuiorem, pellucidum, magis prominentem; vocatur Dura vel Sclerotica, ubi opaca; Cornea ubi pellucida & tenerior. Figurae firmandae, fulcendis vasis, sustinendis musculis, horumque tendinibus, imprimis inservit. Per hanc enim <sup>a</sup>arteriae, <sup>b</sup>nervique, ingrediuntur.

519. <sup>a</sup> Illa autem membrana, quae Opticum involvens, à piâ matre erat, ingressa & orbitam, succingens cavam superficiem Scleroticae, <sup>b</sup> in binas lamellas, infinitis diverso <sup>1</sup>reptatu <sup>2</sup>distinctis arterioliis praeditas divisibilis, ex doctrinâ Ruyschii, per-

N git

<sup>a</sup> Id. Ib. T. xvi. F. 6. B.

<sup>b</sup> Id. Ib. A.

<sup>a</sup> Ruysch. Ep. Tab. 13, D. Tab. xvi. F. 4. C.

<sup>b</sup> Id. Ib. F. 7. F. 8.

git ad locum, ubi Sclerotica Corneam facit, ubi a Scleroticâ introrsum recedens primò dat <sup>c</sup> tenuissimam membranulam humori vitreo obductam, secundo <sup>d</sup> tunicam Uveam, in cujus medio <sup>e</sup> pupilla. Vocatur lamella duræ contigua, & incumbens, Chorœides; illa lamella, quæ huic insidet, Ruyschiana.

520. Dum verò margo Chorœidis excurrens Uveam format, accipit simul <sup>a</sup> nervos ab iis, qui ad Scleroticam appellentes, hanc & Chorœidem perforantes, hîc illi communicati, in plurimos divisi sunt. Ex his, & membranâ, fiunt fibrae musculares exteriores Uveae, ab ortu suo versus centrum tendentes desinunt in limbum orbicularem, fibris muscularibus orbicularibus constantem, & spatium, figuramque, pupillae definientem; qui limbus retrorsum versus interiora reflexus, exteriori se triplo major internas fibras rectas Uveae excipiens similiter cœrct. Unde patet orbiculares constringere, longitudinales dilatare foramen pupillae. Membranulae autem exiles, pellucidaeque, fibras connectentes, aterrimo pigmento obducuntur, quâ parte posteriora oculi respiciunt.

521. Sed

<sup>c</sup> Id. Ib. F. 1.

<sup>d</sup> Id. Ib. Fig. 8. C. D.

<sup>e</sup> Id. Ib. E.

<sup>a</sup> Ruysch. Ep. T. XVI. Fig. II. B. C.

521. Sed & ibidem in Uveâ est <sup>a</sup> structura arteriosa mirabilis in annulos, indeque emissas propagines, contexta; quum jam ante illae <sup>b</sup> arteriae, unde hae oriuntur, in tunicâ Chorœide mirabiles utcunque similes fabricas passae essent. Contemplatio autem insignis hujus apparatus nos docet, quod ibidem fiat attenuatio summa subtilissimi humoris, & facilis reductio crassioris portionis.

522. Interim ex eodem loco (520.) ambitus chorœidis exorsa tenuissima illa membranula (519.) etiam instruitur <sup>a</sup> fibrillis muscularibus arcuatis, assurgentem gibbam annularem superficiem humoris vitrei, ubi extrâ lentem crystallinam eminet, amplectentibus; harum quidem fixum initium in illo orbe sui ortus, finis mobilis in orbe illo vitrei humoris, ubi lentem crystallinam deferit; harum distantia major, quam earum, quae in Uveâ; quam distantiam ater etiam color opplet: quin & <sup>b</sup> vasa sanguinea ibi eodem modo, ac in Uveâ (521.) deprehenduntur.

523. Coercetur coeteroquin corpus flexile vitreum propriâ subtilissimâ membranulâ

N 2

tenuif-

<sup>a</sup> Ruysch. Ep. T. xvi. F. 17. 18.

<sup>b</sup> Id. Ibid. Fig. 7. 8. 9.

<sup>a</sup> Ruysch. Ep. T. xvi. Fig. 13. 14.

<sup>b</sup> Ruysch. Th. 2. T. I. F. 6.

tenuissimis undique vinculis Chorœidis cavo nexâ, quae adeo tenuis, ut vix apparere queat, maximè ob pelluciditatem summam; sed destillatione aquae ex humore vitreo cadentis laesâ hâc membranulâ deprehenditur.

524. In cavo mediâe superficiei anteriori humoris vitrei inhaeret superficiei inferiore suâ lens crySTALLINA liberè, nexa ibidem ope membranae vitreae (523), & etiam ope membranae tenuissimae suae; sunt verò hae membranulae, & cœercita iis corpora, adeo pellucida, & tenuia, ut planè transparent; tamen & suis vasculis construi ratio docet, & in <sup>a</sup> maximo animalium Balaenâ jam patuit.

525. Tandem <sup>a</sup> medullosa portio interior nervi Optici ingreditur fundum bulbi oculi ita, ut locus hujus ingressus ratione altitudinis sit in medio; sed ratione latitudinis sic situs est, ut fere haereat in tertiâ parte distantiae ab angulo interno oculi in diametro metiente oculi latitudinem. Unde axis opticus non cadit in locum hujus ingressus, sed multum inde recedit versus angulum exteriorem. <sup>b</sup> Ingressâ autem haec medulla, mox expansa in fundo bulbi sub vitreo, undi-

<sup>a</sup> Ruysch. Thef. 2. Tab. 1. Fig. 8.

<sup>a</sup> Ruysch. Ep. Tab. xvi. Fig. 4. c.

<sup>b</sup> Id. lb. Fig. 15. B. Fig. 19. B.



undique affurgens , in ingressu arteriis majoribus , unâ cum eâ expansis , stipatur ; habet & lymphatica ; coeterum instar tenerimi muci ibi haerens , tunica Retina appellatur.

526. Cavum oculi formatum à corneâ cavâ , & superficie convexâ vitrei & crystallini corporis , plenum est humore tenui ; pellucidissimo ; subsalfo ; inodoro ; citò crescente ; adeoque citò exhalante ; flaccidam corneam in aequabilem convexitatem extendente , conservante ; uveam suspensam sustinente ; in juventute liquidissimo , sensim per varios gradus paululum opacato , in senio saepe albescente ; videtur oriri ex arterioso cruore in chorœide praeparato , in annulis arteriosis Iridis , & humoris vitrei perfectius elaborato ; in arteriis inde oriundis lymphaticis minimis ulterius attenuato ; dein per patentia undique foramina horum in internâ superficie Corneae , Iridis , Uveae , membranae Vitreae , membranae lentis Crystallinae , in cavum hoc assiduò transsudante ; deinde osculis & hîc patentibus venularum lymphaticarum perpetuè resorpto , sine ullis omninò relictis toecibus. Cui certè operi ineptos esse ductus Nukkianos , & aliorum , facillimè liquet consideranti. Eâ-

N 3

dem

c Id. Ibid. Fig. 16. B.

d Valsaly. de auro. pag. 77.

dem ergô hâc operâ tenerrimis his partibus conservandis , humectandis , lubricandis , in pelluciditate retinendis optimè servit.

527. CrySTALLINA lens solida ; utrimque sphaerica ; innumerabilibus segmentis sphaericis , fibrosis , arctè unitis , pellucidissimis , conflata ; humore aqueo densior , & vitreo ; posita in eo loco , ubi axis visus ejus centrum transit , ejusque axin facit ; propior corneae , quam retinae , vasculis infinitis constans , ut exsiccatio , ponderis amissio , corporis contractio , docent ; male humor crystallinus vocatur. Vasa videtur accipere ex continuatis sibi.

528. Quin & vitreum corpus pellucidissimum ; flexilissimum ; aqueo densius ; undique vasculare , ut docet extillans ex puncto humor , & exsiccatio ; hinc etiam humore circulante procul dubiô constans ; contractis fibris arcuatis ( 522. ) annulo depresso , medio elevato , hinc lente crystallinâ elevatâ , corneae adductâ , à retinâ remotiori factâ ; laxatis fibris se restituens in annulo illo , in medio itaque subsidens , sic fundo oculi adductâ lente crystallinâ , munus suum perficit.

529. Oculus sic constructus ( 515. ad 529. ) & in orbitâ locatus , anteriori parte accipit membranam Adnatam ; laxam ; mobilem ; periosteo ortam , ex ambitu exteriori

ri orbitae; vasculosam; toti anteriori oculo obductam, pellucidam; quâ firmatur, mobilitate facili illibatâ, oculi bulbus.

530. Tum quatuor <sup>a</sup> muscoli, ex ambitu foraminis majoris orbitae carnei orti, circa bulbum adscendentes, in medio circiter tendinescentes, sic scleroticae infixi, illique connati, oculum elevant, depriment, adducunt naso, abducunt, figunt, rotant, comprimunt, elongant, prout solitarii, vel in motus varios conspirantes, agunt. Dein <sup>b</sup> Obliquus superior, ex imâ orbitâ juxtâ attollentem, carneo principio ortus, in progressu carneo ventre instructus, in rotundum tendinem mutatus, qui trochleam cartilagineam intra <sup>c</sup> anteriora orbitae versus nasum transgressus, inde retrogressus, inferitur medio loco inter attollentem insertum bulbo, & inter ingressum optici; facit ut bulbus versus nasum circumrotari circa suum axin, extrorsum duci ex orbitâ, pupilla simul deorsum verti, possit. <sup>d</sup> Obliquus verò inferior, carneus ex <sup>e</sup> exteriori, inferiori, illâ parte orbitae, quae jungit hic ossa, ortus, inter abducentem, & opticum nervum tendine suo inferitur; facit ut bulbus versus angulum

N 4

lum

<sup>a</sup> Cowp. app. ad Bidloo. Fig. 34. EFGH.

<sup>b</sup> Id. Ib. DBA.

<sup>c</sup> Id. Ib. Fig. 35. a.

<sup>d</sup> Id. Ib. Fig. 34. I. C.

<sup>e</sup> Id. Ib. Fig. 35. c.

lum exteriorem circumverti, pupilla eô dirigi, simulque fursum duci, totus vero oculus extrâ orbitam trahi queat: quod si bini hi simul egerint, versus exteriora ex orbitâ tuberantem oculum truces figunt, & prospiciundo in omnes insidias vicinas aptum reddunt; suspensum denique suscipiendis motibus quatuor muscutorum priorum (530. a.) facilem admodum praebeant.

531. Ut porrô determinetur modus, & locus, Visionis, ad hanc structuram oculi (508. ad 531.) cognitam erunt applicanda illa omnia, quae in opticis, catoptricis, dioptricisque, demonstrata habentur; quae hûc transferenda compendio essent inprimis ex Isaaco Newton, Viro certê tantae penetrationis in Mathematicis, & Phycis, ut humani ingenii ultimos limites transiisse videatur.

532. Lux, colorum omnium collectorum aggregatum, quaquaversum emittit radios subtilissimos quidem, sed tamen compositos ex omni rursus colorum genere; hinc divisibiles iterum in simplices; qui seorsum, vel diversi collecti, faciunt colores varios, sed omnes simul uniti splendidissimum jubar lucidum, vel nitorem candidissimum; hi radii à puncto lucido, ut centro, versus omnia puncta extrâ posita, lineis rectis in homogeneo medio, absque cognoscendo intervallo temporis transeuntes pellucida,

cida, feruntur; in opaca objecta irruunt; adeoque appellant etiam ad omnia puncta corneae illi, qui intrâ conum continentur, qui fit puncto lucido ut apice, plano corneae ut basi, si inter punctum radians & corneam nullum impedimentum interpositum.

533. Radii iidem appropinquant ad corpora densiora incurvantur eò, alii plus, alii minus; hinc separantur; separati, reflexique, colores diversos dant, falsò corpori reflectenti, refringentive; adscriptos; nisi quatenus ejus vi separantur. reflexio hic ergò varia pro varietate coloris in radio latentis, sed tamen in reflexione videtur idem angulus reflexi & incidentis radii cum perpendiculari erectâ ex loco incidentiae, nec coeterum ulla hic mutatio fieri videtur.

534. Si autem radii illi incidunt ex uno medio in aliud, circa posterius appropinquant incurvantur, dein tales porrò pergunt per illud medium; quò corpus posterius densius, eò magis sunt versus perpendicularum, & contrâ; tum etiam ob singularem hic latentem in nonnullis fluidis causam, non nisi experimentis ipsis determinandam. Inclinator haec Refractio appellatur.

535. Illa autem ad sensum fit certâ hâc lege: Idem radius in idem pellucidum medium per varios angulos incidens si fuerit,

erit ut sinus anguli incidentiae ad se mutuò, ita sinus angulorum refractorum quoque.

536. Hinc itaque radii à puncto radiante, vel reflectente, ad corneam acti pellucidam, eâ refringuntur ad perpendicularum, fere eâdem viae mutatione, ut in aquâ; sic pergunt per humorem aqueum; determinantur ut eant per foramen pupillae in superficiem lentis crystallinae; illi verò, qui tantâ obliquitate intröcunt, ut in Iridem cadant, inde reflexi excidunt iterum ex oculo, ne reflexi & ingressi oculum distinctionem visus turbarent: sed & alii, qui obliquitate suâ inter uveam inferiorem & vitreum corpus, aut in superficiem corporis vitrei, illabuntur, statim quoque ita suffocantur in atro & ibidem pigmento, ac si nulli fuissent, ut sic nulli alii possint per humorem vitreum transmitti, nisi qui pupillâ penetratâ in lentem crystallinam incidunt: Iris interim contracta, vel dilatata, plures, paucioresve, admittit radios, prout objectum vividius, propiusve, aut languidius, remotiusve fuerit, hæc lege: quò luminosius objectum, eò arctior pupilla; quò propius objectum, eò arctior pupilla; & contrâ; id fit machinâ descriptâ (520.), & defendit tenerrimam retinam, ne laedi, exsiccari, comburi possit.

537. Ergò cornea quò planiorem habet  
figu.

figuram, eô minus cogit radios ab uno puncto lucido allapfos, eôque magis hos dispergit, unde pauciores lentem crySTALLINAM attingunt, illique adhuc valde divergentes, nisi à remoto admodum objecto venerint: quô autem eadem rotundior habuerit, eô plus uniet ab uno puncto radiante allapfos, eôque plures in lente crySTALLINA colligit, eosque valde convergentes. unde unâ ratio Myopum, & Senum, visus intelligitur.

538, Lens crySTALLINA determinatos pupillâ radios acceptos novâ refractione plus colligit, convergentes reddit, eâ lege, ut qui ab uno puncto extrâ oculum orti hic iterum in unum punctum collecti haud remotum, per vitreum ad retinam allabantur, ibique solum pingant unum id punctum præcisè, unde manabant illi radii: si lens crySTALLINA valde densa, aut rotunda, tum punctum collectionis nimis propinquum lenti, unde confusio, si nimis laxa, aut plana, punctum remotius, figitur, unde iterum confusio. Hinc altera ratio Myopum, & Senum, visus habetur.

539. Cur ergô Myopes vitro cavo dioptrico, vel propinquiore objecto, juvantur? & quare Senes, dioptrico vitro convexo, aut remotiore objecto, accuratius vident? ratio est clara ex præcedentibus (537.538.).

Quin

Quin & vitia haec (539) emendantur adductione lentis crystallinae ad corneam, aut remotione ejus ab illâ, quae duplici diverso medio fieri videtur: nempe compressio oculi bulbo per quatuor musculos validè contractos simul, hinc longiore facto; vel contractione fibrarum (522.), vitreum comprimendum, lentem elevantium. Nec alia hic causa apparet.

540. Refractio ex aëre in corneam acquatur illi fere, quae fit radio ex aëre in aquam dilapso; quae ex aquæo humore in lentem, aequiparatur illi, quae radio contingit ex aquâ in vitrum acta, unde parum mutat; illa denique, quae paratur, dum ex lente crystallinâ in corpus vitreum, parum modò mutat, & compressio arctius humore vitreo forte vix differt, dum corpus illud sic densius fiat, unde necessitas humoris vitrei inprimis videtur ea esse, ut lens liberè moveri potens oculum diversis distantibus bene accommodet; dum interim ipsa lentis massa constantior est figurâ suâ, quam vitreum corpus.

541. Unde totus hic apparatus id efficit, ut in fundo oculi rectâ sub pupillâ fiat distincta, & vivida, collectio eorum radiorum, qui ab uno puncto objecti progressi, in oculum introgressi, lentem crystallinam penetrant, sicque in fundo hoc pingantur tot puncta, ac fuerunt conspicua in imagine,  
unde



unde similis objecto in retinâ fingitur imaguncula.

542. Quum enim mucosa medulla nervi optici praecise hîc loci directè sub pupillâ & lente haereat, patet hanc esse partem illam, quae picturas excipit, atque continuatione hujus impressionis sensorio communi offert, mentique excitat ideam rei visae.

543. Imò hinc apparet Picardi experimentum, & Mariotti, id ipsum clarè docere (542), neutiquam destruere, ut Auctores putant: quin & laudanda venit infinita sapientia, quae ingressum optici non in axe visus locavit, neque etiam versus angulum anteriorem oculi, sed versus nasum in media altitudine.

544. Perfectio igitur visus pendet ab eâ figurâ, pelluciditate, fabricâ, virtute, solidorum; & ab eâ densitate, & pelluciditate humorum excolorum; quibus ab unoquoque puncto visibili objecti plurimi radii, nullis aliis misti in unum distinctum retinae punctum colliguntur; foco hoc nec remotè nimis, nec nimis propè, facto; deinde ab eâ mobilitate horum amborum, quae objectis in diversâ distantia positis, clarè, & distinctè, pingendis par est; sic enim magnitudo, figura, distantia, situs, motus, quies, lumen, color, optimè repraesentantur: deinde in tunicâ Retinâ exigitur ille situs, expansio,

panſio , pruritus , teneritudo , proportio inter medulloſam , arterioſam , venoſam , lymphaticam , ſubſtantiam , quae imagines illibatās per liberum , bonumque , nervum opticum ad ſenſorium commune uſque deferat.

545. Ergo radii non emanant ex nobis , nec iterum ab objectis reflectuntur in nos , ut Stoïci aſſerebant ; nec videmus ſpecie viſibili ab objectis in nos emiſſā , ut Pythagorici dicebant ; haud etiam emiſſis effluviis ab objecto , & oculo , obviam factis , ſemutuo amplexis , & inde reflexis , ut Platonici mire ratiocinabantur ; tandem non emanatione materiali corporearum imaginum , ut cenſebat Epicurus. Sed eā mechanicā , quae expoſita , cujus intellectum egregie expedivit Celèberrimus JOHANNES JACOBUS RAU in accuratā deſcriptione organi interioris oculi , datā ad me epiſtolā communicatā.

546. Cur objecta poſita in diſtantiā minimā , quam oculus fert , ut diſtincte videat , apparent clariffimè ?

Cur remota inde in magnā diſtantiā diſtincte , ſed languidiuſ afficiunt ? Cur propius poſita , tam confuſa videntur ? quid requiritur ad diſtinctum , quid ad fortem , viſum ? &c. omnia ex dictis facilia.

## D E A U D I T U.

547. **S**onus est motus tremulus æeris communis, ortus à corpore sonoro cum concutiente per reciprocum tremorem sui elateris. Ejus propagatio fit à centro sonoro per lineas inprimis rectas in ambitum sphaerae suae potestatis; & quidem eâ lege progressus, & reflexus, quae in radiis luminis obtinet (533.); nisi quod successivè fiat ejus propagatio, nempe 968 pedes Anglicos spatio minuti secundi horae absolvens; magnus & parvus aequè celer ut & adverso vento latus qui minus tamen extensus est; corporibus elasticis objectis tremores inprimit; eos verò elastica corpora reflectunt vix mutatos. Auditus verò est soni perceptio excitata in mente ope organi totius Auditorii dicti.

548. Hinc ergo scitur 1. <sup>a</sup> quod auris externae membrana polita, tensa firmiter supra <sup>b</sup> cartilaginem tenuem, elasticam, tremulam, cartilagineâ basi ossi temporum adhaerentem, tensamque, radios sonoros exceptos reflectat fortiter, nec suffocet, nec immutet.

549. Sed

<sup>a</sup> Valsalv. de Aur. T. I. F. I. du Verney de L'ouye. T. I. F. I.

<sup>b</sup> Valsalv. Ib. F. II. Verney T. III. F. I.

549. Sed figura auris externae multa habet notanda: etenim ejus <sup>a</sup> eminentia notabilis elevata suprâ os temporum utrimque, facit ut vix ulli radii praeterlabi queant utramque aurem simul: ejus autem <sup>b</sup> tres spirales plicae, suâ fabricâ, positurâ, subordinatione, inclinatione, intortu, decursu, concursu, faciunt, ut radiorum sonorum, â puncto sonoro emissorum, ab alterutrâ aurium, vel ab utrisque, satis copiosi excipiantur, reflectantur illibati, deinde verò uniti simul in <sup>c</sup> concham externiorem pellantur.

550. <sup>a</sup> Apertura verò cava Conchae, elastica, liberaque, <sup>b</sup> binis musculis instructa, horum actione applanari, expandi, tendi, variis tremoribus excipiendis aptari, potest; quin & sic disponitur eô, ut radios eosdem magis unire, vel laxius dispergere potens, se accommodet forti sono temperando, debili augendo, ut variis par sit.

551. <sup>a</sup> Meatus autem auditorius tubâ partim <sup>b</sup> cartilagineâ, partim <sup>c</sup> ossêâ, constans; vestitus simili membranâ (548.), sensim tenuiore,

<sup>a</sup> Valsalv. T. I. F. III. T. IV. F. f. f.

<sup>b</sup> Id. T. I. F. I. II. IV.

<sup>c</sup> Du Verney. Ib. T. I. F. I. E.

<sup>a</sup> Id. Ib. T. III. F. II. BB.

<sup>b</sup> Id. Ib. T. I. F. I. H. F. II. B.

<sup>a</sup> Valsalv. T. III. F. I. BBE. F. III. AD.

<sup>b</sup> Id. T. I. F. II. BB. du Vern. T. III. F. I. B.

<sup>c</sup> Id. T. IV. F. I. DF.

nuiore, valde nervosa, aquâ viscidulâ & cerumine, à glandulis suppositis transsudante, defensâ; sono illaeso versus interiora deferendo aptissimus; obliquitas autem illius in canali hoc auget superficiem, & multiplicat loca reflexionum; <sup>e</sup> Lingua porrô cartilaginea triangularis, tremula, erecta, cavo conchae, maximè autem orificio meatus auditorii è regione supraposita, <sup>f</sup> musculo instructa, egregio mechanismo facit, ut omnes huc illapsi radii determinantur intrâ meatum, nec exiliant, undecunque reflexi fuerint; <sup>g</sup> Figura ejus tubulosa, cylindro-elliptica, serpentino progressu adscendens, descendens, iterumque adscendendo in membranam tympani terminata, auget sonum, reflexionem, facitque, ut radii omnes in medium centrum sui finis collecti incurrant, clangore interim impedito.

552. <sup>a</sup> Membrana Tympani <sup>b</sup> triplicatâ lamellâ instructa, quarum media vasculosa admodum, extimae vix vasa habent, <sup>c</sup> oblique sic posita, ut ad superiora meatus inclinet, ab inferioribus excurrat, hinc ad su-

O

per-

<sup>d</sup> Id. T. III. F. II. D.

<sup>e</sup> Valsalv. T. I. F. I. D.

<sup>f</sup> Id. Tb. F. IV. B.

<sup>g</sup> Id. T. III. F. I. BBE F. 2. AD.

<sup>a</sup> Du Verney. Tab. V. F. I. A.

<sup>b</sup> Ruysch. Ep. 3. pag. 11. 12. T. 9. F. 9. 10.

<sup>c</sup> Valsalv. T. III. F. III. F. du Verney, T. V. F. I. 4. 3.

periora obtusum, ad inferiora acutum, angulum cum meatu formans; auget sic superficiem plus, quam si ad perpendicularum apponeretur, hinc locum facit ampliorem pluribus radiis sonoris incurrentibus, adeoque & tremulos concussus multiplicat, imprimis autem efficit, ut incurrant radii praecipuè in medium hujus membranae centrum; ut facilius tremat: quum verò exterior lamina membranacea ex meatu auditorio, intima a membranâ succingente tympanum, oriatur; patet hinc membranam hanc quamaximè communicare cum internâ & externâ aure. an media ex expansione membranae nervaceae?

553. Hujus dein <sup>a</sup> arcta applicatio ad marginem meatus ossæ, ejus tenuitas, siccitas, laxitas, <sup>b</sup> Figura cava à parte meatus auditorii, convexa à parte ossis petrosi, <sup>c</sup> Mallei ad hanc applicatio, docent quod haec membrana arceat aëris ingressum ex meatu auditorio in aurem internam; tum fordes, humores, insecta, pulveres, & similia, cerumine hîc inviscari, excitatoque titillationis motu imprimis à pilis exiguis ibidem natis, iterum expurgari; motus sonoros ad interiora transmitti; & forsan aliquid obscuri auditus hîc exerceri.

554.

<sup>a</sup> Id. Ib. K.

<sup>b</sup> Valsalv. T. III. F. III. F.

<sup>c</sup> Id. Ib. CF.

554. *a* Mallei ad membranam Tympani applicatio arcta, *b* usque ad ejus fere centrum extenso manubrio; dum interim *c* caput mobile in sinu osseo; & dum *d* alterâ superficie sui capitis, binis tuberculis unoque cavo praeditâ, committitur articulatione cum *e* binis cavitatibus, & eminentiâ unâ, corporis Incudis coeterum *f* liberê hîc suspensi; insertio trium musculorum in hunc malleum artificiosa; etenim occurrit hic primô *g* musculus externus laxator membranae tympani, qui ex superiori parte marginis externi ossei meatus auditorii principio carneo ortus, in tendinem desinens, sub membranâ glandulosâ ceruminosâ decurrens, tendine suo ascendit ad superiora membranae tympani, ubi transit per sinum ibi in margine annuli ossei relictum, suo tendine intrat in concham internam, & descendens usque ad mallei tuberculum inter humiliorem & elatiorem ejus apophysin, ibi inferitur, unde patet ejus actione malleum & membranam tympani versus meatum auditorium trahi, &

O 2

pro-

*a* Du Verney. T. v. F. 1. DB.

*b* Id. Ib. B.

*c* Id. Ib. D.

*d* Id. T. vi. F. III. 1. 2. 3.

*e* Id. Ib. F. II. 1. 2. 3.

*f* Id. Ib. F. 1. B. Tab. VII. F. 1. F.

*g* Aquap. de aure. F. 17. 2. Cowp. app. ad Bidloo. F. 15. ed. Casser. de org. aud. T. ix. F. 1. 2. 3. 4. F. 4. K.

proinde membranam ad planitiem, laxitatemque, duci; secundò hicprehenditur *b* musculus externus, qui ortus tendinosus à parte externâ meatus Eustachiani, ei incumbens carneus, adscendens sursum retrorsum intrat cavum tympani, conditur in obliquo sinu insculpto suprâ marginem ossæ membranæ tympani, se inserit apophysi gracili mallei, maximè productæ in processum longissimum, gracilissimum, flexilem, elasticum, quem laudabili industriâ hîc invenit J. J. Rau, & cui latissimâ fibrarum applicatione uniri hunc musculum docuit in mirabilem certè usum, ut nempè innumeris determinationibus ducat crassiorem partem mallei, & membranam tympani versus meatum auditorium; tertiò invenitur *i* musculus internus Eustachianus, qui ortus fibris suis ab anteriore latere cartilaginis meatus Eustachiani, dein contentus in femicanale osseo excurrente lateraliter ad superiora meatus Eustachiani, cum deferens tendine suo emergente prope ovalem fenestram, circâ ossæ quasi trochleam reflexo, inseritur ipsi malleo à parte posteriori sub insertionem externi musculi mallei, ope hujus musculi contracti trahi-

*b* Du Verney. T. VI. F. V. 2 DC. F. IV. C. T. VII. F. II. E. T. V. F. I. K.

*i* Du Verney. T. VI. F. V. F. 3. 4. E. F. IV. D. Val-  
salv. T. X. F. I. dc. T. III. F. XIV. B.



trahitur malleus & membrana tympani versus os petrosum, tenditur, concava redditur, membrana; docent, inquam, haec omnia, quod malleus, ut vectis, applicatus membranae tympani, ut momento mobili, innixus sinui excavati marginis, ut basi fixae rotationem sustinenti, tensus ope unius, binorum, vel ternorum, muscutorum, possit 1. membranam tympani tendere, remittere, convexam reddere, planiorem facere, diversimodè dirigere, figere, suspensam tenere, per varios gradus, variasque directiones; 2. hâc ratione spatium conchae internae variare, aërem adducere, expellere, comprimere, prout simul meatus Eustachii aperitur, vel clauditur; 3. Hinc membranam tympani adaptare recipiendis tremoribus sonoris harmonicè tensis corporibus communicandis, iisque Incudi facile impertiendis: ut Harmonice mathematica docet.

555. *a* Incudis corpus articulatum malleo, *b* innitens sinui osseo ad malleum; ejus *c* processus brevioris suspensio libera à ligamento suspensorio in superiore posteriore cavo conchae; ejus *d* processus longioris nexus cum ossiculo orbiculari; *e* hujus articulatio

O 3

cum

*a* Du Verney. T. v. F. 1. E.

*b* Id. T. 1v. F. 1. Suprà F. & F. 2. in parte superiori.

*c* Id. T. vii. F. 1. F.

*d* Id. T. v. F. 1. C. F. 1v. BC. F. v. A. B.

*e* Id. Ib. Fig. v. B. C.

cum apice cavo Stapedis ; connexio *f* basios ellipticae Stapedis cum membranâ *g* foraminis ovalis , demonstrant , quod tremores sonori membranae impressi ope horum officulorum quatuor , *b* suis periosteis vasculosis cinctorum , *i* suis articulationibus connexorum , liberè in magno cavo *k* conchae suspensorum , humore exsudante assiduò lubricatorum , illaesi communicari queant usque ad membranam ovalis foraminis , illique tales imprimi.

556. Insigni iterum artificio hîc tendi possunt Stapes , & membrana foraminis ovalis , ope *a* musculi Stapedis ; qui corpore carneo oritur ex *b* canali osseo insculpto ossi petroso in fundo tympani , dein tenui tendine descendens capiti Stapedis nectitur , trahendo obliquè deprimit unam , elevat oppositam , partem illius membranulae.

557. Itaque soni illaesi , nec mutati , pertingunt ad membranam hanc ; illa verò ipso hoc apparatu ( 554. 555. 556 ) infinitis gradibus tendi potest ; hinc ergò infinitis diversis tremoribus recipiundis aptari ita , ut in  
similes

*f* Id. Ib. F. VI. D. F. VII. D.

*g* Id. T. VIII. F. I. c. F. II. A.

*b* Ruysch. Ep. T. 9. F. 1. 2. 3.

*i* Valsalv. T. III. F. III. & XI.

*k* Du Verney. T. VI. F. I. CEHA.

*a* Id. T. V. F. VIII. B.

*b* Id. T. VIII. F. I. E.

similes vibrationes contremiscat ; eosque tales communicare cavo Labyrinthi, cui claudendo præest membrana ovalis fenestræ.

558. *a* Concha interna ampla ; Elliptico corpori similis ; in *b* cava cellulosa mastoidei processus communicans ; per *c* tubam Eustachianam, partim *d* ossæam, partim *e* cartilagineam, *f* osculo aperto patentem versus palatum, claudendam *g* margine semilunari cartilaginosa, communicans cum ære externo, qui naribus, aut ore, hauritur, facit ut 1. aër hâc viâ in hæc loca ire, manere, rarefcere, exire, renovari, comprimi, queat ; adcôque 2. ut sic reduci possit ad temperiem cum ære externo ; 3. ut & radii sonori naribus, aut ore, admissi, hûc intrare, & læso meatu auditorio auditum expedire, possint ; 4°. Quia autem omnia illa loca *b* membranâ vasculari investita, huic mollis laxatio, & lubricatio, ut & expurgatio harum partium contentarum conservatur.

O 4 . 559. Dum

*a* Du Verney. Tab. vi. F. i. & 5. Tab. vii. F. i. & ii.

*b* Id. T. vii. F. ii. G. H. H.

*c* Id. Ib. F. ii. F. F.

*d* T. viii. F. i. K.

*e* Id. Ib. F. ii. D.

*f* Id. T. ix. C.

*g* Id. Ibid. i.

*b* Ruysch. Th. 2. pag. 23. Du Verney T. ix. F. i. AB.

559. Dum verò <sup>a</sup> Foramen rotundum; membranâ tenui tensâ clausum; in <sup>b</sup> unam partem scälæ cochleae patens; in foco quasi Elliptici hujus spatii opposito centro membranae tympani locatum; evincitur & illos radios sonoros in hanc membranam, Scälæ cavum, & contentâ ejus agere, communicando tremores æreos quidem, sed tamen forte non adeò accuratos distinctosque, ac sunt illi, qui ope membranae tympani, & ossiculorum, imprimuntur membranæ ovalis foraminis.

560. An meatus Eustachianus actione musculi interni aperitur eodem tempore, quo adductâ hoc opere membranâ tympani, arctatur cavitas conchae interioris? an os ejus circâ palatum clauditur adductâ valvulâ cartilagineâ per contractionem musculi cephalopharyngei, impediens in deglutitione ingressura huc deglutienda?

561. Quum porrò <sup>a</sup> foramen ovale pateat in <sup>b</sup> vestibulum cavum, repletum partim <sup>c</sup> Medullofâ portione nervorum, qui ex <sup>d</sup> nervo auditorio <sup>e</sup> foramen internae superficiei

<sup>a</sup> Du Verney. T. vi. F. i. E. T. viii. F. i. d. Fig. ii. sub A

<sup>b</sup> Id. T. x. F. i. C. F. iii. B.

<sup>c</sup> Du Verney T. x. F. i. B.

<sup>d</sup> Id. Ib. AC. F. ix. A.

<sup>e</sup> Id. T. xi. F. i. O. F. iii. BB.

<sup>f</sup> Id. Ib. F. ii. DACfe.

fici ei ossis petrosi ingressi, per *e* foramina exigua delati, in vestibulum porrecti, ibi per *f* tres canales ossæos semicirculares *g* distributi, ordinati, firmati, & ut videtur iterum medulloso egressi spectantur; partim  
 2. *b* medulloso portione nervi acoustici mollis ex præscripto foramine *i* apicem cochleae intrante per multa exigua foramina, indeque exigua filamenta distribuyente per *k* superiorem spiralem cuniculum, deinde hinc mollem pulpam distribuyente in vestibulum sub membranâ ovali; patet, dico, ex his radios sonoros, tremente hâc membranâ, deferri ope horum concussorum nervorum usque ad sensorium commune, ibique ideam soni excitare.

562. Suprà omnem verò admirabilitatem constructa apparet *a* cochleae Spiralis fabrica: dum scilicet *b* canalis ossæus; conicus; circâ *c* conum ossæum à basi ejus sursum à basi suâ binis gyris Spiralibus perfectis, cum uno dimidiato, apice suo ad apicem coni

O 5 ter.

*e* Id. Ib. cf. F. ix. 6. 7. F. x. a. b.

*f* Id. Ib. F. i. i. 2. 3. F. ix. BDC.

*g* Id. Ib. F. x. a. b.

*b* Id. T. xi. F. iii. D.

*i* Id. Ib. F. i. D. F. v. 6. 3.

*k* Id. Ib. F. iii. i. 2. 3.

*a* Id. Ib. F. i. D.

*b* Id. Ib. F. ii.

*c* Id. Ib. F. v.

terminatur; ubique interim à basi ad apicem usque per *d* septum medium triangulare accuratè in duas aequales partes separatas divisus; quod septum *e* parte cono sustentanti propinquâ ossium, politum, tremulum, elasticum, *f* parte exteriori respectu conifirmantis, membranaceum, nervosum, partim praecedenti parti ossiae, partim canali ossico affixum est: ita ut hi duo cuniculi nihil communicent, imò *g* & superioris os in vestibulum pateat, *b* inferioris verò foraminis rotundi membranâ occludatur; dum interim tenerrimi hîc loci nervuli acoustici ubique applicati cernuntur,

563. Hoc enim artificio efficitur, ut in lamellâ hâc ex determinatâ basi in punctum desinente infinitae chordae tremulae, aequaliter tensae, assignari queant; adeoque inter eas, numero vix numerabiles, semper erunt, quae in concentu harmonico trement cum unoquoque sono, proindeque repraesentare eum possunt; & ut talem offerre sensorio communi valebunt; quâ igitur ratione diversorum sonorum acutissima illa distinctio perficitur, ope membranae ovalis; dum operâ membranae rotundae simplex  
quasi

*d* Id. Ib. F. IV.

*e* Ib. 1. 2. 3.

*f* Ib. 4. 5. 6.

*g* Ib. Fig. 3. B.

*b* Ib. C.

quasi tantum fremitus, aut bombi, perceptio communicata attentionem excitat, eoque modo simul tendit organa ossæa, ut aptata fiant illi, qui auditur, distinguendo.

564. An autem extrema filamenta horum nervulorum officio functa, hancque distributionem per labyrinthos hos passâ, iterum redeunt in cerebrum atque ad Sensorium commune? sic putat Simoncelli, & <sup>a</sup> figurâ delineat Mistichelli in litteris. Infinita certè inquirenda restant.

565. Cur auditus acuitur manu cavâ auriculæ applicatâ versus sonorum.

Quare contrâ abscissis auriculis gravis auditus?

Quamobrem intenditur auditus, si planum auris sonoro obvertitur ad obliquitatem 45 graduum.

Ore diducto, & pendulâ maxillâ inferiori, quomodô fit clarior auditus?

Flanti, oscitanti, acutè loquenti, canentive, cur est bombus in aure, & hebetior auditus?

Cur surdi stridulum corpus dentibus continentes ejus stridorem percipiunt?

Cur sæpe bene audiunt voces ori immisfas?

Cur Surditas, si hiatus tubæ Eustachianæ quomodôcunque obstruitur?

Cur

Cur eadem à membranâ tympani rup-  
tâ.

Quâ viâ fumos ore haustos nonnulli au-  
ribus emittunt?

Undenam fit, ut binis auribus, unus,  
nec confusus, Sonus?

Videantur imprimis de his Bartholomaeus  
Eustachius, Julius Casserius, Fabricius ab  
Aquapendente, Schelhamerus, Josephus Du  
Verney, Valsalva.

## D E S E N S I B U S I N - T E R N I S.

566. **E**X omnibus his expositis (481. ad  
566.) Scimus, quod corpus no-  
strum excipiat ab objectis sensibilibus aliud  
nihil, ut fiat sensus, quam mutationem in  
superficie nervi per attactum moti objecti  
excitatam.

567. Quae producitur figurâ, mole, du-  
ritie, motu, variatis, corporis sensibilis: ita  
ut credibile sit, corpora sensibilia diversissima  
jam, si fierent eadem in his quatuor, eun-  
dem sensum in eodem organo excitatura  
esse.

568. Nec tamen hoc sufficit; sed requi-  
ritur, ut ea mutatio libero nervo propage-  
tur usque ad aliquem in cerebri medullâ  
locum,



locum, à singulo quoque nervo in singularem Medullae cerebrosae plagam. Id ligaturae, vulnera, corruptiones, nervorum, & cerebri, docent.

569. Sed ibi recepta haec mutatio tam parva, tamque simplex, ut nihil fere simplicius, & certè prae ipsâ simplicitate vix queat indagari, vel explicari.

570. Interim pro varietate objecti; pro diversitate nervi affecti; pro discrimine fabricati organi Sensus; pro variatione loci in medullâ cerebri, unde ille nervus; pro vario gradu motus, quo applicatur objecti actio; oritur in intellectu sentiente idea percepta varia, & nihil repraesentans quod est in actione objecti, vel in passione organi; sed tamen eandem actionem ejusdem objecti in idem organum sequitur semper eadem idea; unde connexio harum idearum sequitur indolem eandem organi Sentientis dicti, haud aliter ac si Idea percepta esset effectus actionis objecti in organon.

571. Non ergo videtur diversitas haec idearum pendere tantum à varietate illâ, quâ ultima pars nervi construitur; sed à multis aliis praeterea non quidem causis, sed, ex Instituto Conditoris Adorandi, conditionibus.

572. Ideae plerumque, dum intellectu percipiuntur, simul excitant ipsâ hâc repraesentata-

sensatione laetitiam, aut tristitiam, aut neutram; hae adiaphorae, Amorem, vel Odium, faciunt istae versus id objectum, cujus actione excitatur illa idea.

573. Verum sic instructi sumus, ut ipsa haec mentis conditio amoris, aut odii, faciat in corpore tales motus musculares, quorum ope objectum laetitiae uniri corpori, vel cogitationi, possit; vel quorum efficacia id ita removeri queat, ut tristitia ejus praesentiam concomitans deleatur.

574. Quum verò motus illi musculares ope Spirituum, à cerebro pulforum in musculos, exercentur, patet hinc, quod ab omni puncto hujus usque ad musculos voluntati obnoxios, sit liber motus spirituum à cerebro oriundorum. Unde Sensorium commune est pars cerebri, ubi omnia illa puncta aggregata habentur, adeoque, ut apparet, medulla cerebri in capite.

575. Quò distinctior actio objecti in sensorium commune, eò nitidior, & distinctior, idea inde orta.

576. Quò vividior actio objecti in sensorium commune, eò clarior idea excitata.

577. Quò saepius renovatur actio objecti in sensorium commune, eò clarior idea.

578. Quò magis aliena ab omnibus aliis actio objecti in sensorium commune, & quò magis insolita, eò vividior idea.

579. Si

579. Si ergo sensorio communi impressa conditio tam fortiter inhaeret, ut actione superveniente aliorum objectorum mutari nequeat, manebit praesens idea ejus conditionis comes.

580. Aut saltem occasione similis causae, aut ideae affinis, redditur idea eadem volenti, aut & invito; quam si comitatur conscientia similis olim perceptae, vocatur Memoria.

581. Verum omne hoc pendet tantum à simplici illâ conditione sensorii communis, quae est ibi mera tantum mechanica dispositio.

582. Quare oriri poterit aequè à causis corporeis in corpore, undecunque demum, latentibus, nervos, spiritus, cerebrum, eodem modo afficientibus, hinc ideas easdem excitantibus, quam à causis corporeis externis. Vocaturque haec dispositio Imaginatio prima.

583. Si tum memoria similis ideae, occasione objecti externi agentis olim excitatae, fortis adest, simulque praesens idea jam ab internâ *dispositione* pendens vivida sit, oritur fortissima persuasio, causam hujus jam praesentem esse extrâ corpus, quae dicitur Imaginatio altera.

584. Si voluntas in sensorio communi, & in partibus illi efficaciter cohaerentibus, reti-

retinet eum statum , qui oritur ex actione distincti & vividi objecti ; aut si actiones omnium aliorum objectorum accuratè cohibet , & priorem solam retinet , haec ejus actio vocatur *Attentio* : cujus effectu idea distincta , clara , vivida , diu praesens , habetur : quae proinde mater est *Scientiae* , utpote optima , ad hanc parandam , via.

585. Ex quibus cognoscuntur *Sensus* externi quinque vulgò numerati ( 181. ad 572 ) ; tum & interni , qui dicuntur , *Memoria* , *Imaginatio* , *Affectus animi* , *Attentio* ; quibus *Fames* , & *Sitis* , à quibusdam annumerari solent.

586. Inde etiam intelligitur ratio plurimorum circà hoc negotium quaesitorum.

1. Cur corporea signa , nihil praeter arbitrium instituentis habentia , ita afficiunt , dirigunt , mutant , ideas ?

2. Cur impossibile est imaginationem alteram emendare ullo ratiocinio ? sed quidem violento motu ?

3. Cur , coeteris paribus , sensus externi , internique , vigent , cessante motu voluntario , muscolari ?

4. Attentus , Reminiscens , Imaginans , quare sopit sensus externos , & supprimit motus corporis ? & undenam his , dum optimè priores actiones exercent , *αἰσθησιμότης*

5. Quam ob causam oritur tanta debilitas

tas in corpore , ubi sensus interni validè , & diu , exercentur?

6. Quâ autem ratione variata sæpe objecta adeo exhilarant?

7. Quare cibi , potus , medicamenta , venena , quies , motus , aer , calor , frigus , consuetudo , animi affectus , tantam vim exercent in omnibus his?

8. Quænam est in corpore conditio , unde iudicium affirmans , negans ; ratiocinium ; & methodus ordinatè cogitandi pendet ? Cur distinctio ad hæc tantum valet ? Sed imaginatio secunda tantum officit ?

## DE VIGILIA.

587. **V**igilans vocatur ille , in quo organa sensuum exteriorum , interiorum ; tum instrumenta motuum voluntariorum , sic se habent , ut motus consuetos exercent facile , ab objectis facile affici queant.

588. Quod totum pendet à præsentia spirituum bonorum , copiosorum , in cerebro , medullâ ejus , nervis , & musculis ; tum simul à bonâ conditione partium solidarum cerebrum , nervos , musculos , constituentium.

589. Vigilia ergo dicitur status ille corporis , in quo hæc duo ita obtinent.

## DE SOMNO.

590. **L**ongè autem obscurior habita semper fuit cognitio Somni, licet tantum sit status oppositus Vigiliae, unde opus erit, ad cognoscendam ejus naturam, accuratè perpendere omnia ejus phaenomena, quae inprimis haec sunt:

1. A vigiliâ in somnum labenti incipiunt obtundi per gradus, & difficilius exerceri omnes sensus externi, internique, accedente sensu ponderis in corpore, & tandem omninô desinere.

2. Incipiunt retardari per gradus, deinde minui cum sensu magnae resistentiae, tandem desinere, omnes motus voluntarii.

3. Musculi autem iis exercendis destinati, labascere, collabi, flaccescere, paralytici fieri, primô in palpebris, facie, collo, brachiis, & sic, sensim descendendo, omnes.

4. Cessant omnes illi effectus corporei, & affectiones mentis, quae sequuntur ex tribus hisce, ut ex causâ.

5. Interim tamen motus arteriarum, venarumque, & cordis, fit fortior, lentior, acquabilior, plenior, idque per gradus diversos augendo, prout augetur somnus.

6. Respiratio profundior, robustior, lentior, acquabilior, sensim fit, eaque cò magis

gis increscunt , quo plus augetur somnus.

7. Itaque omnia , quae ex his duobus fiunt , perfectius exercentur ; proinde perfectio sanguini inducitur illa , quae requiritur ad optimam circulationem , coctionem , secretionem , perspirationem , distributionem , nutritionem ; fietque imprimis motus humorum celerior per vasa sanguifera , cordique propiora , lentior per lateralia , à corde remota , & per musculos voluntarios aliter excitanda.

8. Evigilat dormiens sensu externo validdè excitato per objectum ; aut sensu incommodi percepti à stimulo excrementi ; vel molestiâ ex compressâ nimis parte , cui incumbit ; aut sponte ; coeterum , quô plus dormitur , eô major somnolentia ; ut , reliquis paribus , tandem vita fere fiat somnus.

9. Evigilans primò convellitur , palpebras aperit , expandit membra , oscitat , dormit , sensim sensibus , motuique , aptus evadit , dein reffectus viribus iterum valet.

591. Somnus autem exoritur in nobis , fovetur , & augetur :

1. Cibi solidioris , tenaciorisque , ingestione nimia , & remorâ in ventriculo.

2. A potu copioso liquoris vegetabilis fermentati , eô magis somniferi , quô magis abundat spiritibus.

3. Ab Aromatibus penetrantibus , flagran-

tiffimis, spirituosissimis; croco, hormino, salviâ, & similibus, à quibus tamen laedens acrimonia abest.

4. A lacte Papaveris, visco Cynoglossae, succo lactucae Sylvestris, pomo Mandragorae, virtute Solani.

5. A lassitudine ex labore valido, diu sustentato.

6. A quiete pacatissimae mentis, & otio tranquillissimo quiescentis planè corporis, atque silentio absoluto objectorum omnium sensibilibum.

7. Ab excessu aestus, aut frigoris, nimium aucti; sive oriantur à causâ quâdam communi, sive ex temperie, aetateve, fluxerint.

8. Ab omni tali causâ, quae impedit appulsus cruoris vitalis in corticem cerebri; ejus transitum per vasa illius; secretionem spirituum inde necessariam; horum derivationem in nervos, organa sensuum, & musculos voluntarios; refluxum horum spirituum ab omnibus his locis versus sensorium commune; hinc evacuationes nimiae, pituitosa humorum indoles, obesitas humores intrâ urgens, plethora comprimens, vulnera cerebri, phlegmone ejus, apostemata ibi nata, extravasatio humorum sub cranio, contusio cerebri, ejus compressio, ablatio, putrefactio, & similia plurima; si interim cere-



cerebellum ab his vitiis immune manet, & suo munere fungitur.

592. Impeditur somnus:

1. Perpetuâ, lentâ, admistione potus aquosi, calidi, ad sanguinem.

2. Nervorum cerebroforum vellicatione acri qualibet.

3. Forti affectu animi.

4. Cerebro irritato, à causâ quâcunque externâ, vel internâ.

593. Erit itaque somnus ille status medullae cerebri, in quo nervi non accipiunt à cerebro tam copiosum; nec tam fortem, influxum spirituum; ac requiritur eô, ut organa sensuum, motuumque voluntariorum, facile & expeditè, suas actiones exercere possint.

594. Hujus autem causa proxima forte est penuria subtilissimi spiritus multo, longoque, molimine tantum elaborandi, jamque consumti; unde inanita tenuissima vasa pro tempore vix inflata collabuntur; aut tanta pressio crassioris sanguinis ad corticem cerebri, ut hinc medulla cerebri, undique involuta cortici, compressa transitu spirituum careat.

595. Et causa somni naturalis erit id omne, quod haec duo producere potest.

596. Unde & effectus ejus intelliguntur: nam in somno cessant nonnullae actiones

(590. 1. 2. 3. 4.); quiescunt harum organa, & muscoli (590. 3.); spiritus per haec vix fluunt (593.); ergo hi minus consumuntur; solidi autem villi, & fibrae, in nervis, & musculis, vix mutantur; non destruuntur; aequilibrium in omnibus obtinet; nec varietas pressionis in vasis, nec diversitas illa velocitatis in humoribus, obtinet.

597. Sed in somno augetur motus cordis, pulmonum, arteriarum, viscerum (590. 5. 6. 7.); neque hic tum mutatur, nec destruitur, actione sensuum, motuumve voluntariorum, tunc cessantium (590. 1. 2. 3. 4.); ideoque orientur effectus hi, qui ex his immediatè pendent, & censeri possunt: 1. humorum vitalium circuitus validior, aequabilior, per canales tum liberiores, laxiores, ingressui patentiores, varietate musculorum non impeditos; hinc impulsus in vasa lateralìa minor quidem, at aequabilior, per vasa majora validior, & aequabilior; itaque fistulae laterales sensim replentur, minus trajectiuntur, tandem fere quiescunt cum collectis suis liquidis; folliculi laterales adiposi lentiori oleo implentur; distenduntur, ut & folliculi glandularum; hinc circuitus tandem fere per sola vasa sanguifera, sensim lentior, tandem vix notabilis, si nimis diu protrahitur; dum interim accumulata pinguedo ut balsamus circumfusus con-

lenta interiora defendit, & tardè urgenti recessitati pauculum pabuli praebet. 2. inde in somno moderato materies Chyli in serum, hoc in tenuiores humores, illi in nutrimentum, quàm optimè commutantur. 3. partium in solidis parum cohaerentium detritus sensim lenior. 4. secretio ad cutim aucta, reliquis imminutis. 5. optima refectio periti: nam repletio aequabilis, continua, bona, restituit humores; & solida optimè reparantur, quia causae impediētes, turbantes, destruētes, quiescunt; dum interim felicissimè paratur materies, in vasis est aptitudo ad recipiendum, in humoribus ad ingrediendum, interimque causae applicantes, & consolidantes, liberè agunt. 6. hinc itaque productio nova, & accumulatio, spirituum animalium in omnibus humoribus quoad materiem, in vasis minimis quoad repletionem.

598. Quibus ita refectis per somnum, aderit iterum in corpore aptitudo ad vigiliam, & ineptitudo in somnum; unde, accedente causa excitante, homo rursus evigilat.

599. Cur capite calido, pedibus frigidis, vigiliae, non somnus?

Cur ebrietas à spirituosiss, & postea somnus?

Unde insomnia? unde motus in somniantibus?

Somno posito laudabili intrâ limites octo horarum, cur tum perspiratio duplô major, quam eodem tempore vigilantibus fuisset?

Quî fit, ut protractô nimis diu somno, caput grave, sensus hebes, memoria debilis, frigus, pituita, obesitas, pondus, suffocatio virium, ineptitudo musculorum ad motum, imperspirabilitas?

Undenam protractus assiduô somnus diu sustinet vitam sine cibo, potuve?

Quamobrem fit, ut à somno bono, semper expansio musculorum omnium, oscitatio repetita, acies judicio, agilitas musculis, vires nervis, redeant?

Quo effectû foetus semper, pueri frequenter, juvenes plus quam viri, senesve, dormiunt?

Et cui bono resurgentes à morbis validissimis dormiunt longè magis, quam ubi perfectè valent?

600. Ratio autem, quâ tempore somni cordis muscoli non patiantur similia (590.3.), sed contrâ agant validius alternè, videtur intelligi, si attendimus 1. ad differentiam cerebri mollis, cavitatibus instructi, sinibus venosis circuitum variare potentibus pressi & cincti, expansilis, & compressilis, circulis arteriosis majoribus externisque coronati; & ad differentiam cerebelli solidioris, compacti, omni cavo destituti, nullo  
finu

finu venoso cincti vel pressi, non expansi-  
lis, nec compressilis, arterioliis venisque  
ut alibi tantum praediti. 2. nervos cardiacos  
primam originem cerebello tantum debere.  
3. arterias coronarias opposito tempore im-  
pleri & depleri, quam reliquae in toto cor-  
pore, idemque de venis verum esse. 4. cava  
cordis impleri, dum coronariae. 5. auricu-  
las, & cava cordis, alternis vicibus imple-  
ri, depleri, agere, quiescere: nam ex omni-  
bus his liquet, causas contrahendo cordi assi-  
duo renasci, agere, perire, quiescere. an  
autem spiritus cerebelli vitales, spiritibus  
cerebri animalibus, crassiores sunt?

## D E R E S P I R A T I O N E.

601. **Q**Uaenam sit Respiratio, cur peren-  
net absque adjumento mentis,  
patebit ex sequentibus: namque id indagari  
jam requirit ordo: quamvis enim alia actio  
frequentius visa non sit, tamen difficulter  
intelligitur, inprimis quia partim vitalis,  
partim voluntaria, tum etiam quia tam mul-  
tiplicia organa ei exercendae serviunt: quare  
sollicitè excutienda erit; quod commodissi-  
mè fiet considerando phaenomena, & or-  
gana.

602. Pulmones suspensi in aëre undique  
ad eos allabente, & aequaliter ubique pre-

mente, collabuntur semper, contrahunt se in spatium minus, fiunt multo minores, quam erant, dum in thorace integro haerebant; id docet Anatome: absolvitur haec vis inprimis actione contractili fibrarum muscularium, squamosa segmenta Bronchiorum connectentium.

603. Pulmones, sic contracti (602.), si vi inflato per glottidem aëre implentur; distenduntur eò usque, ut aequent magnitudine eam, quam habebant in thorace integro, imò & multo discrimine eam superent. docet experientia.

604. Quod idem (603.) fit, si aëri per glottidem aditu in pulmones relicto, interim ille aufertur, aut in pressione minuitur, qui pulmones externè attingit. Demonstrat machina Boyleana.

605. Unde patet pulmones propria vi semper niti, ut minores sint in omnibus suis partibus, quam quidem sunt dum in thorace clauso locantur: hinc semper esse in statu distractionis violentae, dum homo vivit; ideòque collabi & minui, dum totum animal in vacuo Boyleano haeret.

606. Enimverò non est aër ambienti similis inter membranam anteriorem pulmonum & pleuram in omni suo ambitu in homine sano; nihil ergò, quod comprimit externè pulmonem, nisi diaphragma; interim aër  
liberè

liberè semper per glottidem ingressus internè semper adest; unde pulmo semper paulò plus extenditur per aërem internum, quam comprimitur per aërem externum impeditum diaphragmate sic costis, vertebrisque, nexo, ut non adeò ingredi possit thoracem, ac requireretur ad æquilibrium.

607. Hanc autem, magni in his momenti, veritatem (606.) evidentissimè demonstrat Anatome; productio, & incrementum foetus in utero, & hominis extrâ uterum; pulmones inflati; vulnera in cavum thoracis penetrantia, pulmonis collapsum efficientia, ejus dilatationem impediencia, nunc uni, nunc utrique, lateri thoracis inflicta; maximè verò celebre experimentum Hookeii in canibus vivis institutum.

608. Quum ergò in inspiratione aër majori, quam ante, copiâ ingrediatur per glottidem in pulmones, hos extendet magis (603.), superabit vim eorum naturalem (605.); ergò pulmo in hac actione patitur; quid autem agat, docent phaenomena.

609. In inspiratione vitali, inprimis in homine dormiente spectatâ, 1. costae inprimis novem superiores, manentes in articulatione ad vertebrae, & in unione cum cartilaginibus sterni accretis, parte arcuatâ assurgunt versus clavículas ita, ut motus hîc maximè observetur in medio arcus, inferiores

res autem tres, vel forte quatuor, eodem tempore deorsum retrorsum obliquè parum extra vertuntur; ita tamen, ut simul costa septima, octava, nona, decima, suis segmentis cartilagineosis introrsum quasi trahantur. 2. simul tumet sensim magis, magisque, usque ad finem inspirationis, totum abdomen, premiturque valde extrorsum. 3. quin eodem momento capacitas thoracis augetur, ut docet mensurantis funis circumductio, oculus ipse, & inprimis contemplatio mechanica figuræ, situs, nexus, articulationis, costarum, maximâ profectò arte hîc positarum. De quâ re videantur Boreliana demonstrata.

610. Sed & in ipsâ illâ actione diaphragma ex situ convexo, & sinuoso, quem habebat prius, deducitur in figuram magis planam versus inferiora; hoc enim vivorum brutorum incisio, vulnera magna abdominalia in hominibus inflicta, docuerunt; eam autem mutationem figuræ pendere à contractione musculosæ fabricæ in septo hoc, docet contemplatio ejus Anatomica.

611. Quum igitur in inspiratione non fiant alia, causa ejus per hæc determinabitur, motum nempe descriptum costarum & diaphragmatis, quare inquirendum in eas causas, quæ hos motus faciunt.



612. *a* Costae superiores decem osseae *b* arcuatae, incurvae; & in *e* medio longè plus depressae, quam in assurgentibus *d* extremis; *e* apophysibus binis cartilagine munitis articulantur. 1. in *f* fossâ cartilagineâ vertebrarum unitis corporibus lateraliter retrorsum insculptâ, aut in primae vertebrae corpore solo; 2. in *g* sinu cartilagineo insculpto processui transverso vertebrarum; junguntur *b* segmento arcuato cartilagineo, elastico valde, ad *i* angulum valde obtusum fursum; id segmentum dein adscendens sterni ingreditur *k* lateralia cava ita, ut quo superior costa, eo *l* angulus hujus insertionis ex concursu superioris partis sterni minor sit. Costae duae inferiores, aliquandô tres inferiores unâ tantum posticâ apophysi praedictae articulantur modô uni sinui in ipso corpore unius suae vertebrae, suisque cartilaginibus fere tantum tendinescentibus non attingunt sternum, sed diaphragmati, & cartila-

*a* Vesal. 1. Cap. XIX. F. 1. ab 1 ad 10.

*b* Id. Ibid. F. 3. ac. A.

*c* Id. Ib. F. 1. 2. 3. 4.

*d* Id. Ib. F. 3. aA.

*e* Id. Ib. F. 4. L. M.

*f* Id. Ib. F. 3. d.

*g* Id. Ib. F. 3. b.

*b* Id. Ib. F. 3. BE.

*i* Id. Ib. CAE.

*k* Id. Ib. F. 7. puxyza.

*l* Id. Ib. F. 1. totâ antèrius.

tilaginibus proximarum costarum, insertae evanescent.

613. Musculi intercostales <sup>a</sup> externi orti ex inferiori margine costae superioris obliquè descendunt antrosum, & inseruntur margini superiori costae infrâ sequentis, toto ambitu ossæ; <sup>b</sup> interni autem ex margine inferiori costae superioris orti obliquè descendentes retrorsum, priores secant, inseruntur margini superiori costae infrâ sequentis, toto ambitu ossæ.

614. Sed & <sup>a</sup> musculus Subclavius à parte inferiori dimidiâ claviculae, ubi spinae scapulae jungitur, carneus oritur, obliquè antrosum pergens margini superiori costae primae propè sternum insertus.

615. Si ergo musculi hi (613. 614.) simul contrahuntur; tum figitur prima costa, propriâ jam articulatione satis firma, vi Subclavii, elevantur costae novem sequentes sursum, vertunturque extrorsum, imprimis in mediis arcubus, ita tamen ut in parallelismo aequabili maneant, deprimunt segmenta cartilaginea, quae valde renituntur; ita amplitudo thoracis augetur satis notabiliter.

616. Diaphragma jam descriptum (86. &) contractum, planum fit; thoracem valde dila-

<sup>a</sup> Vesal. II. T. 8. DD.

<sup>b</sup> Id Ib. EE.

<sup>a</sup> Spigel. I. IV. T. XVII. dFc.

dilatât ; abdomen arctât ; cartilagine costarum spuriarum anteriores introrsum ducit , versus vertebrae ; costas spurias inferiores duas deorsum utcunque trahit ; musculos abdominales (86.  $\beta$ .) distendit , superat.

617. Atque hi quidem soli videntur vitalem inspirationem exercere muscoli ; intercostalibus accipientibus *a* nervos à dorsalibus , diaphragmate verò ex *b* vertebralibus.

618. Igitur auctâ thoracis capacitate , inter pleuram & superficiem pulmonum nihil premit pulmones , aër ergò eos inflat ingressus per glottidem , donec iterum sint , vel potius maneat , accurate contigui pleurae (604.) , hâcque ratione efficit omnia , quae dicta sunt (197. 200. 2.)

619. Hisce (618.) sic manentibus , aër in pulmones agit aequâ vi , ac thorax resistit , itaque pulmo quiescet , hinc sanguis minus transibit , minori copiâ agetur in cor sinistrum , hinc minus in cerebellum ejusque nervos ; tum cruor arteriosus minus aget in musculos intercostales , & in diaphragma ; ergò causae dilatantes thoracem debilitantur ; hinc elater segmentorum cartilagineorum costas iterum deprimit , adjuvantibus *a* fibris muscularibus à latere sterni intrâ thoracem oriun-

*a* Vieuss. de Cer. T. xxvii. Cc.

*b* Willis de Cer. T. ix. xym.

*a* Bidloo T. 26. F. 1. BB.

oriundis & fini offeo, atque cartilagini costarum verarum insertis; tum simul restituant se distractae peritonaei & abdominalium musculorum fibrae, hinc pressa viscera laxum jam diaphragma sursum trudent in thoracem; arctatur thorax; aer expellitur ex pulmone; fit expiratio; fiunt omnia, quae dicta sunt (618.); inprimis autem binis his actionibus (618. 619.) acceleratur, atque exercetur, transitus cruoris per pulmonem.

620. Proinde ipso hoc momento (619.) iterum acceleratus cruor incipit ad cerebellum & ad musculos fortius, & copiosius, fluere, ergo renascuntur causae contrahentes intercostales & diaphragma; redintegratur inspiratio: sicque assignata vera, praesens, sufficiens, ratio alterni hujus vitalis motus.

621. Verum praeter has causas vitalis respirationis accedunt aliae voluntati servientes, costis itidem applicatae, pro dilatatione violentâ pectoris, ejusque arctatione fortis. Priores, licet aliis functionibus interserviant, tamen & huic operantur, dum etiam sic determinantur ad hanc functionem. Primô namque <sup>a</sup> Scalenus primus carneus ortus à parte anteriori processus transversî vertebrae secundae, tertiae, & quartae, colli, antrorsum obliquè descendens, tendine suo  
inferi-

inferitur primae costae. Deinde <sup>b</sup> Scalenus alter carneus ortus à parte laterali processus transversi vertebrae secundae, tertiae, quartae, colli, descendens, tendinescens, supergressus primam, secundae, aut & tertiae, costae inferitur. Postea <sup>c</sup> Scalenus tertius, qui carneus ortus à parte laterali anticâ processus transversi vertebrae colli secundae, tertiae, quartae, quintae, & sextae, inferitur plerunque costae primae. His enim elevari, sustineri, firmari, possunt tres costae superiores, ne vis intercostalium, aliorumque, musculorum in forti inspiratione determinetur deorsum: nec obstat eorum vî collum flecti, aut circumverti; quia si agunt simul, & si cervix <sup>d</sup> musculis suis erigentibus <sup>d</sup> Spinali colli, <sup>e</sup> Transversali colli, <sup>f</sup> Inter spinalibus colli, <sup>g</sup> Longissimo dorsi, <sup>h</sup> Scissipinato, simul agentibus, cervicem figentibus, firmatur, necessariò actio Scaleni costas elevat: verum in violentissimâ respiratione talia plurima concurrere certè est quàm certissimum: quartò <sup>i</sup> Serratus anticus minor

Q

car-

<sup>b</sup> Id. Ib. T. xiv. M.

<sup>c</sup> Id. Ib. N.

<sup>d</sup> Cowp. app. ad Bidloo. F. 36. II.

<sup>e</sup> Id. Ib. K.

<sup>f</sup> Id. Ib. LL.

<sup>g</sup> Vesal. II. T. xii. N. T. xiii. F.

<sup>h</sup> Id. Ib. T. xiii. K.

<sup>i</sup> Id. Ib. T. v. F. Tab. iv. K.

carneus à processu Coracoide scapulae ortus, antrorsum obliquè descendens, largior factus, gracilescens, carneus, inseritur parti ossis anteriori costae secundae, tertiae, quartae, quintae. Quinto <sup>k</sup> Serratus anticus major carneus ortus à basi scapulae, largus, crassus, antrorsum obliquè descendens <sup>l</sup> costis octo superioribus dentatis quasi carneis partibus inseritur, quarum duae, aut tres, inferiores interferuntur <sup>m</sup> similibus processibus Obliqui exterioris abdominalis. Etenim si muscoli scapulae, <sup>n</sup> Trapezii, <sup>o</sup> Rhomboides, <sup>p</sup> Levator, scapulam sursum & retrorsum immobilem figunt, tum actio Serrati utriusque fortiter elevat costas à secunda ad octavam; quod in fortissimâ inspiratione fieri clarè videmus. Sexto <sup>q</sup> à parte posticâ <sup>r</sup> Serratus posticus superior tendineus ortus à spinis binarum vertebrarum inferiorum cervicis, & trium superiorum thoracis, carneis dentibus inseritur curvaturae secundae, tertiae, quartae, costarum, elevans has obliquè sursum. Septimo juvat <sup>r</sup> Serratus posticus

<sup>k</sup> Id. Ib. T. iv. l. T. v. m.

<sup>l</sup> Vesal. II. Tab. II. OOO.

<sup>m</sup> Id. Ib. ppp.

<sup>n</sup> Id. Ib. T. ix. EKGH.

<sup>o</sup> Id. Ib. T. x. GHK.

<sup>p</sup> Id. Ib. C.

<sup>q</sup> Id. Ib. Tab. XI. F.

<sup>r</sup> Id. Ib. Δ.

posticus inferior, qui à spinis vertebrarum lumbarium, & aliquandò à quibusdam thoracicarum, ortus, fibris digitatis inseritur arcui medio fere costae nonae, decimae, undecimae, & extremitati duodecimae, costae: hic enim decursu fere horizontali fibrarum ultimas has costas extrorsum ducens & retrorsum, ampliat thoracem, cavet ne à contractis fibris diaphragmatis adductae hae costae arctent thoracem.

622. Actio autem musculi Obliqui exterioris, inferioris, & Recti (86. b. c. f.), conspirantium, costas deprimens, thoracem arctans, Serrato antico inferiori resistens, ut ipse nexus docet, si concurrit cum actione Sacrolumbalis admodum compositi, & vix describendi distincte, musculi; constat serie fibrarum muscularium carnearum, ortarum à transversis processibus vertebrarum lumbarium, harumque spinis, atque adscendentium sursum in costas, junctarumque ibi musculis carneis accessoriis à costis procedentibus; haec inquam actio expirationem violentam adjuvat fortissimè, arctato simul abdomine ope musculi Transversi.

623. In foeminis sternum compressius, claviculae magis rectae, thorax angustior, segmenta cartilaginea citius ossescunt superio-

Q 2

ra,

<sup>a</sup> Vesal. II. T. XII. LA. MM. T. XI. Q.

<sup>b</sup> Steno spec. myol.

ra, quam inferiora; hinc iis inspirantibus sternum sursum, & obliquè extrorsum vertitur, totusque thorax quasi assurgit; hinc etiam tumente abdomine liberius respirant.

624. Constat musculos respirationi infervientes, & voluntati obnoxios, longè majores, fortioresque esse iis, qui respirationem vitalem faciunt. Unde fit, ut vis priorum valeat augere, minuire, integrè sistere, alterutram actionum respirationem efficientium.

625. Hinc intelligitur, quod non sint duo momenta physica in vitâ hominis sibi succedentia, in quibus vasa pulmonalia eandem figuram, capacitatem, actionem, possideant.

Item antagonismum quibusdam musculis esse hic loci, sine musculo antagonistâ.

Ergo etiam antagonismum inter actionem fluidi moventis musculos, & inter resistantiam simplicis elateris in solido.

Proinde non opus esse ad motus alternos, in partibus utrisque reciprocè acturis, alternas humorum supponere actiones; sufficere, si contingat in alterutrâ.

Vim, causamque, respirationis, voluntas humana valet sistere, vim cordis directè sistere non valet, ergo causa motus cordis validior, constantior, ejus actio frequentior; tamen est concentus quidam inter cordis pulsus, & respirationum numerum, sed quâ lege?

Sed



Sed & perspicitur inde necessitas iterandi ictus cordis, repetendae respirationis. Quamdiu verò persistere possunt, quoad efficaciam vitae, sine repetitione?

Cur in insultu asthmatico, peripneumoniâ, anhelatione, agone mortis, respiratio fit musculis vitalibus & voluntariis validè concurrentibus ad eandem actionem, ita ut moveatur collum, scapula, pectus, costae inferiores, dorsum, quàm evidentissimè?

Quare in sanitate perfectâ, corpore quiescente & vigilante, respiratio adeò lenta, quieta, tacita, ut vix advertatur, interim circuitu humorum expedito?

Cur tussi, suspirio, acceleratâ respiratione, augetur motus cruoris per omnia vasa?

Quamobrem actio prima respirationis est inspiratio, ultima verò expiratio?

Unde in moribundis, cessante dudum respiratione, Sinus venosi, auriculae, cor, palpitant?

Et quâ fit, ut respirationi exercendae, vitaeque continuandae, ineptus planè sit aër in summo gradu gravis, levis, humidus, ficcus, calidus, frigidus; tum & ille, qui nimis compressus, vel rarefactus, ut & is, qui in parvo spatio non renovatur satis cito?

# DE VOCE, LOQUELA, CAN- TU, RISU, TUSSI, &c.

626. **H**inc autem clarè concipitur, quomodo homo vocem edat: hæc enim sonus formatus expiratione est: ergo fit expulso aëris, totâ capacitâ pulmonis contenti, per causas arctantes thoracem (619. 622.), in asperam arteriam, inde in glottidem, ubi arctatâ viâ celerius motus, elastico tremulo corpori illisus, hinc in undas reciprocas percussus, sonum facit: docent Phisici.

627. Ille autem egrediens ex angustia glottidis in cava corporis membranosi oris & narium, transeundo per hæc loca, prout lacunaria hæc glabriora, asperiora, apertiora, impeditiora, aut variis modis figurata sunt, etiam variâ specie soni ore egreditur: demonstrant Phonurgi.

628. Quum verò latera cartilaginea nexu suo rimam formantia, aperire, vel arctare, valeant rimam hanc innumerabilibus modis, prout muscoli hic positi variè agunt (194.); hinc diversitas vocis quoad acutiem

<sup>a</sup> Caffer. de voc. org. T. XIII. F. VIII. CEEDC. F. IX. D.

<sup>a</sup> Id. Ib. T. I. F. VII. EE.

<sup>b</sup> Cowp. app. ad Bidloo. F. 3.

<sup>c</sup> Id. Ib. O.

vel gravitatem habetur; etenim pendet omne id negotium à celeri vel tardo percussu undulationis; hic verò celerior fit arctatâ viâ, vel auctâ celeritate expellente æerem; contrà gravitas vocis tardius undulantis æeris effectus, ab aperturâ rimae majore, aut à lento efflatu æeris, deducitur. Id evicerunt suis demonstratis Musici.

629. Hinc apparet nimis dilatatâ rimâ perire sonum his, qui tentant graviolem sonum efficere, quam quidem possint; item eundem in formatione acutissimi toni suffocationem fere pulmonibus, stridorem laryngi inferre.

630. Si sonus ille organis extrâ laryngem positus (nempe gutturi, linguae, dentibus, labiis, genis, naribus, palato membranaceo, vel musculofo, suo vario concursu, & positu, admodum variandis,) illisus inde in transitu, vel reflexu, mutatur, & determinatur, fit id quod literis exprimitur; de quarum ortu, combinatione, & hinc loquelâ, videndus unus « Johannes Conradus Amman, Vir in hisce stupendae industriae, & successus felicitate clarissimus.

631. Quum verò Cantare fit, sonos juxta gravitatem, acutiem, celeriter, vel tardè, fortiter, vel blandè, acquabiliter, vel flecten-

Q 4

« Sardus loquens Amstel. 1692. & dissertat. de loquelâ. Ibid. 1700.

do, pronunciare, ejus actio ex praedicti-  
intelligitur: cujus gratia pendet à voce, to-  
nis, tempore, flexu.

632. Superficies glabra, lubrica, inorga-  
nis, suavitatem voci conciliare videtur; ut  
& gutturis, oris, palati, nasi, conformatio.

633. Agilitas musculorum movendae glot-  
tidi servientium; laxitas obsequens ligamento-  
rum cartilagines laryngis neccitentium; ma-  
gnitudo differentiae, quam fabrica glottidis  
in aperturâ suâ admittit; videntur efficere  
facultatem aptam varios tonos distinctè, &  
purè, formandi.

634. Pulmonum, thoracisque, constru-  
ctio, explicabilitatem efficiens, videtur causâ  
praecipua robur, & longitudinem, animae  
concilians. Tum suavissimis cantoribus sin-  
gularis flexus ab his omnibus simul pen-  
det.

635. Risus fit, dilatato pulmone accep-  
tum aërem, citissimis, admodum parvis, &  
reciprocis concussibus per organa inspirato-  
ria & expiratoria factis, quasi undatim in  
pulmonibus & in asperâ arteriâ movendo,  
nec renovando; interim pulmone fere in eâ-  
dem extensione manente, sanguinemque  
magis conquassante, quam transmittente.  
Unde scitur, quare risus adeo fatiget? sae-  
pe in convulsionem transeat? venis jugula-  
ribus, adeoque & totius capitis, inprimis tan-  
tum

tum tumorem conciliet? inde ruborem vultui, collo, oculis, conciliet? aliquandô in impotentiam respirandi, apoplexiam, & mortem, inducat, si nimius? Cur contrâ adeo salubris sit, ubi moderatus exercetur?

636. Quin etiam Tussis inde patet: fit enim aëre copiosissimo pulmonibus hausto; retento parum; mox clausâ larynge, simulque diaphragmate truso in pectus vi abdominalium muscutorum, aër condensatur; latera pulmonum validè premit; dein, apertâ iterum larynge, violentè & per reciprocos concussus expiratorios, concutitur; hinc superficiem bronchiorum purgat. Unde scitur, cur risus fere in tussim definat? quam parva inter has duas actiones sit differentia? Cur validus cantus, vociferatio, omnia aspera, membrana cruda bronchialis, eam producant.

637. Sternutatio quoque jam exposita (498.) clarissimè ex dictis intelligitur.

638. Oscitatio fit expandendo omnes fere simul musculos voluntarios, extendendo maximoperè pulmones, inspirando quamplurimum aëris lentè & sensim, cum dein retentum aliquamdiu & rarefactum lentè rursum & sensim expirando, musculisque statum naturalem restituendo. Hinc effectus ejus, est omnes humores corporis per omnia

vasa movere, accelerare, aequaliter distribuere; adeoque organa sensuum, & musculos corporis, suis muneribus quam optime adaptare.

639. Porro quomodo fiant, corporis erectio, flexio, extensio, in collo, dorso, lumbis; humeri, brachii, carpi, metacarpi, manus, digitorum; femoris, tibiae, tarfi, metatarfi, pedis, digitorum, varii motus; hincque pendens statio, gressus, saltatio, cursus, lucta, &c. per sua organa mota explicare haud permittit brevitatis. Videantur Hieronymus Fabricius ab Aquapendente de motu locali animalium; & Johannes Alphonsus Borellus in opere laboriosissimo de motu animalium: res enim haec compendio enarrari, longè minus demonstrari, ut requiretur, non potest.

640. Quum itaque hucusque (39. ad 640.) per causas, & organa, explicatae sint actiones vitales, naturales, animales, quae mari, & foeminae, adultis, communes; restat porro expendere eas, quae sexui propriae, generationi prolis inserviunt: sunt eae autem in differentiâ sexus absolute diversissimae; tum & in eodem sexu ratione aetatis, quam maximè differentes.

# SEMINIS MASCULINI ORTUS, &c.

641. <sup>a</sup> **A**rteriae Seminales ex Aortae parte anteriori sub <sup>b</sup> renalibus arteriis ortae, quamvis sinistra ex arteria Emulgente nata quandoque dicatur, non magnae, atque propter obliquum suum ex Aortâ decursum pauci humoris capaces, obliquè descendunt, dein <sup>d</sup> venis Spermaticeis sui lateris, quarum dextra ex Cavâ sub renali, sinistra ex renali vena oritur, ad angulum acutum junguntur, communi his vaginulâ membranaceâ includuntur, arctè quasi confunduntur, sic simul tutô sub interiori lamellâ peritonaei tectae decurrunt suprâ musculos Psoas, & ureteres, donec pervenerint ad locum sui exitus in <sup>e</sup> inguine, ubi <sup>f</sup> fibrae carnosae musculi transversi, & <sup>g</sup> obliqui inferioris, paululum recedentes à se mutuo, vasa haec vaginâ suâ inclusa transmittunt, ita ut locus transmittens in musculo transverso altissimus, alter in obli-  
què

<sup>a</sup> Vesal. V. F. xx. h. i. F. xx1. a.

<sup>b</sup> Id. lb. a. b. F. xx1. m. m.

<sup>c</sup> Id. in textu pag. 523.

<sup>d</sup> Id. lb. F. xx. f. e. F. xx1. v y x.

<sup>e</sup> Id. it. F. vi. d.

<sup>f</sup> lb. & T. v. 8. Spigel. iv. T. x. K. K.

<sup>g</sup> Id. lb. T. iv. r. Spigel. iv. T. ix. L. L.

què adscendente inferior sit, tumque adhuc transit per *b* anulum ovalem in tendineâ hic parte muscoli obliquè descendentis, tribus lineis inferiorem priori, denique descendit vagina haec cum suis vasis contentis, suprâ *i* os pubis, atque in *k* scrotum delata facit *l* testem ipsum: toto autem hoc itinere hinc inde arteriolas laterales exiguas demittit. Tum & tria loca in musculis transmittentia vaginam, exiguam, tenuem, membranulam illi concedunt; ubi verò appropinquat testibus, *m* pyramidale corpus constituunt.

642. In ipso hoc itinere *a* parum in spiras flexa arteria SpermatICA emittit ramulos arteriosos, qui *b* rectâ, patenti, satisque magnâ viâ, in venam comitem cruorem arteriosum lateraliter derivent verâ anastomosi, inprimis in pyramidal corpore, ubi arteria feminalis testis propinqua dat ramum inferiori, & interiori epididymidis parti, ramulos illi largientem, dein tunicae nervcae inferendum; & alium ramum in summum testem;

*b* Id. Ib. T. III. Y. T. I. K. Spigel. IV. T. VIII, SV. T. IX. D.

*i* Spigel. IV. T. IX. XX.

*k* Id. Ib. bb.

*l* Id. Ib. YY.

*m* Id. Ib. T. XI. ab ZX ad Y. T. XII. ab Y ad Z.

*a* Graaf. vir. org. T. I. F. I. ABCDE.

*b* Leal Lealis περι σπέρματος ζώων pag. 18. & seq.



stem; quin & multi ramuli à majori trunco venulis in pyramidali corpore intimè confusi, & communicantes, deinde in ambitum testis disseminantur.

643. Namque corpus pyramidale, varicosum, vel pampiniforme dictum, constat venis innumerabilibus, communicantibus, rete quasi efficientibus, adunatis, tandem in unam venam seminalem desinentibus; unde commodissima oportunitas cruorem hunc infundendi his venulis.

644. Arteriae illae, quae tunicam nerveam penetravere, in *a* ramos ordinatim divisae, *b* distinctim locatae, in *c* innumeros tandem ramulos, hinc in capillamenta subtilissima, abeunt, quae infinita sensibus apparent, totum fere testem occupant, & forte in *d* vasa majora, ordinatim posita, atque in *e* unum majus per medium testem desinens Epididymidi continuatum, suum humorem innumerabilibus osculis evomunt; hinc venas non habent, sed in emissaria desinunt.

645. Vasa autem illa (644.*e*) in *a* epididymida,

*a* Graaf. vir. org. T. III. F. III. D.

*b* Id. Ib. F. IV. T. IV. F. IV. V.

*c* Ruysch. Thes. IV. T. I. Graaf. vir. org. F. 2. T. IV. F. III. BB.

*d* Graaf. vir. org. T. III. Fig. IV. B. B. T. IV. F. IV. V.

*e* Id. Ib. C. & Ib. F. III. B. T. IV. F. I. A. F. IV. BC. Leal. Lealis F. I. totâ.

*a* Graaf. Ib. T. II. F. II. GHIK. F. III. GFDF.

pyramida, vel parastatam terminantur, atque in cavum ejus canalem suum humorem eructant; est verò *b* fabrica ejus unum continuatum, cavum, cylindricum vas, in flexibus innumerabiles complicatum, unitum, corpori testis incumbens, arteriis irrigatum, in unum vas referens, vel ejaculatorium, definens; quod creassurgens, supra os pubis assurgens, in pelvim descendens *a* posteriori parti cervicis vesicae appropinquans finitur in vesiculas feminales.

646. Eidem fabricae conficiundae junguntur nervi teneri ex rete nervoso abdominali unâ cum vasis spermaticis, tunicae nervae impensi, inque eâ evanescentes; tum & alius à pari *xxi*. spinali.

647. Venulae exiguae, & vascula lymphatica innumerabilia, à testium corpore reducunt eum humorem, qui superest secretionis factâ; sed & credibile in his, quibus conficitur, nec tamen evacuatur semen, magnam ejus partem, & quidem subtilem, resorberi his vasculis, in corpore pyramidalis venoso misceri cruori, hinc totam oeconomiam corporis mutare.

648. *a* Vesiculae feminales *b* collo vesicae

*b* Id. Ib. T. I. F. III. ABCDEFGH.

*vc* Nefal. v. F. & *xxi*.

*Id* Id. Ib. F. *xxiii*.

*a* Graaf vir. org. T. vi. F. I. EE.

*b* Id. Ib. T. *xxii*. FF.

à parte posteriori nexae per *e* membranas, sunt *d* intestinula caeca, in gyros, cryptas, recessus, complicata; in quae definit *e* vas ejaculatorium sensim latius & sinuosum, rursum angustius, ubi incurvatum ingreditur fere recto itinere in haec intestinula versus horum fundum capacissimum; iterumque hinc *f* alio canale emissorio cum priori ad angulos acutos juncto praedita est quaeque vesicula, qui bini emissorii in urethrâ ad angulum obtusum juncti, *g* in unum canalem emissorium in urethram patentem desinunt: interrimque hae vesiculae ambae *b* membranâ musculosâ colligatae sunt.

649. Omnia haec demonstrant (641. ad 649.), sanguinem similem renali; paucum; arteriâ spermaticâ receptum; lentè motum; circâ corpus pyramidale retardatum, sanguine rubro crassiore per canales in venas hiantes orbatum; hinc ibi minus rubrum; lentissimè motum; testium, angustis, gyris, recessibus, fere stagnantem, quasi cinereum; in ductibus Higmorianis fœtum, haerentem, crassescentem; tardissimè pulsus in epididymidem; ejus complicatione iterum fœtum, stagnantem.

*c* Id. Ib. T. vi. F. 1. 11. GGG.

*d* Leal. F. 2. F. 7a Gd. Graaf Ib. T. vi. F. 1. 11. EE.

*e* Leal. F. 2. EdbDbC.

*f* Id. Ib. cB.

*g* Id. Ib. BA.

*b* Vid. Allegata ad c.

stagnantem quasi, elaboratum; tandem repere in vas ejaculatorium sensim patentius, inde in ejus dilatatis, sinuosis, recessibus, colligi, quiescere, foveri, elaborari; tumque in anfractibus cellulosis vesicularum feminalibus latissimis propelli, recipi, recondi, integrè quiescere, crassescere, magis albescere, foveri, atque in summam suam perfectionem elaboratum, Semen vocari.

650. Unde nullus humor tantâ tarditate gignitur; nec tot viis retardatur, aut quiescens ita fovetur. An toto illo itinere retardato semper aliquid accedit per vascula minima nervosa, aliaque? aufertur verò per lymphatica varia iterum aliquid tenuissimi humoris in vascula pyramidalis corporis, aut in venulas vesicularum feminalium, & inde rursus in totius corporis humores? certè utrumque admodum probabile est.

651. " Humor qui in meditullio testis, epididymide, vase ejaculatorio, vesiculis feminalibus, deprehenditur, recens, tepidâ paucâ dilutus, microscopiis optimis spectatus, constat innumerabilibus, exiguis, oblongis, caudatis, vivis, anguillulis, innatantibus alteri parti hujus humoris: hoc verum est in omni homine, quadrupede, ave, pisce, amphibio, insecto, semper, tantum hîc loci. Si haec conferuntur cum mole, figurâ,

• Leeuwenhoek sparsim.

figurâ , loco , permutatione , carinae pulli apud Malpigium descriptae ; & cum observatâ naturae lege in generatione ranarum ; probabile fiet, animalcula haec masculini seminis continere rudimenta corporis futuri humani ; inprimis , quum testibus , aut hoc humore , deficientibus sterilitas semper à parte maris adsit.

652. <sup>a</sup> Eodem loco , ubi patet in urethram exitus vesicularum seminalium , circumnascitur urethrae glandula Prostata , una , continua , conica , fibris muscularibus circumcincta , <sup>b</sup> composita duodecim distinctis aggregatis glandularum ita , ut glandulae cujusque aggregati per emissaria sua desinant in unum sacculum , cui infundunt suum humorem ; hinc sacculi duodecim distincti <sup>c</sup> totidem distinctis notabilibus emissariis hiantes in cavum urethrae ita , ut undique cingant exitum illum vesicularum : unde accuratè hic miscentur semen , & humor prostatae : dum vesiculae & prostatae eadem membranâ musculari ambiuntur.

653. Humor hîc factus est blandus , pinguis , candidus , copiosus ; post abstinentiam ab opere venereo diuturnam actione de-

R

po-

<sup>a</sup> Graaf. vir. org. T. v. KKLL. Tab. VII. GG. T. VI. F. I. LL.

<sup>b</sup> Memoires del'Acad. Roy. T. 2.

<sup>c</sup> Graaf. Ib. T. VI. F. I. KK.

ponendae alvi, aut reddendi lotii, saepe expressus; animalcula descripta non continens; ablata testium, & vesicularum feminalium, actione, superstes, nec tamen tunc prolifer; videtur hinc semen crassius & cineritium diluere, vehere, & forte in primis à coitu momentis nutrire animalcula descripta.

654. *a* Urethra binis membranis, & cavernoso corpore his interposito, constans; *b* cavernosum ejus corpus inter finem prostatae & unionem corporum cavernosorum crassissimum, dein toto decursu gracilius, ad anteriora penis crassescens, extrorsum flexum, linqvit in medio apertum os Urethrae in glande, *c* dein verò constituit superficiem anteriorem spongiosam glandis, terminatam in eminenti ejus fimbria circâ nexum praeputii; in cavum suae fistulae recipit *d* emissaria obliqua ex glandulis Cowperianis confectum humorem blandum praecipuè flaccido veretro dimittentia in usus necessarios superficiei interiori urethrae: in externâ glandis superficiei *e* subtilissimâ tegitur membranulâ, sub quâ latent *f* papillae nervosae sensibiles admodum,

VO-

*a* Graaf. Vir. org. T. VII. KMNNP.

*b* Id. Ib. KM fere ad N. Ruysch. Observ. C.F. 75. ad 81.

*c* Id. Ib. F. F. 81. B.

*d* Drake Anthropol. l. I. Cap. 71. Tab. IV. I. I. K. H. H. & Ib. Fig. 2. F.

*e* Ruysch. Ep. T. XIX. F. 3. E.

*f* Id. Ib. F. & Fig. 1. A.

voluptatis, dolorisque, causa praecipua.

655. <sup>a</sup> Corpora cavernosa, orta à parte inferiore ossium pubis seorsim, investita suâ membranâ; sibi mutuô juncta ope septi medii sensim ad anteriora evanescentis, faciunt praecipuum penis corpus, quod <sup>b</sup> ad anteriora sub coronâ glandis sensim imminutum, glandisque interiorem substantiam constituens, definit; totum dein hoc corpus sic constructum ambitur <sup>c</sup> membranâ cellulosa mirae texturae; dein <sup>d</sup> firmo involucro nervoso limitante ejus extensionem; denique cute & cuticulâ.

656. <sup>a</sup> Arteriae ex Iliacis internis plerumque cruorem vehunt in ipsa cava corpora cavernosa urethrae & penis, ubi divisae in innumerabiles arterias capillares continuantur in venulas, in his autem <sup>b</sup> cellulae cavae innumerae inter se communicantes, omnesque se evacuant in <sup>c</sup> magnam venam decurrentem per dorsum penis sub ligamento jungente ossa pubis solitariam, circâ prostata-

R 2

tas

<sup>a</sup> Graaf. Org. vir. T. ix. F. i. LBFFDBL.

<sup>b</sup> Id. Ib. AA. Ruysch. Observ. C. F. 76. b & ad 81. &c. Fig. 81. C.

<sup>c</sup> Ruysch. Ep. T. xix. F. 2. F. & Fig. 3. AC. Fig. 4. A.

<sup>d</sup> Id. Ib. FHDD.

<sup>a</sup> Graaf. T. ix. F. i. CDDD. F. 2. HHGG. F. 111. AA.

<sup>b</sup> Id. Ib. F. 111. bb. Ruysch. Observ. C. F. 81. & F. 75.

<sup>c</sup> Graaf. Org. vir. T. viii. PXXWW.

tas demum divisam in binos ramos se evacuant in venas Iliacas internas utrimque; venae autem corporis cavernosi urethrae ponuntur ad <sup>d</sup> musculos Acceleratores in scopum necessarium.

657. Si ergo quacunque ex causa animales spiritus ex cerebro in nervos musculorum erectorum penis solito plus influunt, (quum hi <sup>a</sup> muscoli ab externo tubere Ischii infra ortum corporum cavernosorum orti inferantur involucro firmo nervoso horum corporum, ibique tendinescentes evanescant), corpus penis apprimetur plus ossi pubis & ligamento ejus medio, vena magna penis plus comprimetur, venae praeputii minus; arteriae ergo replebuntur & venae, hinc vena plus comprimetur, inde & sinus cellulosi sanguine implentur, inflatur ergo sic sanguine turgens utrimque penis, & urethrae cavernosum corpus, adeoque & glans; verum ipso hoc opere causae tumefaciennes augentur, unde penis riget, rubet, erigitur; interim & debet ex eadem causa turgere membrana prostatarum & vesicularum seminalium muscularis, omnesque nervi tendi, hinc semen ex vesiculis, humor ex prostaticis, expressa colligi in ea parte urethrae, quae libera à musculis erectoribus; dum  
b trans-

<sup>d</sup> Graaf. Ib. T. VIII. K. L.

<sup>a</sup> Graaf. Ib. T. VIII. KK. T. IX. Fig. I. MM.



transversi , qui à tubere externo Ischii in superiora bulbi urethrae affiguntur , & unâ dilatator posticus ex parte anteriore , inferiore , intestini recti , affixus in inferiora , & posteriora Urethrae , urethram hîc eo tempore dilatant ; denique violentè compulsis acceleratoribus ( qui carnei orti à superiori parte urethrae sub ossè pubis ambientes bulbum urethrae inferius juncti , decurrunt , & secedentes inferuntur utrimque membranae forti corporum cavernosorum penis ) , simulque convulsis musculis prostaticarum & vesicularum , sanguis maximè pellitur in penem , semenque vi ejicitur ; spiritus cessant ; vena liberatur ; cruor ex sinibus in venas jam laxas influit ; partes tensae iterum se contrahunt , penis flaccescit.

658. Hinc igitur intelligi potest , quid vir ad generationem tribuat ? id autem mirabile , barbae , pubisque , ortum , & fere conservationem , tum vocem , temperiem , aetatem certam , affectus animi , concomitari , vel sequi , feminis confectionem. Sed & notum hinc fit , semen à naturâ spirituum animalium , salis volatilis oleosi , humoris

R 3 fer-

<sup>b</sup> Cowper append. ad Myotom. reform. Fig. X. E. E. & Fig. XII. EE.

<sup>c</sup> Memoir. del' Acad. Royal. Tom. 2. p. 305.

<sup>d</sup> Graaf. Vir. org. Tab. VII. KL.

<sup>e</sup> Id. lb. Tab. VI. Fig. 1. & II. GGG.

ferventis, fermentique, alienissimum, esse blandum, viscosum, inertem, humorem: imò & liquet musculos transversales penis, unâ cum musculo dilatatore postico urethrae, egregii usus esse in dilatandâ parte inferiore urethrae.

## D E M E N S T R U I S.

659. **F**Oemina habet os sacrum latius, & magis extrorsum vergens, quam viri; tum & os coccygis illi est plus retrorsum cedens; ossa quoque innominata sunt latiora, plus remota à se invicem, atque inferius longè plus extrorsum versa; simul quoque eminentiae inferiores ossis pubis itidem magis extrorsum feruntur: hinc mulieri \* latitudo maxima circâ haec ossa, contrâ quam in viris, tum & capacitas pelvis ingens prae eâ quae in viris, interim tamen in muliere non gravidâ non sunt multa, quae eam valde repleant.

660. Habent & thoracis anteriorem faciem foeminae longè planiorem, quam quidem viri.

661. Interim vasa sanguinea, lymphatica, adiposa, nervosa, membranae, fibrae, sunt in foeminis longè laxiora; unde omnes cavitates, cellulae, vasa, facilius in his reple-

plentur, humoresque aggregantur; hinc cellulosa, & adiposa, membrana his semper est crassissima.

662. Iterum verum deprehenditur, eas longè minus perspirare, quam quidem viri solent; atque etiam longè citius adipisci sui incrementi.

663. In hac pelvi (659.) *a* situs est molli; pulposus; totus vasis constans; facile extensilis; nec multum elasticus Uterus; fere liber, nec fixus; vix pressus, dum *b* expansa peritonaei membranâ defenditur.

664. Ille autem, *a* figurae turbinatae, constat *b* membranis, fibrisque; accipit *c* arterias ex spermaticis, & *d* hypogastricis, anastomosibus inter se unitis, incurvatis, totum uterum ambientibus; ejusque molem perreptantibus ubique, & undique, ultimò evanescantibus; & quasi uterini corporis partem maximam constituentibus; simili apparatu, & origine, venae pariter omnes inter se communicantes, ita ut humor ex unâ per omnes ire, redire, queat; in ca-

R. 4

*a* Spiegel, VIII. T. XVIII. Z. T. XIX. Q.

*b* Bidloo, T. 30. XXXLK.

*c* Ruych. Th. VI. T. IV. V. Graaf. org. mul. T. VII. BD.

*b* Id. Ib. T. VIII. GG. T. IX. II.

*c* Id. Ib. T. I. I. K.

*d* Id. Ib. P. T.

*e* Id. Ib. R. V. confer Tab. XII. & T. XIII.

vitae suae internae pertunditur, non modo semissariis tubarum Fallopii, sed & plurimis hiatibus exiguis, humorem blandum, aquoso-mucosum, sudantibus; quo interne lubricatur, defenditur, à concretionē impeditur, ejus cavitas.

665. Simulac ergo virgo sana, adepta terminum sui incrementi, incipit conficere plus humoris boni, quam sustinendo corpori requiritur, quum augendo non amplius impendat, implebit plus sua vasa, maxime uterina, & mammaria, utpote minime pressa; haec dilatabit plus quam alia, hinc & lateralia vascula in cavum uteri evacuantia humorem (664.g) valde impleta extendet; inde dolor, calor, pondus, sentiuntur in lumbis, ad pubem, & inguina; excitatur febricula; dilatantur vascula uteri (664.), ita ut cruorem ipsum in cavitatem uteri stillent; os ejus lubricatur, laxatur, sanguis exit; minuitur ejus copia; minus premuntur, plus se contrahunt, illa vascula; retinetur sanguis; dimittitur crassior pars feri; tandem sola illa lympa consueta; iterum conficitur plus humorum, facilius deponitur in vasa jam semel dilatata, hinc eunt, redeunt, vario in variis tempore, menstrua.

666.

f-Id. lb. T. x. DC.

g Id. lb. T. ix. l. i.

666. Quum verò Arteriae Mammariae, & Epigastricae, mirè a communicatis anastomosibus inter se communicent, liqueatque idem de venis, patet evacuatis uterinis minus distendi mammarias, ideòque instantibus menstruis turgere mammas, & contrâ.

667. Inde autem intelligitur, cur mulieres duriori fibrarum compage donatae; aut magis siccae; item valde musculosae, minusque pingues; tum & valido labore quotidie exercitatae; minus, tardius, per longiora intervalla, & aliquando omnino nihil, excernant cruorem menstruum? dùm interim molliores; laxiores; succulentae magis; pinguiore quodammodò, minusque musculosae; otiosae denique; sanguinem hunc copiosorem, velociorem, parciore intervallo periodi, dimittant? Tum etiam, cur retentus hic humor, tam varias sibi, aliis dilatatis vasculis, vias faciat, usurpet, iisque periodicè exeat? ut & cur certo aetatis tempore demum incipiant, augeantur, desinant, Menstrua quibus citissimè oriantur? cur autem iisdem praematurè iterum deficient?

\* Nuk. Adenogr. de mamm.

## DE CONCEPTU.

668. **C**onstat dein, ex <sup>a</sup> binis superioribus foraminibus Uteri exire <sup>b</sup> duos membranofos canales, ex <sup>c</sup> angustâ capacitâ circâ matricem sensim dilatatos, in hemicyclos cellulofos flexos, tandem lato orificio, fimbriis carneis circumpositis ornatô; constant membrana interiori glandulosa cum lacertis carneis; hae autem Tubae in omni fere animalium genere tempore orgasmiphrodisiaci, turgent, rigent, carunculis florent; in cadaveribus foemininis dissectis tuba saepe fimbriis complexa ovarium visa fuit; quinimô in cellulosis earum recessibus inventi fuere foetus quidem variis locis, varii quoad tempus, à conceptu egressum, & quoad magnitudinem.

669. <sup>a</sup> Utero, ad distantiam binorum circiter pollicum lateraliter annectuntur per <sup>b</sup> ligamenta valida duo Ovaria, quae & ope membranarum aliarum à peritonaeo ortarum obvoluta firmanur; haec sunt scabra, inaequalis superficiëi, satis magna, sphaeröidea, corpora, membranâ firmâ inclusa; irrigantur

<sup>a</sup> Graaf. Org. mul. T. x. C.

<sup>b</sup> Id. Ib. T. xi. LMN.

<sup>c</sup> Id. Ib. T. xix. F. 2. ACCCBEE.

<sup>a</sup> Id. Ib. T. vii. IH. G. T. xi. R. I. Q.

Graaf. mul. org. T. i. ff.

tur arteriis spermaticis & hypogastricis, ante ingressum suum hîc loci itâ unitis, ut quasi unum vas, in reticulares plexus contextum, constituere videantur, quarum ratione corpusculi incredibilis multitudo; idem de venis hîc fitis verum, ut & de numerosis vasis lymphaticis; omnia haec vasa cum nervis, ut faciant ovarii structuram, ita commiscantur, intrlicanturque, ut fabrica describi haud queat; in superficie verò ovariorum, sub membranâ cingente, deprehenduntur sphaerulae infernè per calicem crassiusculum concretæ ipsi substantiae ovarii, pellucidae, humore Lymphatico, ad ignem concrecente, repletæ, binisque membranulis concentricis, sibi que invicem arctissimè nexis, constantes. Ovaria porrò haec in omni sano corpore foeminino praesentia, in juvenculis ante annos pubertatis parva, sensim majora, tempore prolificationis maxima, in victis iterum diminuta, observantur. Bullulae verò descriptae, calice suo haerent finibus minutissimis vasorum enumeratorum, post usum veneris fere tantum apparent, sensim tumescunt, pedetentim magis pellucet, crassescunt in membranis suis, membranam ovarii elevant, extendunt, in formam papillae sic dilatant, ut emineant, à pedunculo suo pendeant, inde separentur,

-il. 10. 20. utraq. circa  
-le Id. Ib. T. XIII. I. K.

cicatricem cavam relinquant in substantiâ & membranâ effractâ ovarii, sensim iterum coalescentem; tandem & in his bullulis hîc loci adhuc haerentibus ovario, foetus inventi fuere.

670. Ex quibus omnibus satis certô confici videtur, bullulas has Ova esse, quae ex vasculis ovarii suam fabricam, ex humoribus autem ejus mirificè praeparatis liquorem suum, nasciscantur; ideoque huic muneri destinatam à naturâ esse totam hanc adeo mirabilem fabricam.

671. Unde & scitur, tubas veneris stimulo rigentes, fimbriis musculosis rigescentibus, ut digitis, amplecti ovaria, haec premere, suum autem os ipso hoc amplexu expandere, tum ovum maturum sensim separatim in cavitatem suam urgere, motu autem laceratorum suorum musculosorum sensim propellere, in cavum tandem uteri eâdem causâ dimittere, ibique vel fovere, si semen maris accedit, vel expellere, si absque hoc ibidem receptum fuerit.

672. Si enim animadvertimus in ea, quae omnibus oviparis accidunt manifestissimè; tum in ea, quae viviparis diverso à cœitu tempore inesse demonstrantur ipsis oculis; denique in illa, quae femellis humanis tam in naturali, quam in praeternaturali, statu gravidis, parturientibus, partu expulso libera-



beratis, observata sunt contigisse ; tum apparebit , quod hic modus nec impossibilis , nec alienus , naturae sit , sed contrâ ubique hunc solum universalem esse : falsi conceptus ; abortus ; foetus in cavo abdominis ; &c. idem firmant.

673. Itaque masculinum semen animalculis vivis scatens ; maximâ vi , summo calore , forte & ingenti copiâ spirituum animalium incitatum ; impetu violento immissum in uterum muliebrem , tum pariter turgidum ; motum ; calescentem ; & quasi inflammatione levi validum ; affluxu pariter suae lymphae & spirituum irroratum ; mox convulsivâ uteri constrictione retentum , calefactum , agitaturn , ovo occurrens , parte vivaci incredibiliter parvâ intrat per dilatatos tum poros glandulosae factae membranae ovi , ibi retinetur , sustinetur , fovetur , nutritur , umbilico suo accrescit , reliqua minus vivacia animalcula suffocat ; sicque Conceptus factus est.

674. Qui ergo fieri potest in omni illo loco, ubi semen tale illud ovum alluit ; hinc per tubam Fallopii ovario applicatam ovo affusum ; aut in aliquo recessu ejus tubae illi occurrens ; aut in ipso uteri cavo illud offendens ; ubique idem efficere poterit : tamen est forte non improbabile perfectissimè Conceptum fieri binis his in uterum eodem  
tem-

tempore simul delatis, commistisque.

675. Ovum impraegnatum clauso jam stricturâ suorum muscutorum utero continetur; ejus affluentem tum abundantem humorum copiam innatat; qui calore, & motu, semper liquidiores facti, per meatus imprimis spongiosos ovi parti uni adhaerentes impulsâ intrant, ovulum distendunt, replent, augent; ibi iterum eisdem causis subtiliores redditâ Embryonem nutriunt; amplectuntur, defendunt contrâ pressionem inaequalem; tum quoque membranas ovi pariter crassiores reddunt, simul & explicant, imprimis eâ parte, quâ ovario adhaeserat, ita ut ibi forment rudimenta placentae, quae videtur modò esse ipsum calicem ovi prius formans substantia aucta omni quidem dimensione omni fere momento temporis.

676. Dum verò eadem illae causae assiduò renovatae magis, magisque, pergunt augere molem ovi, & Embryonis, simulque meatus tam placentae, quam membrularum, ampliant; incipit ovum suâ jam mole capacitatem uteri implere, ejus superficiei cavae suam convexam applicare, jungere, ubique unire emissis, receptisque, tenerriimis vasculis, maximè autem in loco placentulae; quo ipso opere & uterus extenditur quâquâversum, & pari proportionem omnia ejus vasa omni mensurâ ampliantur,

tur, plus humorum recipiunt, plethorae menstruae materiem consumunt; hinc pariter eâdem plane proportionem, quâ incrementum meatus ovi, etiam dilatantur emissaria uteri, ita ut capacitas horum unita sibi invicem jungat uterina & ovi vascula; eâque ratione impediatur effluxum lymphæ vel sanguinis ex utero, & efficiatur ut depleantur vasa uterina in ovum distentum ejusve vasa, & vicissim illa ovi in uterum.

677. Et quia foetus jam umbilicali funiculo jungitur ipsi placentæ, atque constat hic binis vasis ducentibus humorem ex foetu in placentam, uno autem majori ferente ex placentâ in foetum, evidens est renovari sic his viis perpetuô omnes humores hic collectos, nec stagnare, nec putrescere.

678. Ubi autem mutua hæc osculorum ampliatio crevit eousque, ut uterina interna emissaria ipsum jam cruorem possint emittere, & alia eum recipere, tum cruor abundans vasis arteriosis amplis uterinis contentus, ad placentam uterinam appulsus, ejus vasis dilatatis impelli, in ejus structurâ mutari, sic ad foetum mitti videtur: quia hæmorrhagia in abortu, partu, vulneratâ gravidâ, puerperâ, separatâ placentâ contingens; tum jactura cruoris in foetu vulneratâ matre tantum, id evincere videntur; licet obstare videantur in cadavere non apparent-

rentia vasa, & membranula integra placentaef superficiem utero contiguam cingens.

679. Etenim totum *a* placentaef corpus *b* arteriis innumerabilibus, ubique dispersis, ut in cortice cerebri; venis simili artificio intertextis; folliculis lymphaticis, & vasis lymphaticis, imprimis constat; tum *c* membranulâ tenui, facilè lacerabili; ambitur; recipit *d* binas arterias à fine Aortae descendentis retrogradas ad umbilicum foetus pergentes, ibi emissas, in substantiâ subcartilaginosa *e* funis umbilicalis sustentatas, defensas, nec impeditas, à foetu referentes cruorem circulationi in foetu minus aptum, hinc eò pulsum; venarum autem origo adeò subtilis, ut omninò haud pateat, tamen omnes collectae in unum truncum, qui committitur etiam umbilicali funi; haec vena *f* per umbilicum ingressa, sursum tendens, per fissuram mediae parti inferiori hepatis anterioris insculptam ingreditur *g* sinum majorem venae Portarum, illique infundit omnem vectum sanguinem, ita tamen, ut ostio hujus venae umbi-

*a* Ruysch. Th. v. T. I. F. I.

*b* Id. Ib. D.

*c* Id. Ib. A. Mauriceau de la grosseſſe. pag. 191. l. II. cap. IV.

*d* Spigel. de form. foet. T. VII. H. F. F.

*e* Ib. MLLH.

*f* Ib. HE. & T. VIII. CE.

*g* Glisson. de hep. C. 33. F. 1. & 2. HH.

umbilicalis in sinu Portarum venae opponatur è regione <sup>b</sup> alius inde exeuntis tubulus in Cavam rectâ ducens. <sup>bi</sup>, ubi diaphragmati annectitur, unde hepatis, vel cavae, atque inde cordi sanguinem facillè dare potest, inde distribuendum lege circuli per omnem corporis ambitum.

680. Porro sanguis à toto corpore focus, & à venâ umbilicali, in <sup>a</sup> sinum venosum infusus, ad auriculam fere ingressus, unâ parte descendit in cor, ut in adultis, alterâ verò parte impingit in <sup>b</sup> claustrum medium hîc inter duas auriculas, in quo claustro est <sup>c</sup> foramen apertum, cui incumbit <sup>d</sup> porta membranacea ita, ut mobilis ejus pars respiciat in cavum auriculae sinistrae; unde patet ex auriculâ dextrâ in auriculam sinistram agi hanc portionem cruoris, quamdiu pulmo non operatur; aut saltem in proximâ auriculis viciniâ ex sinu venoso Cavae, in sinum venosum Pulmonalis venae.

681. Portio illa, quae cor dextrum ingressa, vi ejus agitur omnis in truncum arteriae pulmonalis, quae in pulmone collapsa tum, & gravi, magnam patitur resistantiam, hinc arteriae truncum liberum à pulmone

<sup>b</sup> Id. Ib. q K.

<sup>a</sup> Low. de Cord. T. 1. F. 1. & 2. cgd.

<sup>b</sup> Id. Ib. c.

<sup>c</sup> Id. Ib. ecc.

<sup>d</sup> Id. Ib. F. 3. aab.

mone valde dilatat; dein paucâ parte transit  
 per pulmones, lentèque transiens vasa arte-  
 riosa à concretionē impedit, pro ratione in-  
 crementi foetus auget, & extendit; dein ex  
 pulmonibus in venam pulmonalem redit,  
 cruori foramine Ovali admissio miscetur, nec  
 ejus ingressui obstat paucus, tenuissimèque  
 motus hic sanguis; unde uterque in auricu-  
 lam laevam, inde in cor sinistrum pellitur;  
 maxima autem pars cruoris cordis dextri in  
 latere canalis arteriosi pulmonici invenit  
 a canalem apertum, ubique aequè latum,  
 ex arteriâ pulmonali paulum obliquè in ar-  
 teriam aortam ingressum, per quem ergo  
 transit ex arteriâ pulmonali in arteriam Aor-  
 tam omnis ille cruor ex corde dextro pulsus,  
 qui facilius superat sanguinis in Aortâ resi-  
 stentiam, quam parit collapsus pulmo: Cor  
 autem sinistrum suum cruorem pellens,  
 eum miscet ipsi illi sanguini mox descripto:  
 ergo cruor foetus caret omni effectū pulmo-  
 nis in sanguinem; tamen eo eget quam ma-  
 xime: ideo ergo subtilissima portio cruoris  
 arteriosi materni in uteri vasculis separati,  
 in placentâ elaborati, assidue miscetur cruo-  
 ri foetus mox fluxuro per vasa minima cor-  
 poris: crassior autem pars arteriis umbilica-  
 libus necessitate mechanicâ opposito cursu  
 matri respiranti iterum subigenda datur:  
 dum

dum interim obstacula in placentae trajectu prospiciunt vitae ipsius foetus.

682. Interea tamen in vasculis uterinis aliis praeparatur lymphatica nutritia materies, redditurque adeo subtilis, quae ex meatibus uteri in poros chorii agatur; in vasis ejus exactius mutetur; in amnii canaliculos abeat; ibi ulterius perficiatur; in cavum amnii instillet; ibi à foetu ore hauriatur; deglutiatur; stomacho haereat; digeratur; bile, succo pancreatis, salivâ, humore intestinali, subigatur; transeat in chylum vasis chylosi hauriendum, & in foeces lentas motu intestinorum ad sphincterem Recti usque pellendas, in toto recto, colo, & coeco aggregandas, compingendas, nec eliminandas, quia vis sphincteris superari nequit, dum nulla respirandi adest actio: unde foetui jam perfecto totus hic tractus repletus est plerumque.

683. Quum verò salivam, mucum, deglutione; bilem, & humores alios affluxione, etiam intestinis recipiat; omniaque talia foeces semper aliquas ponant, hae additae materiae priori (682.) concurrunt & ad ejus constitutionem semper.

684. Imò & Renes, hoc tempore magni, & ex minoribus aggregati, assiduo stillicidio vesicam urinariam irrigant, replent, co-

S 2

piâ

piâ quidem parvâ, sed affiduâ blandae, non acris, urinae; hujus verô emissionem per urethram impedit absolutè obstaculum sphincteris non superandum nisi vi inspirationis; sed ubi abundat, intrat in<sup>b</sup> canalem membranofum, ex fundo vesicae semper egredientem, sursum adscendentem, umbilico excurrentem, cum fune umbilicali deducente exporrectum usque ad radicem placentae, ubi desinit in<sup>c</sup> vesicam singularem propriâ, ab amnio & chorio distinctissimâ, membranâ constantem subtiliori quam reliquae duae, figurâ ovalem, sitam inter placentam amnio & chorio obductam, & intrâ chorion suprâ eam reflexam eique adnatam; haec enim lotii apotheca, cujus humor eô copiosior, coloratior, urinae propior, quô foetus magis excrefcens nativitati propior.

685. Ubi itaque foex intestinalis, & lotium, aucta; nec expelli potentia; mole, pondere, acrimoniâ, gravia facta foetui; jam capitis vertice posito in locum ubi est os internum uteri, & facie interim ossi coccygis materno obversa; incipiunt intestina & vesica urinaria, impleta, stimulare fibras, excitare sensum molestiae, motum, nixumque, musculis abdominalibus, & toti foetui, producere, unde augetur molestia prior,

<sup>b</sup> Spigel. de form. foetu T. VII. C. G. H. M.

<sup>c</sup> Hale in Act. Phil. Anglican. pag. 835. 1700. 1701.



or. hinc assiduô incipit omni conatu quâ-  
quaversum niti, versus inferiora descendere,  
matri tenesum creare ; inde & incipiunt  
hujus musculi abdominales violentissimè  
convelli, deorsum pellere foetum in pelvim,  
augere sic proprium tenesum, unde sum-  
mis matris, infantisque, nixibus dilatatur  
os uteri internum, lubricissimo linimento  
tum inunctum, & laxum, propellitur aqua  
alantoidis, & amnii, rumpuntur membra-  
nulae, exeunt aquae, caput agitur in capa-  
citatem oris dilatati, tumque nixu aucto  
materno per lubricata loca exit ; subsequen-  
tibus fune umbilicali, membranis, placen-  
ta, titulo Secundinae; exit plerumque sanguis.

686. Tunc autem, omnibus his dimissis,  
fibrae uteri, peritonaei, musculorum abdo-  
minalium, vasorum, quae ultimo gra-  
viditatis tempore erant quam distentissi-  
mae, contrahere se incipiunt, suaeque vasa  
contrahere, maximè uterus, a sensim & len-  
te se contrahens, expellit cruorem huc ag-  
gregatum, primò purum & multum, deinde  
dilutum & parciorem, tandem viscidum  
pallidum, paucum, Lochiorum nomine;  
quae varia quoad copiam, durationem eva-  
cuationis, colorem, odorem, tenacitatem,  
prout diversa est puerperae nutricis, abla-  
ctantis, functio, temperies.

S. 3

687.

\* Ruysch. Observ. Fig. 39.

687. Postquam contractis his partibus (686), vasa magis arctata plus resistunt cruori huc deponendo, tertio fere à partu die incipiunt hypogastricae, mammariis communicantes, his dilatatis infundere plus sanguinis, ad uterum ferri soliti, adeoque aquosi chylosi; unde plus implentur, distendunturque, vasa mammarum eadem materie; hinc immutatione motus humorum febricula, in mammis tumor, dolor, durities, lac.

688. "Mammæ enim in loco libero, solâ pinguedine, & facile dilatabili cute, tectæ, recipientes arterias externas ab axillariibus, internas à subclaviis deorsum dimissas in thoracem per intercostalia, & sterni, loca egressas, mammis commissas, epigastricis communicantes, inde in miras contorfionum spiras, nodulosque, abeunt, tandem lactiferos tubos rectâ emittunt exiguos, qui uniti majores, tandem vasa lactifera majora, latiora, in angustum desinentia, atque arctatissimâ fistulâ in papillâ exeunt, ita tamen, ut ex arteriis per lactifera in papillam, ab hac per galactophora in arterias sit itus & reditus; habent verò hæc papillæ nervæ, spongiosæ, emissaria plura, numero variantia, ante exitum anastomosibus communicantia; unde suctione applicatâ educitio,

etio, & assidua refectio, lactis, eô quidem magis, cocteris iisdem, quô plus suguntur ubera.

689. Quod lac in serum, caseum, cremorem, butyrum, facile abit; cuius pars caseosa mirificè durescit; ad ignem non concrevit instar seri sanguinei, sed exhalat relicto crassamento; plerumque acefcit sponte; dulce; album; inodorum fere; est ex chylo, & humoribus blandis maternis oleosis; circulatione mistis, materies.

690. Atque hinc patet; cur?

Mammarum dolor, durities, tensio, papillae elevatio, seri stillicidium vesperi, tempore graviditatis accidant?

Et quare haec augeantur imprimis tribus à partu diebus?

Tum undenam fiat, ut repulso lacte; largiora lochia, & contra?

Item cur color, odor, sapor, vires, assumptorum notabiles in ipsa lactis materie?

Aut quamobrem lac sponte vix effluat; factâ tamen primâ suctione cum saltu saepe profiliat?

Unde viris, virginibusque, aliquandô, foetui utriusque sexus semper lac in uberibus fuerit?

Ut & cur ex omnibus humoribus animalium solum lac naturaliter acefcit ut plurimum?

Sic

Sic quare hoc tam facile deponat cremorem, & caseum?

Item cur vario tempore à cibo, potuque, assumtis adeò sit varium, ut omninò differat? hinc statim à cibo assumpto post jejunium vim bonam malamve assumpti contineat, communicet? quatuor, aut quinque, horis à pastu sit optimum? at viginti quatuor horis jejunanti nutriti, falsum, ingratum, flavescent, brevi foetens, infanti abominabile?

Quin & hinc etiam habetur fundamentum praescribendo victui in bonum infantis.

691. Interim foetus in ipso partus opere assiduus conatibus nitens simul ac aëri exponitur thoracem dilatat, aërem admittit, pulmones in omnem mensuram explicat, vasa horum augeat, resistantiam horum contra sanguinem arteriae pulmonalis minuit, unde hic impetu in vasa libera irrumpit, canalem arteriosum praeterlabitur, copiosus, veloxque, in venam pulmonalem ruit, valvulam foraminis ovalis premit, foramen claudit, totam copiam ventriculum cordis sinistrum ingreditur, totam copiam expellitur, Aortae latera plus premit, canalem arteriosum complicat, claudit; hinc cruor auriculae dextrae, sinusque venosi, omnis ventriculo dextro impellitur, inde in pulmones agitur, fit respiratio ut in adultis, concrevit membrana foraminis ovalis

lis ad margines ejus, mutatur canalis arteriosus in ligamentum.

692. Sed & ligato fune umbilicali propè cutim nihil fluit per venam ejus in hepar; abit vena in ligamentum; cum sanguis venae Cavae celerius jam motus comprimit obliquum canalem venosum, ut concreascit in ligamentum; simul & arteriae umbilicales clausae brevi consolidantur.

693. Quin respiratione jam factâ, foex alvi, nigra, tenax, splendens, opio similis, Meconium dicta, expurgatur; ut & vesica urinaria eâdem operâ, & constricto uracho, per urethram evacuatur, ut in adultis.

694. Ex quibus omnibus solvuntur omnia haec problemata.

1. Quid pater, quid mater, generandae proli facit?
2. Quenam causa sterilitatis in mare, in foeminâ, in utrisque?
3. An ex solo semine masculino, ullâ arte, verus homo produci queat?
4. An ulla foemina, ex ullâ causâ naturali, absque ullâ viri consuetudine, foecundata fuerit?
5. An cruor menstruus malignus, venenatusque, sit? an impurus, & recrementosus, habendus?
6. An mulier verum genitale semen faciat, & suscitandae proli conferat?

7. An feminis utriusque miscela, ebullitio, fermentatio, aut alia actio, faciat corpus hominis?

8. An bonâ fide locus certus conceptui proprius assignari queat?

9. An foemina, praeter fœtum, nutrimentumque, formam dat foetui? an id docet vis imaginantis gravidæ?

10. Quid foecundatio sit?

11. Unde tres membranae foetus originem ducant, quoad materiem, & quoad causam?

12. Unde placenta? funis umbilicalis? quomodô Embryo, & foetus, illi nectantur?

13. An alatur foetus per os, an per umbilicum, an per utrumque? & quâ diversitate pro vario à conceptu tempore?

14. An foetus omnia viscera, vasa, artus, simul habeat? an verô planè mutet formam primô pisciculo, dein amphibio, postea respiranti, proximam: an verô in utero respirat, & aëre utitur?

15. An in utero deponat alvum? & cur non? an meconium in uteri vâginâ deprehensum, aut inde demissum, testatur mortem foetus, aut aliud quid?

16. An superfoetatio fieri potest? & cur rarissimè, si unquam?

17. Gemini, tergemini, quadrigemini,  
cur

cur uni placentaë, ut videtur adhaerent, chordas umbilicales tamen & membranas singulis proprias possident? an quia ovula totidem unico calici adnata? an quidem id semper, ubique, verum deprehenditur?

18. Undenam gravidis nausææ, vomitiones, vomitus, animi deliquia, horrores, pica, mammarum durities, dolor, tumor, macies, menstrua retenta, anhelitus, tussis, varices pedum, crurum, foemorum, abdominis, facilisque lapsus?

## ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ.

## MORBI NATURA.

695.



ACTENUS enarratae, atque indicatu suarum causarum explicatae, actiones principes, quae in corpore humano exercentur per motum humorum

in vasis suis, perque horum renixum in illos: vocantur vocabulo recepto Functiones; hae verò solent distingui in vitales, naturales, animales, sexus, privatas, publicas; Vitales, quae vitam faciunt ita, ut haec iis carere nequeat; sunt actio musculosa cordis, actio secretoria cerebelli, actio pulmonis, sanguinisque, & spirituum per organa illa, arterias, venas, nervos, circuitus; unde patet has in suâ perfectione multum eundem augeri, minui, posse, vitâ tamen adhuc superstitè: Naturales, quae assumpta sic mutant, ut in naturae nostrae partem abeant; sunt actiones viscerum, vasorumque, & humorum, recipientes, retinentes, moventes, mutant, miscentes, seccernentes, applicantes, excernentes, consumentes; quae etiam admodum differre possunt: Animales, quae



quæ ita in homine contingunt, ut vel Intellectus humanus ejusmodi ideas inde concipiat, quæ illi actioni corporeæ unitæ sunt, vel Voluntas aut his actionibus excitandis operetur, aut iis natis moveatur; sunt Tactus, Gustus, Olfactus, Visus, Auditus, Perceptio, Imaginatio, Memoria, Judicium, Ratiocinium, Animi affectus, Motus voluntarii; in quibus omnibus est quoque ingens graduum diversitas. Proinde jam physice intelligitur, quid sit propriè Vita, quamdiu illa duret, in quibus accuratè consistat, quibus carere possit tamen utcunque perdurans: item inde scitur, Sanitatem esse facultatem corporis aptam omnibus actionibus perfectè exercendis. Constat denique omnes effectus actionum illarum revocari posse ad motus determinatos, & ad immutationem assumptorum.

696. Status corporis viventis tollens facultatem exercendæ actionis cujuscunque (695.) vocatur Morbus. Cujus ergo idea est absentiae requisiti ad exercitium possibile actionis, vel præsentiæ repugnantis exercitio eidem. Nec mentio animæ facta in hac definitione: quia corporis statum determinatum idem animæ status individuè comitatur; & quia Medicina, in solum corpus agens, consuetas animæ conditiones restituit; tum etiam quoniam mentis mutata

con-

conditio ignoratur, nec bona vel mala noscitur sanitati, nisi effectū corporeo jam nato, edito, cognito.

697. Proinde omnes morborum quorumcunque naturae cognoscendae, & inveniendae sunt in variis conditionibus diversimodè affecti corporis bene observatis, enarratis, explicatisque. Nec juvant, quae de principio animato his intermiscuerunt Egregiū in arte nostrā Viri, ut cuilibet sincero indagatori, & aestimatori rerum apparebit.

698. Qui itaque haberet perfectè intellectas omnes conditiones requisitas ad Actiones, ille perspiceret clare defectum conditionis ex cognito morbo, & rursus bene caperet ex cognito defectu naturam morbi inde necessariō sequentis. Quae scientia *Παθολογία* appellatur, inque suas partes dividitur (34.).

## MORBORUM DIFFERENTIAE.

699. **U**T itaque actiones, sic morbi, distingui possunt; ut conditiones ad actiones, ita & harum defectus; hinc 1. morbi partis solidae simplicis, organicae, 2. humorum morbi, horum naturam, copiam, accidentia, spectantes; 3. morbi ex his binis compositi, qui humani, masculini, foemini. Ad quas classes summas omnes compendio duci queunt. MOR-

## MORBI SIMILARES.

700. **M**Orbus partis solidæ simplicissimæ, Similaris dictus, propriè 1°. obtinet in fibrâ ultimâ; quæ quum sit corpus merè terrestre, tenue, simplex, nervosum, vel ex nervis oriundum, conflatum ex partibus terrestribus subtilissimis, certâ vi connexis, patietur inprimis morbos nimii roboris, nimiae debilitatis, rigiditatis, laxitatis, unitatis solutæ: quatuor quidem priores semper habent rationem certam ad *συμμετρίαν* sui corporis: hinc diversitas uni salubris, morbosa sæpenumerô alteri est.

701. Idem morbus, unâ cum suis differentiis (700.) obtinet 2°. in membranâ minimâ ex fibris hujusmodi junctis, vel intertextis, factâ; & 3°. in canalibus minimis nerveis cylindricâ concretionē cavâ talis membranae constitutis; 4°. in membranâ contextâ ex talibus canaliculis, usu fibrarum fungentibus; 5°. in canalibus ex tali membranâ compositâ factis, quæ sunt omnia vasa majora corporis, vario gradu compositionis admodum differentia; 6°. in iis partibus solidis, quæ ex canalibus humore distendente orbis, compressis, concretis, constant; vel quæ ex humore crassescente, atque unâ cum proprio vase coercente concreto, in  
unam

unam quasi singularem partem crassiores abeunt : si enim examinantur morbi omnibus his seorsum spectatis accidentibus, deprehenduntur modò esse mox descripti.

702. Quin etiam in his partibus semel sanis morbi oriri queunt malæ structuræ ; si solida minima nutrientia mala, vel male apponuntur ; & quidem particula apponenda mole, figurâ, soliditate, mala evadere potest ; appositio autem mala iterum videtur tantum habere morbos eosdem, ac sunt jam descripti (700.)

703. Qui enim ulterius inquirat in originem horum morborum, jam sanè tractabit vitia humorum, aut incidit in subtilitatem sensibus abditam, nec utilem Medico : quare etiam morbi Similares Temperici, Elementarii, aut totius Substantiæ, in scholis vocati, hîc profectò locum habere non possunt, nec intelligi ; sed ad compositos, si queunt, legandi.

## MORBI ORGANICI.

704. **U**bi autem pars quædam corporis composita ex partibus enumeratis (700. 701.) valet actionem motu humorum peragendam munere instrumenti peragere, aut aliud quoddam munus vi suæ conformationis efficere, tum spectari potest vel

in se, ut pars solida, vel ratione habitâ ad suum humorem contentum: si prius fit, tum morbi Organici dicti in eâ recensentur commodissimè ad quatuor hasce classes:

1. Figuræ laesae in externâ, vel in internâ, superficie, tum in accidentibus utriusque, asperitate, laevitate, rectitudine, curvitate, laxitate, densitate, cavitare, soliditate; qui morbi malae Conformationis appellantur.

2. Numeri in excessu, vel in defectu.

3. Magnitudinis auctae, vel imminutae.

4. Situs, nexus; hinc mobilitatis excessivae, deficientis.

705. Ipsa verò superficies prius sana, deinde verò laesa, consistet vel in unionem partium componentium variatâ, vel in morbis humorum ibidem peccantibus.

706. Quatenus autem superficies format cava, ut fiant meatus, sinus, receptacula, peccare potest numero, unde rarò morbi, vel magnitudine cavitatis factae exsuperante, aut deficiente.

707. Si naturalis cavitatis capacitas augeatur nimium, aut si nova quaedam formatur, oritur triplex malum, quod *ἀναστροφὴς*, *ἄπληθυσ*, *διαίρεσις*, appellatur: in primo dilatatae cavitatis ora emittunt retinenda: in altero partes membranas constituentes sic divelluntur, ut interstitia hiantia nascantur demittentia continendum: in tertio denique

contingit cohaerentium vera separatio : unde merentur retineri hae morborum species, saepe in unam diaeresin exeuntes, quandoque se restituentes, & optime ex mechanicis explicandi.

708. Auctâ vi humoris vas nimis auctum quoad capacitatem constituit morbos in materie trajiciendâ, secernendâ, excernendâ, peccantes.

709. Cavitationis autem imminutae quintuplex censetur species, 1. ἐμφορξίς, cavitationis obthuratio per viscosum, crassum, grumosum, inflammatorium, calculosum, gypseum, purulentum, adiposum; intrinsecus ipsa vasorum cava occludens. 2. στενωχώρα, angustatio viae, quandô enatus tumor in substantiâ propriâ membranae, constituentis cavitationem, meatum arctat, & impedit. 3. θλίψις, laterum mobilium compressio; quando causa externa membranas vasis sibi invicem apprimens, cavitationem per gradus minuit, tandem perfectè tollit. 4. σύμφοσις; quandô latera cavum formantia vel θλίψις vel ἐμφορξίς penitus coalescunt ita, ut tota aboleatur capacitas interior. quô & referri solet 5. συνίησις, quâ dicuntur vasa inanita, collapsa suas cavitates amittere; intelligi potest in iis, quae ultrâ rationem distenta per morbosam materiem nimîâ κενεαγλεία evacuuantur subitô. An & huc referri debet vasis contractio nimia per vim excedentem fibrarum orbicularium?

710. Numero autem excedente pars organica rarô peccat, ut morbo; nisi inde sequatur laesa actio: sed à defectu laborat saepe, ut pro morbo annumerari debeat.

711. Sed magnitudo in parte organicâ morbosa saepe habetur, quae tum etiam excessu aut defectu peccat. Prior complectitur tumores, *ὑπερσπαρχώδης*, nodos, tophos, exostoses; hic plerumque potest referri ad cavitatis angustationem circâ fines angustos, dilatationem verô in medio, aut ad *καταχυμῖαν*, *ἐκχύμωσιν*, *διαίρεσιν*. Posterior autem adest, ubi requisita magnitudo partis ad agendum minuitur; estque ejus conceptus in *κένεαγλεία*, *ἀρεοφία*, *φθισί*, nimia contractione in temperie nimis strictâ, mutilatione.

712. Denique est morbus organicae partis consistens in compositione malâ cum aliis partibus; quae quidem in situ, nexuque, haeret, & in quâ mobilitas, vel immobilitas partis, continetur. Ad hunc morbum ergo pertinent, figura nec tendorum laesa; ligamentorum nec tentium nimia accurtatio; eorundem peccans elongatio, horum laxitas; aut rigiditas; tandem disruptio; materiae inter nec tendenda requisitae absentia, aut depravatio; aut peccans praesentia; distortio; subluxatio; luxatio; qui tres morbi potestremi sursum, deorsum, antrorsum, retrô,

introrsum, extrorsum, contingentes varia iis nomina, ad intellectum eorum utilia, imponunt; Herniae umbilicales, inguinales, scrotales, in viris, femorales in foeminis, tum omenti, intestini, pinguedinis, aëris, aquae, in eas ingressus; uteri prolapsus, & intestini recti; musculorum, tendinumque inprimis eorum ex debitis locis exsilitio; membranaceorum vinculorum eos proprio loco retinentium laxatio, ruptio; primarii sunt huc pertinentes morbi, intellectu sanè perquam necessarii in Medicinâ.

713. Est & morbus parti solidae, tam simplici, quam organicae, communis, qui dicitur Solutio continui simpliciter, si in parte simplicissima fit; sed in parte organicâ compositâ variè denominatur à naturâ partis, à diversitate causae, à discrimine applicationis; huc ergo spectant vulnus, scissura, fissura, punctura, contusio, ulcus, corrosio, dilaceratio, ruptura, fractura, fissura, exfoliatio, caries, spina ventosa.

## HUMORUM MORBI.

714. **U**T ritè intelligantur deinde morbi humorum, atque accurato digerantur ordine, scire est dotes in iis requiritas esse vel universales cuicunque liquori necessarias; vel singulares, quibus donantur huma-



humani ; denique privati hujus , illiusve , singularis hominis indolem in humore constituentes. Universales quidem sunt , ea parvitas partium quae omnem fugiat sensum nudum , tam parvus nixus in contactum mutuum , ut minimâ vi sensibili superari queat , ea superficierum lubricitas ut se invicem vix implicent. At respectu naturae humanae accedunt plurimae equidem aliae dotes , unde profectô & multi admodum morbi oriuntur.

715. Qui omnes morbi tamen revocari facile possunt ad copiam , vel qualitatem , laesam , si fluida quidem in se spectantur.

716. Si autem considerantur quatenus coercentur in solidis definitis , tunc loco inprimis , aut proportionem , peccare deprehenduntur.

717. Humoris boni ea abundantia , quae laedit functiones , vocatur *πληθώρα*. Quae intelligitur conceptâ bonâ chylosi , haematopoiesi , concurrentibus unâ cum parciori exhalantium dispendio. Hanc describunt , quod sit vel ad vasa , vel ad vires.

718. Humoris boni ea inopia , quae laedit functiones , rarô adest , nisi subito vis externa eam effecerit , quum coeterum mala simul adsit in humoribus temperies.

719. Humoris qualitas illa , quae laedit functiones , *καχεχυμία* appellatur. Ea est vel

haerens in fluidis, quatenus spectantur seorsum partes componentes simul massam fluidi; vel in totâ mole fluidi simul consideratâ ut parte ad constituendum corpus humanum concurrente.

720. Si consideratur morbosa indoles in unâquâque particulâ humoris, ea haerebit vel in mole auctâ aut minutâ; vel in soliditate particulae nimîâ aut minore; vel in figurâ; tum in rigiditate, flexilitate, elasticitate, cohaesione variâ, aut denique divisibilitate, consistet.

721. Molis auctae in partibus humorum idea exhibet horum immeabilitatem, *ἔμφραξις*, in vasculis minoribus *ἀτεροφίαν*, *σύμψυσιν*, *συνίλησιν*.

722. Molis minutae in partibus humorum idea exhibet *Ἀσπνολω*, & *νερεαγλείαν*, nimiam.

723. Soliditas aucta in partibus humorum si concipitur, habetur vis nimis immutans tam solida, quam fluida, & simul intelligitur in solidis partibus *ἀναστόμωσις*, *Ἀσπιδήσις*, *δαίρεσις*; in fluidis verò nimia attenuatio & attritus.

724. Si intelligitur soliditas nimis immutata, concipitur inertia tam in vasa, quam in fluida, hinc & quies, & cita cohaesio.

725. Peccat particula humoris suâ figurâ tum inprimis, quandô à naturâ sphaericâ recedens

cedens angulosam acutam induit; hinc motum suum integrum parvae parti applicans acris fit; recessus hi varii sunt, sed commodissimè revocantur 1. ad acrimoniam merè mechanicam dictam, ubi, omnibus iisdem manentibus, sola figura in angulos solidos acutos componitur. 2. ad acrimoniam salinam dictam, quae hîc inprimis est muriatica, ammoniacæ, acidæ, alcalescens, fixa, volatilis, simplex, composita. 3. ad oleosam, quae est olei in spiritus attenuati, olei attritu nimio quasi exusti, olei salini, olei terrestris, olei acris quasi exusti salini & terrestris simul. 4. ad saponaceam acrimoniam, qualis in venenis animalium & vegetantium deprehenditur. 5. ad acrimoniam ex quatuor praecedentibus compositam, tum & eam, quae ab assumtis acris in corpore saepe nascitur, ut à vitriolis metallicis.

726. Est & morbus gravis, vixque sanabilis humoris, si ejus particulae tam rigidae, ut vi corporis humani subigi, inque idoneas massulas figurari, dividique, nequeant.

727. Sed & eadem nimis mutabiles in suis figuris morbosae sunt: etenim, complanatis superficiebus, auctis contactibus crescunt.

728. Quin & notabilis est morbus in partibus nimium elasticis nostrorum humorum:

quippe qui nimium mutat assiduô omnem humorum compagem, ad minimam mutationem caloris, aut motus comprimentis.

729. Imô & nimis firma cohaesio substantiae in quâlibet particulâ mala est: nam impeditur sic productio minorum molecularum ex majoribus, quae tamen tam necessaria ad integritatem Vitae. Contrâ verô nimis facilis divisibilitas nocens est; namque repugnat constantiae Sanitatis, & Vitae.

730. Et sunt sane hi morbi maximi quidem momenti in Scientiâ Medicâ, & intellectus eorum basis certè optimae Pathologiae: intelligi tamen vix queunt, nisi accuratissimâ observatione suorum effectuum, quos in corporibus aegris praestant: unde & patet sic humorum *ιδιουσμεγείαν* morbosam optimè perspicere.

731. Si autem spectaveris humores totos simul, deprehendes morbos eorum praecipuos esse, vel nimiam fluiditatem, vel nimiam tenacitatem, tum excedentem horum motum per vasa, aut quietem eorundem nimiam, aut denique morbum compositum ex vitiis recensitis (717. ad 731.) hæctenus.

732. Oriuntur & morbi notabiles in humoribus manentibus iisdem, sed solâ mutatione loci morbosus redditus; cujus mali duae sunt classes: 1. si nimis auctâ diametro vasis, crassiores humores recipiuntur canalibus  
arctio-

arctioribus, qui sensim angustiores fiunt. 2. si ruptis quomodocunque vasis exeunt humores, colliguntur in interstitiis à distensione factis inter partes solidas corporis; intelliguntur huc pertinere, inflammatio, aneurisma verum, varix, sugillatio, aneurisma spurium, *ἐκχύμωσις*, à cruore errante in suo loco. Tum oedema, pustulae, hydrops, membranae cellulosae, capitis, thoracis, abdominis, uteri, ovarii, testium, scroti, peritonaei, habitus totius corporis, à lymphâ similiter peccante. Tandem emphysemata ab aëre.

733. Humores autem hi stagnantes, collecti, effusi, calore & quiete putrescunt, purulenti, ichorosi, rodentes, acres, fiunt, stamina tenella solida destruunt, unde sinus, fistulae, ulcera, gangraenae, sphacelli, canceri, & similia.

734. Sunt autem hae (699. ad 734.) primariae morborum differentiae, ex ipsâ naturâ eorum petitae, quae certè maximam partem adeo foecundae aliis producendis morbis, ut hinc fere etiam inter causas morborum recenseretur mereantur.

735. Usu verò obtinuit inter Medicos, ut praetereâ distinxerint morbos ex quibusdam accidentibus externis, quae quam plurimis diversissimis communia sunt, quae tamen distinctiones, & usum in Medicinâ ce-

lebrem habent, licet nimium subtili divisione multiplicati sint, omiſſis ergo aliis praecipuae ſunt ſequentes.

736. 1. Ratione Cauſae ſunt; *ιδιοπαθήα*, *συμπαθήα*, *παραπαθήα*, *δδικοπαθήα*, haecreditarius, connatus, acquiſitus.

2. Ratione Subjecti ſunt; morbi aetatis, puerorum, juvenum, adultorum, ſenum; morbi generis, maſculini, foeminini, virginei, gravidae; parientis, nutrientis; tum univerſales & particulares.

3. Ratione Temporis; acutiſſimi intrâ quatuor dies terminandi; peracuti intrâ ſeptem; acuti intrâ dies viginti; chronici reliqui omnes; dein verni, vel autumnales, continui, continentes, intermittentes.

4. Ratione Effectuum; ſalubres, benigni, maligni, ſanabiles, inſanabiles, lethales, contagioſi.

5. Inprimis ratione Status; initii, progreſſus, ſtatus, decrementi, finis.

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.

737. **C**Auſa morbi vocatur, quae morbum praefentem facit. Semper fere realis eſt. Aut re verâ producit novum ſtatum in ſolidis, & in fluidis, qui morbus ferme ipſe. Aut tollit rem requiſitam omnino ad exercitium functionis.

738. Si illa praeexistit quodammodò in corpore antè effectum productum, Interna vocatur; si autem extrà corpus existens, inde ei applicata, morbum parit Externa dicitur.

739. Internae laedunt plerumque primò humores, deinde partes solidas; Externae ut plurimum prius afficiunt solidas, & humores deinde; venenatos paucos, & contagiosos, morbos forte exceperis.

740. Causa proxima morbi appellatur tota illa simul, quae totum jam praesentem immediatè constituit; haec semper est integra, sufficiens, praesens, totius morbi, si-ve simplex fuerit, si-ve composita. Hujus praesentia ponit, continuat, morbum. Hujus absentia eum tollit. Est fere idem ens ipsi integro morbo. Hinc inquisitu utilissima, maximè necessaria.

741. Causa remota morbi dicitur illa, quae corpus ita mutat, ut aptum sit suscipere morbum, si adhuc alia accesserit. Non est ergò integra unquam, nec sufficiens, illi morbo producendo. Nec alia illa accedens sola eum pareret; at utraque simul. Ergò utramque simul eradicandam jubet Medicina. Ambae junctae faciunt causam proximam.

742. Causa remota corpori inhaerens vocatur Praedisponens, vel *παρασκευάζουσα*; estque talis v. c. temperies, plethora, cacochymia.

743. Cau-

743. Causa, quae remotae accedit, eam excitat, ut morbum faciant simul, appellatur *αρχαταρκτηκή*, vel *αίτια*, quibusdam Occasio. Solis nocet praedispositis, ut fiat talis morbus. Aliquandô est interna, quandoque externa.

744. Hae posteriores omnium commodissimè, atque memoriae juvandae aptissimè, reduci possunt ad quatuor classes iis indagandis, digerendisque, apprimè utiles: quae sunt:

1. Ingesta. Aër. Cibus. Potus. Medicamen. Venenum. Quae per spiracula cutis, narium; per meatus oris, pulmonis, oesophagi, ventriculi, intestinorum, pudenda muliebria introgeruntur, Specie visibili, invisibili, fumo, haustu, deglutitu, enemate, infuso.

2. Gesta. Motus corporis totius, partisve, affectus animi quicunque. Quies utriusque. Hinc Somnus, & Vigilia, huc quoque referentur.

3. Retenta. Excreta. five salubria. five recrementa. five morbosa.

4. Applicata externa corpori. Aër. Vapor. Fomentum. Balneum. Vestis. Lini-  
mentum. Unguentum. Emplastrum. Vul-  
nerans. Contundens. Erodens.

745. Quae eadem in sex classes alii dividunt titulo Rerum non naturalium digestas;  
quas



quas nempe recensent ita , ut sit. 1. Aer. 2. Cibus, potus. 3. Motus, quies. 4. Animi affectus. 5. Retenta, excreta. 6. Somn-  
 ius, vigiliae. Hoc nomine donatae, quia  
 usu, vel abusu, bonae naturales, aut malae  
 contranaturales, fieri queunt. Ad has quo-  
 que causae illae redigi possunt. Longè ta-  
 men commodius, atque indagini aptius prae-  
 cedenti divisione utemur.

746. Aër nimis aestuans, humidissima  
 oculorum, narium, oris, asperae arteriae,  
 dissipat; vascula ibi exsiccat; pulmonis cruo-  
 rem magis cogit; utrâque causâ pulmonis  
 actiones impedit; multos morbos inde oriun-  
 dos excitat; humores externos semper te-  
 nuiores aufert, internos residuos excoquit,  
 dissipat mobilia, lentiora aggregat, com-  
 pingit, exsiccat; ergo partes aquosas, spi-  
 rituosas, salinas volatiles, assiduò diminuit;  
 contrâ verò salina fixiora, olea crassa & te-  
 nacia, acria exusta & iis involuta, tum ter-  
 restria fixa, auget, accumulât, unit, in  
 massas irresolubiles adunat; hinc itaque,  
 immeabilitas humorum, simul elongatio, &  
 debilitatio solidorum, &, quae inde sequun-  
 tur, obstructio, exsiccatio, inflammatio,  
 coctio impedita, putrefactio, alvus adstri-  
 cta, sitis, stranguria, urina rubra, humo-  
 res flavi, morbi acuti, calidi, sicci quam-  
 maximè generari solent; inprimis autem ge-  
 nus

nus nervosum , lymphaticumque , & horum actiones inde summoperè laeduntur.

747. Aër gelidus fibras solidas accurtat , densat , roborat ; hinc actionem earum in humores auget ; ubi autem regelascit , tum fibras dissolvit , destruit ; idem aër gelidus humores cogit , densat , pulmonem siccat , stringit , coagulatque sanguinem pulmonalem , unde obstructio , inflammatio , exsiccatio , anhelitus , tussis , coryza , catharrus , mucus , pus , gangraena , sphacelus ; si autem corpus simul valdè movetur , tum actio solidi in liquores , & humorum in liquida , adeò augetur , ut fiat summa attenuatio , perspiratio , voracitas , debilitas , animi deliquia , mors subitanea ; si contra quies , summumque simul frigus aëris afficiunt , tum torpor , dolor ad artus , scorbutus , contingunt.

748. Si idem nimium humidus , laxat , solvit , debilitat ; fibras , imprimis pulmonales , serum pulmonum retinet , auget , accumulatur , perspirationem in iis prohibet ; unde rursus tussis , peripneumoniae , serosae ; diarrhoeae similes , torpores , & febres ; si magnus calor illi jungitur , cita putrefactio ; si magnum frigus , tum serosa colluvies.

749. Atqui nimis siccus patrat fere eadem , ac si aestu nimio ageret.

750. Aër nimium gravis , comprimit omnes

omnes canales, humoresque totius corporis, maximè autem in pulmonibus, unde resistantiam cordi nimis auget, motum humorum suffocat, occidit.

751. Idem si levis nimium fuerit; vasa, humoresque minus premendo dilatat, rarefacit, hinc tumores, eruptiones humorum, eorum in loca minus oportuna derivationes, inde morbos (732.) creat; sed tum simul minus valet vim contractilem, dilatationi resistantem, in fibris pulmonicis superare; unde respiratio sistitur, sanguis ibi accumulatur, peripneumonia velox, mors. Sed & ex iisdem, densi, rarique, aëris effecta patefcunt.

752. Coelum, anni tempestas, solum, mare, montes, lacus, paludes, flumina, vapores, exhalationes, meteora, aërem ita permutant, ut creët varios morbos non pendentes adeo ex ipsa aëris indole, ejusve dotibus, qualitatibusque, quam quidem ex naturâ & efficacîâ admisti: unde etiam inde inquire, atque intelligi, debent.

753. Venti autem agunt in corpus nostrum vel suo motu, vel quatenus simul nobis advehunt qualitates aëris explicatas (746. ad 753.): impossibile est ea de iis dicere, quae omni tempori, & regioni, quadrant, sed cognitio chorographica loci, cujus solum vicinum undique perspectum est, comparata

parata cum anni tempestatibus, aliquid boni, verique, hic adfert. Pariter certâ successivâ serie sequentium notabilis saepe effectus. Primariô agunt ut calidi, frigidi, humidi, ficci. Hinc solida, & liquida, mutant.

754. Cibi quidem, & potus, peccare possunt ad morbos producendos, vel copiâ, vel qualitatibus.

755. Copiâ quidem si male agunt, excessu, vel defectu, id efficiunt.

756. Si nimiâ copiâ peccant, nimis extenditur ventriculus, hinc convulsione natâ ora ejus clauduntur, vasa ejus comprimuntur, dilutio, digestio, contritio, separatio, expulsio, horum prohibetur; inde dyspnoea, circuitus humorum perversus, cruditas, ructus, nausea, cardialgia, vomitus, putrefactio, vertigo, confusio, cachexia, quae omnia vitia hic semel nata vix corriguntur in functionibus sequentibus.

757. Quod si defecerit in inediâ absolutâ, equidem quum merus sit defectus, per se nihil efficit: sed tum intereâ temporis actiones vitae persistentes solidas corporis partes deterunt, destruunt, consumunt; subtilissimos humorum dissipant; residuos inspissant; repetito continenter attritu solvunt olea, & sales, eadem extricant, volatilia, acria, rodentia ad minima & tenerri-  
ma

ma vāscula reddunt; humores putrefaciunt, anhelitum foedant; hinc spuma salina, acris, biliosa, putrida, in ventriculo inprimis & in intestinis; ructus; nausea; animi deliquia; ingens, & atrox appetitus; ejusdem deinde integra prostratio succedens; postea immanis sitis, siccitas, debilitas; tormina; borborygmi; bilis cumulus, vomitusque; macies; pervigilium; epilepsiae; febres furiosae; mors.

758. Ex quibus patet, abstinentiam quoque nimiam peiores morbos creare, quam nimiam repletionem, & longè difficilius sanari posse prioris, quam posterioris vitia; assentiente Hippocrate.

759. Illa autem vitia, quae in qualitate malā cibi, potusve, haerent, commodè possunt revocari ad acrimoniam, viscositatem, aut oleositatem.

760. Acrimonia cibi & potus est primò Salina; haec autem est muriatica, acida spontanea, vel fermentata. Prima facit sitim, raucedinem, asperitatem, siccitatem, rigiditatem, acrimoniam in humoribus maximè serosis, similem humorum dissolutionem, serosae lymphae ineptitudinem ad nutriendum, solidorum minimorum destructionem, dolores rodentes, scorbutum muriaticum. Altera, quae vel acida simplex, aut plerumque acerba simul, adstringit, incras-

fat, coagulat, acidam acrimoniam, dolores lancinantes, algentes, cardialgiam, pallorem, scabiem, inprimis creat; atque praecipuè residet in fructibus horaeis paulò minus maturis. Tertia denique in vinis acidis, aut acetis, consistens, fere similia facit, at leviora, deinde prae coeteris nimio usu assumpta acre acidum ferum facit, unde rheuma, podagra, & similia.

761. Acrimonia secundò in cibis & potu est Aromatica, ut plurimum constans ex sale & oleo acris unitis; haec facit sitim, siccitatem, calorem, ardorem, stimulum solidi, velocitatem humorum, liquidi dissipationem, hinc cardialgiam, ardorem stomachi, nauseam, ructus, vomitus, febres, maciem, contracturas, & morbos inde pendentes.

762. Acrimonia tertiò est Spirituosa fermentatione parata, tempore diuturno aucta, destillatione in summum gradum evecta, est ut plurimum in vino, in cerevisiâ antiquâ, spiritibus stillatitiis; producit sitim, temulentiam, fibrarum constrictionem siccam, humorum coagula vix resolvenda, stimulum celerrimum & citissimè evanescentem partium solidarum, hinc summam necessitatem similis potus assiduò auctioris, inde debilitates, flatus, obstructions, febres, tumores, leucophlegmatiam, hydropes, & similia his mala.

763. Quartô denique deprehenditur acrimonia penetrans Fermentans, quae inprimis in musto crudo fructuum horaeorum, aut in vino, cerevisiâve, in ipso actu fermentationis citô suppressâe clausis; haec creat ructus, inflatus, spasmos ventriculi, intestinorumque, vomitum, choleras, diarrhoeas, dysenterias, ileon, & talia.

764. Viscositas autem nimia ciborum ex farinosis non fermentatis, aut ex gelatinosis animalium, tum ex caseo lento, aut pressio nimis coagulo lactis, gignit pondus in stomacho, flatus, ructus, acorem, cruditates, vasculorum tenuiorum in intestinis obstructions, hinc intestinorum inertiam, abdominis infarcti tumorem, duritiem; tum deinde ipsi sanguini infert viscositatem malam ex unitis iterum viscosis particulis, hinc obstructions ad glandulas, pallorem, inertiam, frigus, tumores; sed & patet, quod frigida dicta potentiâ similia faciant; tum etiam quod prae coeteris noceant quiescentibus corporibus.

765. Nimia verô Oleositas, solida lubricat, laxat, debilitat, oscula minimorum vasculorum obstruit; hinc introitum aquosorum impedit; miscelam humorum depravat; acria nidorosa, urentia, excitat; hinc ructus, nauseas, vomitus amaros oleosos, ereat; tum sitim immanem, obstructions,

inflammationes, indigestiones viscerum, & mala inde orta, efficit.

766. Motus nimius muscularis in toto corpore, vel in aliquâ singulari parte, augeat semper villorum muscularium contractiones & laxationes reciprocas; simulque velocitatem in omnibus humoribus; hinc fluida, & solida, nimium attrita dissolvuntur; aquosa, spirituosa, mobilia, diffantur; residui humores in densitatem inflammatoriam mutantur; interim olea, & sales, nimis attenuata, trita, volatilia facta, acia reddita, quasi in putredinem exaltantur; crassa, & tenacia, olea, accumuluntur; humores quasi exusti redduntur; omnium maximè bilis; medulla consumitur; cellulæ ichore replentur; macies fit; hinc defatigatio, dolor, inflammatio, febris, suppuratio, gangraena, haemorrhagia, mors subitanea.

767. Si autem acciderit cacochymicis, aut consumto fere viscere quodam laborantibus, tum etiam in summo aestu, subitò lethalis.

768. Vigilia nimia consumit spiritus nullâ arte, nisi somno, reparandos; exsiccat reliqua; atterit solida minima imprimis cerebri, atque acre; coctiones, nutritionesque, impedit; bilem exasperat; hinc productio maciei, febrium, deliriorum, bilis atrae  
gene-



generatio, agitatio, evacuatio, harumque teterrimi effectus, tristitia, phantasia depravata, inquietudo perpetua.

769. Quies nimia musculorum in toto corpore, vel in aliquâ singulari parte, fibras musculares motui ineptiores reddit; minuit velocitatem in omnibus humoribus; hinc concretio, inspissatio, inertia, tam fluidorum, quam principiorum ea constituentium; cellularum repletio; medullae aggregatio; obesitas; leucophlegmatia; frigus; torpor; pigritia; ἀναισθησία. Unde ergo otii, & vitae sedentariae, effectus cognoscuntur.

770. Somnus nimius, volatilia consumit; inspissat sensim reliqua; ea in vasa lateralia aggregat, vix movet; figit excrementa; aggravat cerebrum; caput replet; sensus, motusque, hebetat; reliqua fere omnia jam dicta (769.) procreat; hinc simul iis maximè nocere, qui in eum prae coeteris proclives; prodesse his, qui in pervigilia prompti.

771. Affectus animi violenti, aut diu permanentes iidem, cerebrum, nervos, spiritus, musculos, mirabiliter, & efficacissimè mutant, figunt, depravant; unde quoscunque fere morbos valent producere, & fovere, prò suâ diversitate, & duratione.

772. Salivae excretio nimia turbat coctionem

nem primam , hinc & sequentes ; profert sitim , siccitatem , bilem atram , tabem , ἀ-  
ρεσσίαν ; si autem non excernitur in os , aut  
longè parcius solitò , impedit tum ciborum  
manducationem , saporem , deglutitionem ,  
digestionem ; augetque simul sitim ,

773. Bilis excretio nimia per superiora ,  
vel inferiora , orbat chylopoiesin primario  
instrumento ; hinc impedit ciborum coctio-  
nem , secretionem , foecum excretionem ;  
producit temperiem acidam , frigus , debili-  
tatem , pallorem , leucophlegmatiam , de-  
liquia . Si verò confecta impeditur fluere in  
cavum intestini , icterum creat , & simul  
praecedentia vitia

774. Lympha pancreatis & intestinorum ,  
si nimia copiâ depellitur in intestina , pro-  
ducit mala similia ac saliva sic peccans (772.) ;  
sed & simul diarrhoeas serosas praeprimis ;  
unde summae debilitates , animi deliquia ,  
siccitates , sitis , febris hectica , marasmus .  
Si non fluit in intestina , vel parcissimè ,  
tum facit moles in intestinis crassas , com-  
pactas , hinc pondus , repletionem , tormi-  
na , volvulum , sitim , febrem , alvum du-  
ram , tumores , &c.

775. Sanguinis nimia excretio ; sive per  
anastomosin ex hepate , intestinis , renibus ,  
utero , fiat ; sive per diairesin , diapedesin ,  
aut vulnera ; tollit vires ; minuit spiritus ;  
destruit

destruit omnes actiones ; accumulatur cruda , aquosa , pallida , frigida ; producit leucophlegmatiam , hydropem ; laxitatem in omnibus vasis ; in arteriis autem capacitatem. Cruor autem per haemorrhoidalia vasa , aut naturalia mulierum , vel & per alia minus consuecta loca , dudum jam , & periodicè , evacuari solitus , interceptus nunc , facit topicas , dirasque , inflammationes ; circulationis suffocationes ; febres ; mira morborum , & varia genera ; maximè autem valde mirabiles alibi haemorrhagias.

776. Seminis excretio nimia facit lassitudinem ; debilitatem ; immobilitatem ; convulsionem ; maciem ; siccitatem ; membranarum cerebri dolores , calores ; sensuum , maximè visus , hebetudinem ; tabem dorsalem ; fatuitatem ; varios his affines morbos.

777. Urinae excretio nimia ; facit siccitatem ; humorum immeabilitatem ; ardorem ; sitim inexplebilem ; cruditates ; spirituum subductionem ; maciem ; atrophiam ; & mala his similia. Nimius autem Sudor ferme eadem efficit ; Urina autem suppressa vesicam , ureteres , pelvim , renes , distendendo , rodendo , putrefaciendo , labefactat , corrumpit ; toti lymphae cruoris acrimoniam alcaliscentem conciliat ; hinc cerebri tenella stamina laedendo , anxietates , sopores ,

res, insomnia, vertigines, apoplexiam, profert.

778. Sanctoriani perspirabilis excretio nimia facit debilitates summas; hinc animi deliquia; mortem inopinam. Si verò parcius est, vel sublata, facit extremae cutis vascula ficcari, emori; hinc & majora excretoria obstrui arefacta; mutatur hinc circulatio; retinetur acris; oritur putredo; cruditas; febris; inflammatio; apostema.

779. Applicata externa frigida, meatus claudunt, fibras contrahunt, retenta repellunt, exhalationem impediunt; hinc efficiunt quae perspiratio impedita. Calida autem, aperiunt, laxant, exhalant, versus cutim ducunt, sed exsiccant. Humida abluunt excrementa, aperiunt ora, laxant vasa, alliciunt extrorsum, unde si nimia, morbos producant, ut Sudor nimius (777.). Sicca contraria faciunt: ex quibus efficacia balneorum, fomentorum, epithematum, intelligitur, si prius cognoscitur materies, qualitas, modus, duratioque applicandi. ut & reliqua memorata (744. 4.) prius facillimè capiuntur.

780. Sunt & internae quaedam corpori diatheses, adeò generales, ut plurimi morbi ab iis, ut causis, pendeant; unde in enumeratione causarum generali proponi, explicarique per suas causas solent; suntque  
inpri-

inprimis plethora, cacochymia, heterogenea interna.

781. Plethora fit, sustentatur, auge-  
tur, in corpore, cui viscera Chylopoea for-  
tia, vasa sanguifera laxa, victus plenus bo-  
ni succi, aetas media, temperies sanguino-  
lenta, tempus hybernum, & aestivum, aër  
humidus, mens otiosa & indolens, artuum  
truncatio. Facit autem intolerabilitatem ca-  
loris, motusve; extensionem vasorum ma-  
jorum; compressionem minorum; hinc, mi-  
nimâ datâ occasione, lacerationem in vasis,  
suffocationem in liquidis; inertiam; desi-  
diamque.

782. Cacochymia considerari potest vel  
in iis, quae extrinsecus humoribus accidunt,  
vel in iis, quae internè illis adhaerescunt;  
tumque iterum vel in omnibus simul, vel  
in aliquo singulari.

783. Ubi ergo occurrit primò nimius  
humorum per vasa motus, is facit humo-  
rum compressionem, attritum, attenuatio-  
nem, calorem, diathesin inflammatoriam,  
& mala jam explicata (766.). Eorundem  
verò motus nimis lentus, facit vitia simili-  
ma iis, quae jam exposita (769.). Inprimis  
periculosus spirituum nervosorum motus ex-  
cessu, vel defectu peccans, inde enim omnes  
coctiones, secretiones, excretiones, laedun-  
tur, & inde varii, omnis fere generis, morbi.

784. Humorū autem nimia Fluiditas producit nimiam exhalationem, consumptionem, secretionem perturbatam, vasorum majorum arctationem, inanitatem eorundem, debilitatem, in minoribus vasculis obstructions, rupturas, suppurationes; inprimis nocet si magna acrimonia, motusque, simul concomitantur.

785. Eorum verò Tenacitas nimia parit obstructions, vasculorum extensiones, dolores, tumores, inprimis autem ad glandulas, & ad plexus arteriosos. Ubi verò tenacitati juncta pariter acrimonia, tum pro variâ proportionē, quā concurrunt hae duae; maximè fit vasculorum destructio, unde dein, effusis humidis, pustulae, inflammationes, gangraenae, sphacelus, cancer, ulcera cacöethe, caries, & similia sanè mala; est autem quandoque acrimonia comes, aliquando pedisequa, tenacitatis.

786. Humores acidi crudi, acidi acerbi, acidi fermentati vinosi, acidi chylosi, acidi lactei; tum & alcaliscentes volatiles, fixive, aut jam ipsâ re alcalini; iterum falsi muriatici, ammoniacive; acres salini, oleosi, aromatici; insulsi tandem & oleosi; pariunt morbos quam simillimos propositis (760. ad 767.)

787. Pituita autem insipida, acida, falsa, vitrea, Veteribus adco considerata, intellige-

ligetur quoad ortum, & effectus, ex (785. 786.).

788. Bilis flava, vitellina, porracea, aeruginosa, Isatodes, solo motu, convulsione, animi affectu, saepe nascitur, causâ vix explicatâ hæctenus; producit autem multos, malosque, morbos, nauseas, horrorem contrâ cibos, anxietates, singultus, cardialgias, vomitus, dolores iliacos, colicos, tormina, flatus, borborygmos, diarrhoeas, dysenterias, acutos morbos, febres, convulsiones.

789. Bilis autem Atra dicta à colore suo, & Bilis vocata à sede, ubi colligitur, & unde excernitur; aliquando sapore acerrimi aceti, quandoque verò putrefacti cruoris, rodit, urit, eliquat, inflammationes, gangraenas, sphacelos, dolores atrocissimos, effervescentias enormes, excitat. Triplex quidem talis in causis morborum describitur: 1. mitissima ex ipsâ materie sanguinis nimis moti, hinc exusti dicti (766. 783.) 2. ex hac primâ magis, magisque, per easdem causas exacerbata. 3. ex bile corruptâ, exasata, quae si ex flavâ, vitellinâ, porraceâ, aeruginosâ, Isatode, orta fuerit, posterior semper peior est, hinc pro varietate indolis, quâ gaudet, & pro ingenio partis, in quam deponitur, varii admodum ejus effectus.

790. Sanguis etiam, ferum, bilis, si sca-

tent

tent praedominante acido , alcali , muriatico sale , oleo , vel terrâ , producunt morbos , quales ex his rebus oriri demonstrati sunt (760. ad 767. & 786.).

791. Serum sanguinis , bilis , urina , generant ex suâ materiâ calculos compositos ex volatili spiritu , sale , oleo , & ex terrâ haec excipiente , certo modo unitis.

Hi verô extensâ suâ mole , pondere , motu , vicina comprimunt ; tum quoque vasa calculos complexa motu , & pressu suae substantiae contra duros , asperos , atteruntur , destruuntur ; hinc transitus humorum interceptur , creatur dolor , inflammatio , ulcus , gangraena , callus , & quae ab his pendent , mala.

792. Ova insectorum cum aëre , potu , cibo , corpori ingesta , pituitae intestinali , foccibusve , mista , aut in cavitatibus nidulantia , fotu , quiete , calore , exponunt vermes rotundos , latos , vel Ascarides ; iidem forte quandoque cum iisdem assumtis deglutiuntur , inde crescentes corpori quoque inhaerent.

Illi autem fugendo , movendo , vellicando , rodendo , terebrando , chylum consumendo , nervos irritant , solida vulnerant , nauseas , horrores , cardialgias , vomitus , animi deliquia , maciem , famem caninam , tumorem abdominis , & talia producunt ;

maxi-



maximè flatus, subitosque tumores, creant.

793. Vis externa, aut interna, corporum motorum, laedit partes corporis nostri simplicissimas actione omnibus dictâ mechanicâ, utpote notâ; haec itaque, fatentibus cunctis, nequit referri ad calorem, frigus, humidum, ficcum, principia chemica, acre alcali, vel acidum. Simili autem ratione & alias causas minus visibiles, hinc parum cognititas agere, facilè persuademur, quae deinde morbos partium Similiarium inprimis pariunt.

794. Materia morbi in parte aegrâ haerens, subitò collecta, Fluxio, lentè congesta Collectio, appellatur; pro causâ agnoscit inertiam partis solidae non subigentis, nec expellentis id, quod formari incipit, aut praesentis jam alibi materiae peccantis in partem, quae nunc obsidetur, derivationem.

795. Derivatio haec, fluxio, vel attractio, dicta Veteribus, fit motu, calore, dolore, fotu. atque hinc oriuntur morbi, qui dicuntur cum materie.

796. Venena, pestis, contagia, ingesta quomodocunque (744. 1. 4.), laedunt solida, fluida, vel utraque ita, ut sistatur cursus humorum vitalium; agunt quidem semper vi mechanicâ (793.), sed saepenumero vix explicandâ nisi per principia doctrinae Chemicæ: concipiuntur enim facilè laedere  
foli-

solidas partes nimium dissolvendo, laxando, constringendo, obstruendo; fluida autem depravant nimis inspissando, dissolvendo, acres reddendo; hinc utraque simul corrumpunt unitâ hâc operâ: pleraque ideò velocissima in nervos, pulmones, sanguinem, agunt actione hætenus minus observatâ, ideò habitâ planè insuetâ, & incomprehensibili, unde etiam morbi sic geniti dicebantur Antiquis morbi Totius Substantiae læsæ.

797. Sed & sunt causæ quaedam singulares morborum peculiarium admodum notandæ, quum malæ Conformationi præbeant originem; primariæ habentur, imaginatio Matris, imprudens actio Obstetricis, Nutricis, vel Custodis negligentia, his enim corpusculum tenellum agitaturn, pressum, tractum, pulsum, ligatum, deformatur in faciem vix postea emendabilem. Sed & indoles spissorum & acrium humorum similia multa produciunt.

798. Causæ etiam cavitatis vitiatæ in partibus male dispositis claræ, sive ut internæ, sive ut externæ, spectentur (707. 709.). diaeresios autem origo est ex distensione, acrimoniâ, vi externâ. Hinc & reliqua mala huc relata patefcunt.

799. Fortis pressio; valida distractio; ligamentorum, aut membranarum coërcen-  
tium

tium laxatio, aut dissolutio; producunt luxationes, contorsiones, hernias, procidentias partium.

800. Secantia, pungentia, ictum inferentia, rodentia, adurentia, distendentia, contundentia, rumpentia, sunt causae praecipuae Solutae Unitatis.

### ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

801. **I**d praeternaturale, quod ex morbo, ut causâ, in corpore aegroto fit ita, ut distingui queat tamen ab ipso morbo & ab ejus causâ proximâ, vocatur σύμπτωμα morbi; si autem eâdem ratione ex morbi causâ fluit, dicitur causae σύμπτωμα; at verò, ubi ex alio priore symptomate, ut causâ, prodit, appellatur σύμπτωμα συμπτώματι. Verum id ipsum quod morbo superaccidit ex diversâ à praecedentibus origine potius dicetur επιγνώμα, επιγνωόμενον, συμβεβηκός.

802. Unde efficitur ipsa haec symptomata priora reverâ iterum esse morbos, numero, varietate, effectû, admodum dissimiles; tamen satis commodè ex placitis Veterum revocantur ad Actiones laesas, Retentorum & Excretorum vitia, atque Qualitates corporis mutatas. Horum recensitioni adjunctâ causâ incumbemus.

803, Prima igitur classis horum digeritur juxtâ

juxtâ seriem actionum imminutarum, abolitarum, auctarum, depravatarum; unde primò occurrit enarratio symptomatum appetitus in cibos, potus. Adeòque δυσρεξία, appetitus cibi imminutus; ἀνορεξία idem deletus; ἀποσιτία abhorrens fastidium cibi, hinc vita sine cibis; βέλμιος, ὄρεξις κινώδης, fames aucta, canina, vel bovina; κίσσα, μαλακία, pica, appetitus vix superabilis eorum, quae in nutrimentum commutari queunt, vel eorum, quae neutiquam apta huic operi.

Causae horum symptomatum plerumqueprehenduntur pituita iners, viscida, obruens, bilis absentia, salini suppressio, fibrarum laxitas aut paralytis; sordes à putrido, sanguinis aquosa indoles, obesitas, otium; acrimonia acida, salina, biliosa, atrabilaria, ad stomachum & intestina delata, vermes, fibrarum in iis validum robur, motus assiduus; acer humor praedominans, vix nisi insueto assumpto compescendus, circuitus cruoris mutatus, imaginatio depravata, gravidis inprimis.

804. Potus desiderium inexplebile, sitis nimia, solet oriri à nimia siccitate; à spissitudine humorum immeabilium; à calore nimio; ab acri muriatico, ammoniaco, alcalino, aromatico, oleoso exusto; à venenis.

805. Manducatio laeditur vitio oris, linguae,

guæ, dentium, maxillarum, salivæ, musculorum; quod pendere potest à vulneribus, inflammatione, paralyfi, spafmo, ficitate.

806. Deglutitio læditur quoque vitio oris, linguæ, palati penduli, tonsillarum, uvulae, laryngis, pharyngis, oesophagi, ventriculi superioris; atque illud accidit per vulnera, inflammationem, dolorem, tumorem, spasmus, paralyfin, ficitatem, *χόνδροχυσία*, luxationem partium laryngis, aut vertebrarum colli, absentiam mucii.

807. Actionis stomachicæ læsæ primæ species sunt *ἀνέψια*, *δυανέψια*, *βρεδυανέψια*, *ἀγέσθησις*, quando cibi ventriculo contenti aut non coquantur; aut tardè, & difficulter; aut si in putrem humorem à bono chylo diversum commutantur; causæ sunt eadem fere ac *ἀνορεξία* (803.); maximè defectus, & inertia, salivæ oris, & ventriculi; organa respirationis languida; fordes; vermes; tenacia ingesta; putridorum humorum affluxus. Celerior autem Digestio, coeterum bona, tarò morbus est, aut causâ ejus jam in *βελίμω* explicata (803.).

808. Vitia verò expulsionis ex ventriculo recensentur singultus, nausea, vomitus, cholera, ructus. Quorum primum est, ut videtur, convulsio oesophagi ventriculum &

diaphragma sursum trahens, dum simul diaphragma subitò deorsum convellitur; causa autem ejus deprehenditur celeris deglutitio copiosi ingerendi; copia ingesti; acrimonia ventriculo inhaerens; inflammatio oesophagi, ventriculi, septi transversi; spasmus à nimia evacuatione, vel ab excessu vomitus exercitati; venena acerrima.

809. Nausea, & Vomitus, videntur esse motus spasmodici retrogradi fibrarum muscularium oesophagi, ventriculi, intestinorum; simulque convulsiones validae musculorum abdominalium, & septi transversi; quae leniores Nauseam, violentiores Vomitum, creant. Fiunt autem hae à copiâ nimia, aut acrimoniâ ingesti, à venenis, laesione cerebri vulnerati, contusi, compressi, inflammati; ab inflammatione diaphragmatis, ventriculi, intestinorum, splenis, hepatis, renum, pancreatis; mesenterii; ab irritatione gulae; à motu perturbato spirituum per agitationes infuetas in rhedâ, mari, &c.; ab ideâ rei, quae nauseam, vomitumve, saepe excitavit.

810. Cholera verò, violenta sursum deorsumque expulsio ex ventriculo & intestinis; est convulsio vomitum creans (809.), & simul fortis intestinorum deorsum spasmus; causae itaque eadem, at violentiores et plurimum, maximè ingurgitatio fructuum

horacorum, & fervidum Augusto mense coelum.

811. Est Ructus explosio materiae elasticæ convulsivâ contractione fibrarum oesophagi, ventriculi, intestinorum, compressæ, mox, iisdem resolutis, liberatae; hæc autem fit à cruditate, putredine, acore, fructibus horaeis, musto, liquoribus fermentantibus, venenis, morbis spasmodicis, omni acrimoniâ validâ.

812. At Expulsio & ventriculi, & intestinorum laesa quoque habetur in λειενπεία; quae est cita expulsio per alvum alimentorum, quae ventriculo ingesta, non mutatorum; cujus quidem causa est inertia humorum, ut in αινωρέξια, & ἀπενψία; tum laxitas summa ventriculi & intestinorum; respiratio interim fatis fortis.

813. Si chylus unâ cum foecibus alvinis ejicitur, vocatur Affectio Coeliaca; ubi videntur concurrere pro causâ constituendâ stomachus & humores fatis validi, dum interim intestina nimis laxa, aut oscula vasorum lacteorum quâcunque de causâ obstructa.

814. Diarrhoea est frequens, & copiosa, per alvum egestio excrementorum liquidorum; sive ex cibo, potuve, sive ex humoribus quibuscunque undecunque delatis in intestina, exorta fuerint. Ejus verò causa est vel acre intestina irritans, humores ex-

primens, ex hepaticis, pancreaticis, mesentericis, intestinalibus, vasis, dum simul ora venularum mesentericarum, & lactearum, obstructa; vel laxitas ingens fibrarum intestinalium; denique aliae excretiones impeditae.

815. Dysenteria est diarrhoea cum dolore notabili; cujus materies eadem quae diarrhoeae, sed acrior, & praeterea ergo bilis, feri, cruoris, muci intestinalis, puris, faeciei, bilis atrae, fibrarum, caruncularum, membranarum. Inde & causam habet eandem; at violentiorem, quae saepe acrimonia quaecunque humorum, tum inflammatio, ulcus, gangraena, vel intestinorum, vel partium, suam colluviem in ea deponentium.

816. Ileus vocatur rejectio violenta per os eorum, quae cibi, potus, medicamenti titulo assumpta; aut chyli, bilis, feri stomachici, pancreatici, intestinalis; bilis atrae, muci, puris, ichoris, foecum intestinalium; clysmatum ipsorum. Cujus quidem symptomatis proxima causa semper videtur motus inversus fibrarum intestinorum, ventriculi, oesophagi, accedente simul, causa quacunque (809. 810.), vomitu; remotior vero est inflammatio, volvulus, apostema, scirrhus, cancer, foex dura, calculus, hernia, convulsio, intestinorum. Ex his retentio  
foecis



foecis durioris in origine , causâ , naturâ , effectis , intelligitur.

817. Si autem generatio , & excretio in intestina , Bilis laeditur , symptomata inprimis oriuntur haec ; icterus ; cachexia biliosa ; calculus , gypsus , hepatis ; obstructions ; excrementa alvi alba , dura , sicca ; appetitus deletus ; ciborum digestio impedita ; miscela impedita partium assumptarum ; Tympanitis ; hydrops : pro causâ agnoscit plerumque hepatis inflammationem , exsiccationem , obstructionem ; humorumve ejus , & abdominalium viscerum , inspissationem quamcunque.

818. Si autem lymphâ pancreatis , hepatis , intestinorum , laeditur in suâ confectione , vel motu , oriuntur symptomata quàm simillima recensitis ( 817. ) ; quin & causae erunt similes.

819. Sanguinis in Corde mutatio , ejus est modò receptio , mora , expulsio ; quae si nimiae quoad motum , faciunt febres continuas , ardentes , validas ; sin verò remora longior , vel expulsio languidior , tum fiunt languores , concretiones polyposae , vel puitosae , frigus , leucophlegmatia , hydrops , atque plurimi diversi alii hinc oriundi morbi.

820. Actio laesa pulmonum tam respiratoria , quam transmissoria cruoris , consistit inprimis in augmento vel decremento efficaciae

ciae ejus in sanguinem; à priori videtur origi ἀρχαίσις φλογιστική, à posteriori αἱματοποιήσις ὁ impedimentum, & nutritionis, unde καχεξία, ἀτροφία, φθίσις, & infinita mala; causa autem illius actionis laesae est omnis labes organorum multiplicium, quae respirationi exercendae serviunt.

821. Secretionis Urinae laesae symptomata praecipuè sunt 1. *ιχθεία*, nempe integra retentio urinae nullo modo excretæ; cujus causae primariae, plethora, inflammatio renum, ureterum, vesicae, colli vesicae, urethrae; earundem partium spasmus, pressio; tum & obstructio à lapide, pituitâ, pure, thrombo, carunculâ, apostemate, tumore.

822. 2. est *δυσχεία*, nimirum urinae excretio cum molestiâ, conatu, aut dolore; cujus species *στυγχεύα* dicta, ubi habetur stilletum cum sensu ardoris emissum lotium; causa utriusque mali multiplex; nempe acrimonia inprimis recentis, fermentantis, cerevisiae, vini, aut foecum utriusque; acrimonia acida, falsa, alcalica, oleosa, aromatica, biliosa, humorum; excoriatio partium vesicae aut urethrae ab inflammatione, ulcere quocunque, atterente calculo, causticis maximè infectis assumptis; calculus occludens, tumorve, in vesicae collo, ejusve urethrâ.

823. 3. Censetur urinae Incontinentia, quando sine voluntatis, respirationisve, nixu, sponte effluit; oritur ut plurimum à resolutis, dilatatis, discissis, suppurando consumtis, gangraenâ putrefactis, fibris sphincteris vesicae.

824. 4. Denique est *Albuginis*, quae est urinae chylosae, vel lacteae, frequens, & copiosa trajectio; causa ejus censetur nimia laxitas fibrarum in arterioliis urinosis, concurrens simul cum humoribus valde dilutis, quae utraque ab aquosis.

825. Actio autem Vitalis laesa spectat maximè pro symptomatibus pulsuum cordis, respirationis exercitationem, vel utraque simul.

826. Ita quidem, ut ergo 1. primò numeretur Palpitatio cordis, quae dicitur violenta ejus contractio unâ cum magnâ resistantiâ cruoris à corde pulsî; causa ejus plerumque est inordinatus, & violentus, spirituum vitalium in cordis villos impetus, ut in summis animi affectibus, subito terrore, affectu hysterico, motu violento & subitaneo, evigilatione praecipiti; aliquando est irritatio fibrarum cordis ab acri quodam stimulo facta, ut in cacochymicâ materîe motâ, inflammatione cordis, pericardii, hisve male affectis à calculo, vermibus, pilis, aneurismate; deinde à cruore spisso, poly-

poso, copiosiore; tandem ab arteriis cartilagineis, ossificis, factis, aut his ad extrema obstructis.

827. 2. Pulsus arteriarum intermittens contingit aut vitio liquidi cerebellosi inaequaliter influentis in cor; aut vitio vasis transmittentis sanguinem & humores; vel denique peccante humore illo, qui fluit per vasa; causa proinde hujus mali varia, ut convulsio, polypus, cacochymia pituitosa, inflammatio arteriosa, pulmonica, cardiaca, cruor deficiens, arteriae ossae, cartilagineae, aneurismaticae, calculo infarctae, cor male affectum vario modo.

828. 3. Pulsus crebrior oritur semper à celeriore contractione systolicâ cordis; haec autem à frequentiore influxu spirituum cerebelli, & difficiliore progressu liquoris expellendi; quò faciunt acre, & obstructum.

829. 4. Pulsus imminutio, vel deletio; quae reducitur ad *λειποθυμίαν*, ubi eò usque deficit, ut vires multum debilitatae corpus vix sustineant; *λειπψυχίαν*, quandò haec eò usque increscit, ut & naturalis calor multum labefactari incipiat; *συσκοπίω* ubi cor eò usque deficit, ut calor, motus, sensus, fere deleantur, sudoresque frigidi exprimantur; *ρίσθυξίαν* ubi omnia illa quoad sensum deleta mortis imaginem simulant; Causae horum symptomatum variae, varioque gradu

du constantes, similes fere iis, quae (827.), imprimis ideae rei horridae, graviditas, animi affectus, spasmi, inanitiones quaelibet, maximè sanguinis in vulneratis, parturientibus, abortientibus, cancrofis.

830. Respiratio verò laesa symptomata primaria numerat 1. ἀπνοίαν, ubi integrè definit; & agnoscit pro causa fere quae in pulsu imminuto recensita (829.); tum còspectat aër vitiosus (746. ad 754.); venenati vapores, causticique acidi, vel austeri; paralysis, vel spasmus organorum respirationi famulantium (602. ad 625.); ut & alii morbi, qui harum partium functionem omninò destruunt.

831. 2. Δυσπνοίαν, in quâ cum molestiâ, dolore, fatigatione, respiratio contingit; haec quidem habet easdem, ac prior, causas (830.), sed leviores, quò & mala facit prae coeteris pectoris conformatio.

832. 3. Ἀσθμα, quae est frequens, molesta, sibilosa, respiratio; plerumque orta à causis dyspnoeae pertinacioribus; sed maximè, ut videtur, à constrictione spasmodicâ fibrarum muscularium in pulmone.

833. 4. Ὁρθοπνοίαν, quae anhelosa, difficilis, stertens, solâ erectâ cervicè & thorace absolvenda, respiratio; causae iterum eadem (830. 831. 832.), sed vario insultu agentes, recedentesque.

834. 5. Catarrhum suffocantem ; qui videtur esse subita occidens ἀπνοία ; habet & hic causas easdem (833.) ; maximè observantur frequentes , materiae eliquatae in fauces & pulmones subita destillatio ; nervorum summa vitia ut in hystericis ; polypus cordis major subitò in pulmones trusus.

835. Verum omnia haec symptomata (830. ad 835.) solent produci à causis quibusdam notabilibus per incisa cadavera , vel excreationem materiae , manifestatis ; quae sunt primariò Thoracis repletio per extravasatam lympham , pus , sanguinem ; etiam inflammatio laryngis , asperae arteriae , bronchiorum , pulmonum , pleurae , mediastini , diaphragmatis , pericardii , musculorum thoracis respirationi servientium , ut & abdominalium ; ut & materies diversa , polyposa , gypsea , pituitosa , calcea , calculosa , purulenta ; tum quoque tumor circà laryngem , in eâ , ut & in pulmonibus , vel thorace , inflammatorius , suppuratorius , scirrhusus , cancrusus ; tandem & lata accretio pulmonum cum pleurâ.

836. Visus laesi symptomata numerosa recensione causarum juxtâ diversitatem locorum optimè distinguuntur , primò enim partes coërcentes bulbum oculi male afficiunt premendo , protrudendo , extrudendo , erodendo , per tumores inflammatos ,  
aposte-

apostemata, scirrhos, cancrös, exostoses, caries ossium orbitam constituentium; inde enim figura, humores, circuitus, visus axis, collectio radiorum in debito loco, depravantur.

837. Deinde etiam palpebrae inflammatae, suppuratae, inflatae, conglutinatae, concretae, grandinosae, visum mirè turbant variis quidem de causis, sed maximè frequenter per glandulas sebaceas male affectas; etenim omnibus oculi sordescunt, similia pati incipiunt, aciem amittunt, humores pervertunt.

838. Quin etiam peccato lachrymarum abundantium, exacerbescentium, spissescen-  
tium, ad limbos palpebrae utriusque natantium guttatim, inde in genas ex oculis destillantium; fiunt hic humiditates turbantes aciem, erosiones inflammatoriae, obfuscationes, fistulae lachrymales; contingent illa vitio laxitatis nimiae in glandulâ lachry-  
mali, aut acrimoniâ & motu nimio materiae lachrymosae, tum malâ forte figurâ tarsorum palpebraliū, aut malo habitu carunculae angularis, vel malâ, variâque, dispositione osculorum palpebraliū absorbentium lachrymas, fistularumque has deducen-  
tium in saccum lachrymale; iterum hujus quocunque recessu à statu naturali, & canalis nasalis, vel membranae nares intus  
suc-

succingentis illo peccato , quò exitum per hunc canalem in cava narium impedit; sunt autem omnes causae , quae priores enarratas creant, quam plurimae.

839. Deinde verò depravatur , impeditur , aboletur , Visio, tunicae Corneae atque Adnatae obscuracione, dealbatione, incrassatione, oedemate, phlyctænâ, inflammatione, ungue, sarcosi, perlâ, cicatrice, panniculo, albugine, cartilagine; quae etiam ex causis variis, diversisque, accidere solent.

840. Quando etiam humor Aqueus deficit, fit oculi marcor, corneae corrugatio; si abundat, nascitur oculus elephantinus; si stagnat non renovatus, putrescendo totam fabricam oculi pessundat; si colorem accipit, spissaturve sive in muci, sive in pituitosi, indolem, hinc suffusiones, cataractae; oculorum color alienus; haec plerumque inter interiora uveae & inter lentem crystallinam; estque causa fere inflammatio, caco-chymia, aut nimis coagulantium imprudens applicatio.

841. Si Uvea inflammatur oritur ophthalmia maximè dolens, brevi perniciosissima visui; si suppuratur, perditur acies & visus; si immobilis fit, simulque contracta, oritur *ημεογλωπία*, quae & contingit, ubi cataracta minor, ad margines tenuior, in medio spissior,



fior, adest; si autem immobilis, & simul valde aperta, tum *νοκταλωπία* oriri videtur.

842. Verum etiam fit, ut Lens CrySTALLINA opaca, inflammata, suppurata, hydropica, corrupta, atrophica, facta producat glaucoma, cataractam, visum hebetem, coecitatem opacam, *ἀμελυνωπία*: si verò eadem laeditur in suâ figurâ, mole, spissitudine, tenuitate, creabit multa, varia, & saepe mirabilia, mala, visui accidentia.

843. Imò & figura nimis sphaerica prominentis bulbi, quin etiam parvitas pupillae, & multae conditiones minus clarè hæctenus perspectae in longitudine oculi, in ipsâ lente, ejusque situ, poterunt *μυωπία* variam efficere; ut contrâ in planiore oculo, aut longiore, tum & ex variâ indole lentis, ejusque situ, *πρεσβυωπία* nasci poterit.

844. Sed Vitreus humor iisdem vitiis jam enarratis (840. 842.) obnoxius mala satis similia pati, & producere poterit.

845. Membranæ Retinae varia vasa multa pati, diversa efficere, queunt; etenim eorum hydrops, oedema, phlyctæna, inflammatio, compressio; ut & nervi optici ipsius, atque membranarum eum involventium, similes morbi; tum tumor, steatoma, abscessus, hydatis, lapis, inflammatio, extenuatio, exesio, corruptio, obstructio, cerebro

rebro accidens ita , ut libera communicatio inter nervum opticum ejusque originem in parte medulloſâ cerebri impediatur, vel omnino aboleatur ; omnia hæc vario modo efficient imagines, floccos, ſcintillas, ἀπαιρῶν, dictam Guttam Serenam.

846. Et paralyſis vel ſpasmus muſculorum , qui oculum agitant , horum diſtractiones variae ortae ex offiſibus orbitae male affectis , tum etiam vulnera , ulcера , inflammatio, preſſio, poſſunt facere πινωπλίαν, ſtrabiſmum, luſcitatem, adſpectum truceſcem, & talia mirabilia mala.

847. Tunica tandem Choroeides, Ruyſchiana, Uvea, vaſis ſanguiferis abundantiffimae, inflammationi, & ſuppurationi obnoxiae, valent ἀπώπνον tandem producere; quin & à variis admodum diverſarum in oculo partium morbis alucinatio, fallacia, confuſio, hebetudo, coecitas, produci poterit frequentiffimè.

848. Auditus læſi primaria ſymptomata quidem numerantur, ejus augmentum, imminutio, ablatio, depravatio.

849. In acutiſſimis cerebri, nervorum, membranarum, morbis, his ut videtur nimium tenſis, ſaepe oritur intolerabilis fere ἐξυπνοία minimo ſono validiſſimè afficiente cerebrum, atque excitante aliquandò convulſivos motus.

850. Βαρυγία dicitur, vel gravis Auditus, quando perceptio soni minor est quam ejus magnitudo in sanitate requireret; oritur autem ex plurimis sanè, iisque diversissimis profectò, causis, commodissimè juxta varia loca affecta enarrandis, sunt enim auris externa nimis plana, vel ablata; meatus auditorius nimis rectus, angustus, obstructus à tumore quocunque, ab insectis, pure, sordibus, cerumine concreto; membrana tympani lassa, laxa, spissa, callosa, crustâ adhaerescente fungosâ spongiosa & crassa reddita; concha interna impleta ichore, pure, pituitâ, tumoribus membranae eam undique investientis, pulvere illapso post ruptam membranam tympani, canalis Eustachianus impeditus, obstructusve; ossicula à nexu suo soluta, atque per meatum saepe rejecta, suppuratâ membranulâ colligante, ut post diros dolores inflammatorios auris internae saepe contingit, aut ossicula absentia per malam conformationem; exsiccatio, laxatio, spissatio, inundatio, nimia tensio, corruptio, exesio, induratio, membranulae fenestrae rotundae, atque ovalis; vestibuli, labyrinthi, cochleae, meatuum ossis petrosi, vitia admodum varia, inflammatoria, obstructoria, paralytica, & quae ex his, ut causis, iterum nasci poterunt, tum horum mala structura auditui contraria; tandem  
omni

omni impedimento, quo nervus mollis auditorius a suo ingressu in os petrosum, usque ad medullam oblongatam, vel hinc usque ad originem in medullâ cerebri, mediâ viâ impeditur, ut sunt inflammationes, tumores, exostoses, cerebri laesa functio, & plurima praeterea mala: unde perspicitur ratio difficilioris curationis horum.

851. Etiam vitio æeris externi, maximè humidi, & nebulosi; aut interni non potentis libere ingredi, exire, accidit depravatio Auditus; tum inprimis hîc nocent morbi illarum arteriolarum, quae ornant membranas in toto organo auditus ubique dispersas; inde enim facilis intellectus, tinnitus, bombi, echûs, susurri.

852. Si tandem omnia haec vitia enarrata (849. 850. 851.) validissimè increscunt, diu admodum persistunt, tum oritur κώφωσις vel perfecta sùrditas, hincque loquelae ignorantia, vel oblivio; cujus causa saepe concretio tubae Eustachianae saepenumero in lue gallicâ exesis faucibus, deinde cruditate labiorum unitâ concretis.

853. Olfactus etiam minuitur, aut tollitur; 1. defectu, aut soliditate, quatuor officulorum spongiosorum, vel cavernarum in osse frontis, maxillae superioris, & cuneiformi osse. 2. membranae olfactoriae siccitate, humiditate, inflammatione, suppuratione,

tione, gangraenâ. 3. compressis olfactoriis nervis per tumores quoscunque hîc enatos, exostoses, polyposque. 4. à vitiis in cerebro ad originem horum nervorum, ut ante jam dictum in aliis Sensibus; depravatur etiam à foetore materiae cujuscunque in locis his cavernosis stabulante, atque assiduò exhalante.

854. Gustus quoque minuitur, tollitur; depravatur; priora bina contingunt, si papillae gustantes linguae obducuntur crustâ, sordibus, muco, aphthis, pelliculis, pustulis, verrucis, inflammatione, exsiccatione, laesione accedente saepe simul nervorum quinti & noni paris. Depravatur verò vitio humoris praedominantis, inprimis id saepe haeret in salivâ ori infusâ, quae sapore peccans multa hîc producit effecta saporis biliosi, alcalini, acidi, salini, aeruginosi, oleosi, saccharini, cadaverosi, haud aliter, ac si res assumptae repraesentato hoc sapore donarentur.

855. Tactus laedi solet primò in stupore vix sentiente, vel admodum obtusè, & quasi per interpositum medium; quod contingit prae frigore nimio extremi organi, vel nervi, aut cerebri, vitio, ut & ab interposito cujusdam sensui ineptae materiae; deinde in nimis acutâ sensilitate, vitio nervum non satis tegentis cuticulae, ejusve

forte nimia tensione & teneritudine simul; etiam in abolita planè Tangendi facultate ab omni causâ, quae nervos, cerebrum, aut utraque, inepta reddit colendo huic muneri, ut profectò Apoplexiae & Paralyfios historia satis docet.

856. Pervigilium oritur 1. à nimia determinatione liquidi nervosi ad organa Sensuum. 2. à nimio ejus raptu versus cerebrum, obstructis inferioribus à frigore, aliâve causâ, ut in hypochondriacis, melancholicis, maniacis, inferius frigentibus. 3. ab irritante quocunque, & ubicunque posito, quod organa Sensuum, maximè cerebri, vellicat. 4. à nimio motu humorum, cerebri meatibus adhucdum apertis. 5. à morbis, in quibus illa praememorata praedominantur, ut à febris, phrenitide, melancholiâ, doloribus, suppurationibus, & similibus malis.

857. Sed nimia Somnolentia oriri solet ab omni causâ, quae impedit liberum fluxum, & refluxum, spirituum bonorum, & satis copiosorum, à medullâ cerebri per nervos ad organa Sensuum, & muscutorum voluntati servientium, iterumque ab his ad originem horum nervorum in medullâ cerebri; est quidem haec causâ multiplex admodum, tamen referenda facilè ad plethoram, obstructionem, humorum effusionem, vasorum

rum compressionem, inflammationem, sup-  
purationem, gangraenam, inertiam, col-  
lapsum ab inanitione, usum opii & narcoti-  
corum, aromatum, spirituosorum ferment-  
atorum, naribus nimis applicatorum, vel  
corpori ingestorum, cibos duros, pingues,  
copiosos, diuque in stomacho haerentes, ma-  
gnâ nimis copiâ ingestos.

858. *Κῶμα ἀρεπνῶδες*, insuperabilis pro-  
clivitas in Somnum cum perpetuâ à terribili  
insomnio excitatione, agnoscit causas (857.)  
similes prioribus, accedente interim magnâ  
stimulatione ab ingenti plerumque inflam-  
matione concurrente. *Κῶμα ὑπνῶδες* assidua  
dormitio cum assiduo in eam post excitatio-  
nem relapsu, causas habet plurimas fere eas-  
dem, & majores jam explicatis (857.). *Κά-  
ρῳ*, profundissimus somnus, cum repentinâ  
sensuum, motuumque, abolitione, unâ  
cum febre acutâ, & difficili admodum exci-  
tatione, est Apoplexiae calidae genus levius.  
*Ἀήτωρ ῳ*, profunda, tranquilla, obliuiosa,  
somnia, ex lentâ, frigidâque, causâ  
coeterum simili multis causis (857.) dictis,  
atque saepe ex concursu variarum talium or-  
tâ. *Καταφορεῖ* ab antecedentibus vix differt.

859. *Ἀνασθησις*, facultas ablata perci-  
piendi actiones objectorum sensibilibum in or-  
gana Sensuum externorum; tum & variî  
gradus illius, stupor, hebetudo, confusio;

Memoria minor, major, abolita, confusa; Judicii facultas vacillans, deleta, confusa; Ratiocinandi facultas vacillans, deleta, turbata; delirium, stultitia, furor, mania, imaginatio depravata; omnesque morbi huc referri soliti; pendent quidem ex multis, atque diversis planè causis, ita tamen, ut commodè peti queant ex his, quae ordine explicatae jam sunt (826. usque ad 859.); in quibus tamen aetas; affectus; rigiditas, laxitas, concretio, deletio, solidorum; inspissatio, acrimonia, inertia, fluidorum; ut principes inter coeteras deprehenduntur.

860. Ἀπὸ πλῆξις, ablatio subita, integra, Sensuum externorum, internorum, motuumque voluntariorum omnium, respiratione & pulsu perdurantibus, saepeque auctis, superstitibusque functionibus, quae à prioribus immediatè pendent; causam habet in cerebro id omne, quod impedit fluxum spirituum ab origine medullae cerebri per nervos cerebri; haec est multiplex, & referenda appositè satis ad omnes eas, quae comprimunt cerebrum externè, internève, revocandas ad quinque classes primarias, quae 1. fracturae, impressiones, exostoses, tumores, compressiones, cranii, imprimis in juventute, & pueritiâ, adhuc teneri. 2. humores cruenti, serosi, purulenti, pituitosi, saniosi, stagnantes, effusi, iis locis, ubi pos-



possunt comprimere, vel erodere cerebrum, ejusque membranas, ut inter cranium & meningas, inter has & cerebrum, in ventriculis cerebri, ad medullam oblongatam, ad medullam spinalem. 3. Tumores inflammatorii, aquosi, serosi, purulenti, mucosi, sebacei, scirrhusi, lapidosi, iisdem in locis, & eodem effectu compressionis enati. 4. Impedimenta fluxus sanguinis appellendi, perfluxuri, ad cerebrum, vitio praecipuè vasorum vulneratorum, compressorum, obstructorum vitio polyposi spissamenti, sideratorum. 5. Impedimenta similia nata in venu-  
lis, sinibus, venis, in quae redit à cerebro humor sanguineus; nascuntur autem haec impedimenta quam maximè à compressione venarum.

\* 861. Παρέλυσις, immobilitas musculorum flaccidorum; causa impeditus influxus spirituum in villos musculorum, vel cruoris arteriosi in ejus vasa; contingit vitio cerebri, nervi, musculi ipsius, vel ejus arteriarum.

Παρεπληγία, immobilitas omnium musculorum sub capite, qui habent nervos à cerebro & cerebello sub cranio egressos; causa ideò plerumque haeret ad ventriculum quartum cerebri, vel ad initia spinalis medullae.

Ημιπληγία, idem morbus, sed modò ad unum latus totius corporis; hinc causa eadem,

dem, sed uni modô lateri cerebri, aut medullae spinalis, applicata.

Παρελύσις partis singularis & hinc clarè cognoscitur. Atque intelligitur, cur in apoplexiâ simul adsit paraplegia, aut saltem hemiplegia valida? item cur ablatae apoplexiae alterutra harum fere ubique succedat, diuque restet?

862. Επληψία, Morbus Caducus, est subita, integraque, abolitio Sensuum exteriorum, interiorum, motuumque voluntariorum cum reciprocis violentis convulsionibus, & resolutione: unde videtur hîc concurrere causa duplex, & quasi opposita, partim apoplexiae, partim pervigilii, aut comatis vigilis (856. 858. 860.), vicissim agentes, nec adeô fortes, nec tamdiu durantes, ut ibi.

863. Δῖν, Vertigo, apparens rotatio objectorum, atque membrorum vacillatio; causae ut apoplexiae, sed leviores.

864. Σπασμός, Convulsio, est invita, violenta, contractio musculi, cum attractâ simul parte musculo appensâ; causa, liquidum nervosum fortiter & diu in musculum influens, cujus causae infinitae, in sanguine, arteriis, meningibus, cerebro, nervis, musculis, cranio.

Τέταν, rigidity, convulsio invita, violenta, musculorum parti flectendae & exten-

tendendae propriorum simultanea; quae hinc vel universalis omnium simul, vel singularis unius cujusdam membri.

Εμπροσθεν ⑤ est spasmus musculorum, caput, collum, thoracem, lumbos, ad anteriora flectentium.

Ὁπισθεν ⑤, est spasmus musculorum caput, cervicem, dorsum, retrò flectentium: & liquet facilè attendenti, quod posteriorum causa una & eadem ut spasmus, sed magis universalis, & fere semper subtilis, acerrima, venenata.

865. Hinc bene patet, cur vertigo, convulsio, imprimis universalis, morbus caducus, resolutio, imprimis si majores, pertinaces, & ex interiori causa, fere semper tandem in apoplexiam transeant.

866. Excretorum, & retentorum vitia jam exposita in causis morborum praemissis (772. ad 779.), unde petenda tam haec, quam eorum causa: vermes, calculi, & similia insolita huc possunt referri.

867. Qualitas corporis vitiata dicitur, quae dispositionem in sensus incurrentem laedit; consideratur verò hic quammaximè quoad colorem, odoremque.

868. Cutis, cuticulae, tunicae oculi adnatae, tunicae corneae, labiorum, oris, linguae, faucium, carunculae oculi, color

pallidus , flavus , viridis , lividus , ruber , ater , pendet à similibus corporibus per pellucida vascula translucentibus ; & prout variâ serie se mutuô exceperint , etiam varias causas agnoscunt ; ut in phlogosi , gangraenâ , sphacelo , &c. patet.

869. Ossium pallor , rubedo , flavedo , fuscus aut ater color , à contusione , inflammatione , abscessibus , medullâ morbosâ , ablatione periostei , carie , spinâ ventosâ.

870. Foetor autem oritur ab humoribus stagnantibus , effusis , corruptis , vel venenatis ; ut & ab omni causâ , quae olea & sales nimium attenuat , & volatilia reddit , ut est inedia , calor , motus nimius , acrimonia nimia assumti.

## Σ Η Μ Ε Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ

## GENERALIA.

871. **Q**Uum Morbus sit effectus à suâ causâ pendens , ens est singulari , ab omni alio distinctum , ideôque in suâ propriâ singulari naturâ accuratè cognoscendum , ut curari queat. Quod idem de Sanitate , ejusque statu vario sentiendum erit.

872. Natura autem praesens vel Sanitatis , vel defectus ejus , Morbi , rarô per se apparet sensibus , hinc nec per se tam conspicuè , ubi praesentes in corpore sunt , possunt cognosci :

gnosci : quin imò utriusque ratio saepe latet.

873. Sed ex praesentiâ utriusque fiunt quaedam effecta pendentia à functionum salubrium exercitatione , vel à laesione earundem ; haec quidem distincta sunt ab illis causis , sed tamen ita ab iis pendent , ut earum indolem manifestent , & quum sensuum acie observari possint , magnam his indagandis lucem affundunt.

874. Praetereâ verò notitia applicationis causae notae ad corporis partem quamcunque prius cognitam in Physiologiâ docet naturam effectus , qui inde sequetur ; sive ille salutaris , sive perniciosus , futurus sit. Nec multum refert , an causa haec corpori externa , interna , naturalis , accidens , salutifera , morbosa , vel lethalis , sit.

875. Porro haec memorata effecta (873.) , atque hae dictae causae (874.) , quatenus sensibilia habentur ipsa , vel inde quam proximè deducta , vocantur *φαινόμενα* : haec autem solent appellari Signa , quando ex iis sensu notis , lege justae ratiocinii demonstratur praesentia , natura , status , eventus , tam Sanitatis , quam Morbi , & Mortis.

876. Quae vocantur *Ἀγγωναστικά* , vel *δηλωτικά* , quando denunciant praesentem conditionem corporis vivi , sani , aegri , morituri , moribundi ; si verò praenunciant ea ,

quae in his futura sunt, tum *προγνωστικὰ* appellantur; ubi tandem praegressa in cognitionem revocant, tum *ἀναμνηστικὰ* dicuntur Medicis.

877. In morbis autem designandis id Signum, quod proprium est morbo, & ab eo inseparabile, utpote ex naturâ ejus ortum, vocatur *παθγνωμικόν*.

878. Cujus proinde cognitio est necessaria quam maximè, utilissima, indagatu saepe difficillima, semper tamen praesens morbo, quamdiu genium servat; quin & frequenter constat aggregato plurium concurrentium signorum.

879. Illa autem Signa, quae docent mutationem, variatasque conditiones, morbi, nomine dicuntur *διαγνωστικά*.

880. Quorum tanta est vis ad bene cognoscendum, & curandum, ut vix aliud sit, quod plus emolumenti in praxi afferat: unde etiam summa nocumenta oriuntur his neglectis.

881. Quum verò omnia illa sint effectus producti à causâ morbi, morbo, & symptomatibus assiduò mutatis, notant ergò in morbis quolibet tempore conditionem praesentem ejus materiae, quae primò produxerat malum, vel & ejus, quae à malo producta fuerat: quare & solent revocari ad has tres classes, quae sunt:

1. Cruditatis, coctionis.
2. Exitus in sanitatem, morbum, mortem.
3. Secretionis, & excretionis, materiae coctae, quae idcô vocantur Decretoria, vel *χελικά*.

## SIGNA GENERALIA SANITATIS OPTIMAE.

882. **H**Aec quidem peti debent ex actionibus corporis (695.) exercitatis facile, commodè, laetè, constantissimè.

883. Quarum quatuor conditionum tres priores facile cernuntur, quarta difficilior: etenim tantum cognoscitur maxima constantia per ea signa, quae indicant futuram esse in eo corpore magnam longaevitatem; & hinc eadem quoque praenunciant plerumque sanitatem firmam.

884. Signa autem illa longaevitatis omnia sunt effectus ejus indolis totius machinae quoad solida & fluida, unde inprimis pendet durabilitas ejus quoad totam compagem; haec verò est reductio assumptorum in naturam similem illis, quae jam constituunt machinam sanam.

885. Operosae observationis beneficio Signa haec possunt referri in Europâ ad has classes.

1. A Generatione. Conceptus ex parentibus sanis ; vegetis ; plenae aetatis ; rarâ , sed fervidâ , venere utentibus , matutino tempore post perfectam à somno coctionem , tempestate vernâ , inprimis & salubri.

2. A Gestatione in utero. Mater praegnans bene sana ; corpus satis exercens fortiter ; mentem tranquillam habens ; & unum modô foetum simul utero alens ex alimento salubri.

3. A Nativitate. Partus post novem integros menses omninô absolutos à primo conceptu , maximè si illè incidit in mensem decembrem , januarium , vel februarium.

4. A Modo, quo corpus crescit. Lentum , & maximè aequabile , incrementum molis & virium usque ad vigesimum quintum , & ultrâ , annum aetatis.

5. Ab Habitu corporis. Thorax latus , amplus ; abdomen gracile & compressum , humeri , brachia ; foemora , crura , firma , torosa , carnosa , hirsuta , densis , setosisque , pilis hirta ; cranium magnum , & capax , maximè ad occiput , non à parte faciei apparente , sed fallaci specie , magno capite ; cutis dura ; caro multa ; adeps parcior.

6. Ab Humoribus. Sanguis floridus quidem , at crassior , qui extravasatus concrevit citô , & satis validè , in molem tenacem ; reliqui humores , copiosi , tenaces , modi-



modicè calidi, minus oleosi, blandi.

7. Ab Actionibus. Respiratio lenta, magna, plena, facilis, aequabilis, cum minimâ apparente mutatione organorum pneumaticorum; pulsus arteriarum lentus, magnus, plenus, aequabilis, fortis, constans, nec per causas leviores faciliè mutabilis; alvus tardior, & sine incommodo sicca; urina parcior & coëta; fudor rarus; somnus profundus, aequalis, reficiens; voracitas cum digestionè facili; tolerantia laborum; tarditas tam ingenii, quam motuum animi & corporis; constantia ad mutationes accidentales.

886. Quod verò corporis fabrica apta sit exercere suas actiones faciliè, commodè, laetè, deprehenditur 1. ipso sensuum experimento. 2. si signa adsunt modò exposita (885.). 3. si partes solidae deprehenduntur esse validae, tenaces, elasticae, quoad materiem; si sunt praeditae eâ mole, formâ, superficie; si sunt connexae eo modo, situ, proportionè; unde motus tam proprii, quam communes, tam in solidis, quam in fluidis, facillimi, expeditissimi fiant. 4. si ea sit natura humorum, quae motus intestinos, circulatorios, secretorios, nutrientes, excretorios, efficit sine inaequabilitate, & absque effectis hujus. Et quidem signum evidentissimum quod docet hanc aequabilitatem.

## 350 SIGNA SANITATIS SINGULARIS.

tem adesse, est absentia pulsationum, tumorum, dolorum, calorum, immobilitatis; insensibilitatis, in variis partibus variorum. 5. si ea est ratio unionis inter mentem & corpus, unde moderati quidem, non verò vehementissimi, fiant affectus animi. 6. si color est roseus & candidus, vel laetè nigrescens; calor moderatus; ad sensum levitas. 7. maxima vis resistendi omnibus morborum causis.

887. Sed maxima potentia superandi causam singularem hujus illiusve morbi, si venenatam, si contagiosam; non notat semper sanitatem perfectissimam; & contrà: ut certè in morbis contagiosis, & in venenis, clarè patescit.

## SANITATIS SINGULARIS SIGNA.

888. **V**isceris cujusque optima conditio singularis cognoscitur, si actio ejus prompta, laeta, constanter, in suis effectis deprehenditur; quae quum in Physiologiâ quam uberrimè explicata habeantur, facilimè huc verâ cum ratione referri poterunt.

889. Sed Sanitas est conditio haerens in totâ compage simul totius corporis, constantis ex solidis & ex fluidis; haec ergo uni-

unicuique homini privata sua est ; ideôque tantum ratione sui singularis corporis talis est ; unde igitur diversa corpora , quae summoperè differunt tam in solidis , quam in fluidis , tamen singula sana esse poterunt ; hanc vocavere veteres *ιδιοσυγκροσίαν* , vel Sanitatem Temperiei ; quae proinde difficulter ad singularia capita determinari potest ; sed tamen proposita antiquis divisio in temperiem calidam , frigidam , humidam , siccam , biliosam , sanguineam , phlegmaticam , atrabiliariam , aliquem in Medicinâ usum habet.

890. Calidi temperamenti signa describuntur esse pili flavi , crassi , copiosi , toto corpore ; color oculorum in albâ parte rubescens , in carunculis lachrymalibus , facie , labiis , ore , valde ruber ; corpus gracile , agile , robustum , calidum ; pulsus major , crebrior ; iracundia , sed brevi furore detonans. His videntur esse vasa robusta , contracta , viscera valida , humores valde moti , densi , & acres ; quibus humectantia , diluentia , temperata , profunt ; calefacientia quaecunque quam maximè nocent.

891. Temperamenti frigidi signa omnia contraria enarrantur esse glabrities , pili tennes ; color pallescens ; corpus crassius , tardius , debile , frigidum , facilè tumens ; pulsus minor , tardior ; *ἀναισθησία* , metus. His humores blandi , aquosi , pituitosi , tardi ; soli.

solida laxa, flaccida. Profunt roborantia, calefacientia; nocent, frigida, humida, laxantia.

892. Siccum autem temperamentum spectatur fere signis calidi (890.), si simul adest macies; vasa hic contracta, humida pauca, & fere acriora. Nocent & juvant ut in calido. Humidum autem facile convenit frigido, si tumor accedit (891.), unde reliqua eadem.

893. Biliosa temperies cognosci describitur à pilis copiosis, nigris, crispis; duriæ; macilentia, gracilitate carnis; colore fusco; venis magnis; pulsu magno, celeri; pertinaciâ; iracundiâ. His videtur major solidi quam humidi copia excedere; siccis conveniunt (892.), & calidis (890.). calida, sicca, his nocent; humectantia, refrigerantia, profunt.

894. Sed Sanguineum temperamentum distinguitur pilis rarioribus, flavo-albis, fuscis; carne molli, copiosa; venis amplis caeruleis, sanguine distentis; colore roseo; iracundiâ; flexili mobilitate. Profunt his evacuantia, & temperantia; nocent calefacientia, & stimulantia valida.

895. Phlegmaticum quoque depingitur glabritie cutis majore; pilis albis, tenuibus, tardè crescentibus; albedine, tumore, molliæ, pinguedine, corporis; venis angustis, laten-

latentibus ; his videntur vasa sanguinea angusta , lateralia verò latiora , conveniunt frigidis (891.) ; unde & his humida , atque frigida , maximè obsunt ; juvat quidquid calefacit , roborat , ficit.

896. Melancholicae denique temperièi indicantia habentur glabrities ; pili nigerri-  
mi ; macilentia ingens ; ficcitas magna ; co-  
lor ubique maximè niger , qui in tali natione  
cernitur ; cunctatio ; constantia ; ira memor ;  
magna penetratio intelligentiae. Quare his  
vasa videntur stricta , robusta , macria ; hu-  
mores densi , tenaces , admodum permisti ,  
nec facilè separabiles , aut mutabiles. No-  
cent his quam maximè calida , sicca , acria ;  
juvantur autem omni humectante , refrige-  
rante , laxante , emolliente , leniter , sine  
acri , dissolvente.

897. Porro maxima hinc utilitas in per-  
spiciendis morbis , qui ex quolibet tempera-  
mento oriundi , unicuique proprii praevide-  
ri queunt , unde hinc magna pars causarum  
περὶ τῶν νόσων pendet.

## SIGNA MORBORUM.

898. **S**igna futuri morbi petuntur 1. ex  
animadversâ mutatione insuetâ fun-  
ctionum qualiumcunque ; praecipuè quî-  
dem ex imminutâ perspiratione Sanctoria-  
nâ,

nâ, lassitudine insolitâ, & corpore ad sensum graviore. 2. ex accuratâ cognitione temperamenti in unoquoque homine, atque simul ex singulari structurâ corporis uniuscujusque. 3. ex observatione classium, quibus continentur causae *αρχαί τε καὶ* (744. ad 780.). 4. ex scientiâ certâ Epidemicorum, dato tempore regnantium.

899. Signa morbi praeteriti habentur ex cognitis effectis, quae relictâ sunt post quamlibet laesionem partis cujuscunque solidae, aut peccatum humorum sequentia, aut post Actiones laesas: qui enim usus partium perspectos in sanitate confert iis defectibus, qui relictâ sunt, inde concipit morbi indolem.

900. Signa morbi praesentis spectant ejus causas, naturam, symptomata, statum, eventum.

901. Signa indicantia naturam Causae morbi petenda sunt 1. ex observatione rerum earum, quae corpori applicatae, vel applicandae, morbos constituunt, vel faciunt. vid. *αἰτιολογίαν παθολογικῆς*. 2. ex *ἰδιοσυμμερίᾳ* (vid. 888. ad 898.) 3. ex observatâ naturâ effectuum in sensus incurrentium.

902. Morbus solidae partis cognoscitur 1. ex vi, qualitate, modo applicandi, duratione, causae, sive internae, sive externae. 2. ex mutatione sensibili qualitatum, situs, nexuque, loci affecti. 3. à laesis functionibus.

bus. 4. ab excretis à loco affecto rectâ, vel obliquè, prodeuntibus.

903. Vulnerum, contusionum, corrosionum, ambustionum, praesentia, si patet sensibus, eo ipso noscitur.

Horum autem conditio, & status, scitur  
1. ex conspectu. 2. ex naturâ partis laesae.  
3. ex symptomatibus.

Eorum eventus praesagitur 1. ex necessitate functionis laesae ad vitam, vel sanitatem. 2. ex indole laesae partis. 3. ex ipso modo laesionis. 4. ex temperie Aegri.

904. Praesentia sensibus patens ulcerum, fistularum, scirrhorum, canceri, carcinomatis, inflammationum, gangraenarum, sphaceli, facillimè facit, ut noscantur per sua signa pathognomica, quae in ipsâ eorum definitione continentur.

Sed & status horum noscitur. 1. inspectu, tactu, odoratu. 2. cognitâ indole partis laesae. 3. observatione symptomatum.

Sed eventus praesagitur. 1. à naturâ cognitâ mali. 2. à naturâ partis laesae, ejusve influxu in vitam, sanitatemve. 3. à viciniâ aliarum partium cognitarum. 4. à difficultate applicandi auxilii. 5. à temperie.

905. Si autem mala haec (903. 904.) intrò abscondita sensibus latent, deteguntur tamen signis petitis 1. à naturâ causae. 2. à functione quâcunque simul laesâ. 3. ab ex-

cretis. 4. à locò affecto per Anatomien cognitò, tam interno, quam externo. 5. à qualitate sensibili laesà.

Status autem & eventus eorum habentur, ubi primò cognita sunt, ex iisdem ac jam dictum (902. 904.).

906. Locus affectus in morbis, si externus est, vel internus, sed laesus à causà externâ, habet plerumque signa ipsis sensibus externis patefcentia, unde facillè detegitur; sunt enim morbi plurimum hi: vulnus, contusio, inflammatio, oedema, ulcus, gangraena, sphacelus, luxatio, distorsio, fractura, caries, atrophia, scirrhus, cancer, carcinoma.

Etiam comparatio functionis laesae cum origine illius instrumenti, quo actio fiebat sana, sedem mali docet.

907. Locus affectus internus à causà internâ difficilior patefcentia, detegitur tamen 1. à naturâ cognitâ causae. 2. à functione laesâ. 3. à naturâ morbi. 4. ab excretis imprimis. 5. ex symptomatibus bene cognitis comparatis cum scientiâ Anatomicâ partium: Etenim ex his quinque fontibus praecipue cognoscuntur morbi interni, & latentes, cerebri, narium, faucium, thoracis, pleurae, mediastini, pericardii, pulmonum, cordis, diaphragmatis, hepatis, splenis, ventriculi, pancreatis, mesenterii, intestino-

rum,



rum, renum, ureterum, vesicae, urethrae, uteri, genitalium.

908. Signa morbi Acuti in humoribus nati habentur 1. ex velocitate, & violentiâ, incrementi ipsius morbi. 2. ex vehementiâ symptomatum. 3. ex functionibus laesis. 4. ab excretis. 5. à constitutione epidemicâ. 6. ab tempestate anni. 7. a sexu, aetate, vitâ, temperie, aegri.

909. Si omnia haec signa (908.) valida admodum sunt, denunciant periculum ingens; si leviora promittunt aliquid adhuc boni.

910. Signa rursus morbi Acuti in fluidis, quae definiunt, & praesagiunt, statum, periculum, durationem, eventum, intelliguntur ex observatis effectis pendentibus a vitiatis nostris humoribus (760. ad 766. 781. ad 792.).

911. Signa Acrimoniae in humoribus sunt inprimis dolor sine signis motus aucti, & sine apparente obstructione majore; ut & erosio partium sine tumore simul praesente.

912. Signa Acrimoniae Alcalinae sunt foetor cadaver olens in toto aut in parte; fa-  
por ut carnis, aut urinae, putrefactae; erosio cineritia, plumbea, nigra, quoad colorem, eaque celerrimè proserpendo grassans; sitis ingens, vix sedanda; appetitus prostratus.

tus , atque ab omni cibo abhorrens ; foeces alvi solutae , splendentes , cadaverosae , fuscae , nigrae ; urina acris , crassa , fusca , spumescens , foetida instar putrefactae , vix dimittens foeces ; sudor vix ullus , aut similis lotio modò descripto ; cutis arida externa , ut & interna narium , oris , linguae , faucium ; cruor tenuis , dissolutus , floridus , vix concreescens ; pustulae rubellae , ichorosae , fuscae , plumbeae , nigrae , subitò gangraenosae ; bubones ; anthraces ; maculae purpureae ; inflammationes acutissimae , celerrimae ; sphaceli cum bullis elevatis ; juvamen ab Acidis.

913. Signa Acrimoniae Acidae sunt foetor acidum spirans ; sapor similis ; color pallidus faciei , anguli oculorum , labiorum , oris , gingivae , faucium ; erosio lenta , cum pallore ; sitis non magna ; appetitus saepe ingens ; digestio celerrima ; validus appetitus rerum terrestrium , & absorbentium ; tormina alvi cum pallore , & frigore ; foeces alvi terminales , acidum spirantes , virides ; urina stranguriosa , crassa , alba , cum sedimento crasso , copioso ; sudor multus , & acidus ; cutis laxior ; sanguis crassius quandoque pallidior , aliquando nigrescens ; inflammationes leviores , & lentiores ; juvamen ab iis , quae acido opposita.

914. Signa Acrimoniae Muriaticae , vel  
Ammono-

Ammoniacae sunt sapor falsus; erosio lenta, pruriens, ruborem inducens; fitis affidua, ingens, vix sedanda; siccitas; rigiditas; urina falsa, tardè putrescens, cum sedimento spisso, & cum pelliculâ tenui pinguiusculâ innatante; juvamen ab Aquosis.

915. Signa Acrimoniae Oleosae putrefactae sunt foetor empyreumaticus; sapor amarus, rancidus, acer pinguis, ut ab oleo ambusto vel putrefacto, fauces exurens, nidorosus; erosio fervida, nigra; nausea, appetitus omninô & cum horrore deletus; fitis summa; foeces alvi pingues, foetidae, dum redduntur fervidae; urinae flammeae, foetidae, spumosae, paucae, calidae; cutis arida; oris siccitas, sordes, graveolentia; cruor ambustus; inflammationes acres, celeres, pertinaces; suppurationes similes; gangraenae foetidissimae; juvamen à frigidis, acidis, aquosis, saponaceis.

916. Signa Fluiditatis nimiae sunt perspiratio Sanctioriana, sudor, urina, saliva, foex alvi liquida, nimium aucta; corporis totius marcor, contractio, debilitas, fitis, mobilitas; juvamen ab Inspissantibus.

917. Signa Tenacitatis auctae nimis sunt tumor; dolor; anxietas; circulatio, secretio, excretio, impeditae; lentor humorum circulantium, secretorum, excretorum; si cum hisce signis frigus simul manifestum,

tum designat pituitosum; verum si calor ingens simul adest, tum spissum inflammatorium significatur.

\* 917. Inde etiam signa praedominantis aquae, salis, olei, terrae, habentur nota.

918. Si verò unâ cum praedictis signis apparent simul signa Vitae vel Circulationis validae, tum designatur citissima, summaque destructio; contraria autem oppositum demonstrant.

919. Quin etiam ex omnibus his bene perpensis intelliguntur signa Malignitatis in Acutis: quum enim haec significet celerissimam morbi mutationem in mortem, poterunt haec colligi 1. ex causis validis, velocibus, corpori applicatis; ut sunt pestis, venena, ignis, putredo. 2. ex cognitâ per observationes violentâ naturâ praedominantis Epidemici. 3. ex cognitâ temperie naturali, atque morbosâ, aegri. 4. ex resistentiâ pertinaci contra omnia genera remediorum, licet validâ vi mutante praedictorum. 5. ex symptomatibus malis, quae vitales actiones praecipuè admodum laesas esse testantur; qualia sunt ex primariis sitis inextinguibilis; siccitas, fordities, albedo, flavedo, fuscus color, nigredo, maximè cum crustis, in ore, naribus, linguâ, faucibus, palato; appetitus integrè deletus; nausea perpetua, ingens, abominabilis; vomitus assiduus; sin-

singultus ; dolor , & anxietas valida circa  
 stomachum ; rejectio sincera per vomitum  
 feri , bilis , putridi humoris ; Alvi dejectio  
 sincera , liquida , foetida , non levans , val-  
 de debilitans , fibras , carunculas , membra-  
 nas secum ferens ; Urina valde tenuis , ru-  
 bra , spumosa , parca , saepe reddita ; Sudor  
 frigidus , viscosus , guttatus , circa caput &  
 collum , non levans , foetens ; Pulsus celer ,  
 debilis , durus , inaequalis , intermittens ;  
 Respiratio citata , anhelosa , impedita , tussi-  
 culosa , dolens , sublimis ; mentis alienatio ,  
 delirium , furor , insensibilitas ; Somnus nul-  
 lus , turbatus , non levans , laborem faciens ,  
 aut perpetuus ; Sanguinis excreatio ; ejus  
 Mictus ; aut per Alvum exitus ; stillae san-  
 guineae paucae , atrae , ex Naribus ; tremores  
 insoliti linguae , labiorum , manuum ; con-  
 vulsiones validae ; anxietas ; membrorum ,  
 capitivae , assidua jactatio ; decubitus supi-  
 nus ; propendunt pedum à lecto quasi ne-  
 glectim , ut & non percepta aegro nuditas  
 horum ; oculi sponte lachrymosi , tristes ,  
 vagi , fixi , ficci , pulverulenti ; insciis ex-  
 euntia excrementa ; collectiones flocco-  
 rum , atque palpationes sollicitae , laborio-  
 sae ; maculae purpureae ; crises nec inte-  
 grae , nec levantes ; mutationes in insolita  
 quaeque .

920. Morbi Acuti superabiles naturâ , vel

arte, judicantur ex absentia horum signorum (919.); & contra.

921. Cruditas, coctio, crisis, eventus in salutem, alium morbum, vel in mortem, sunt objecta, & signa, Prognostici in morbis.

922. Materia morbi praedita ea mole, figura, cohaesione, mobilitate, inertia, ut faciat, vel augeat, morbum, appellatur Cruda.

923. Ille autem status morbi, in quo haec ita se habet, dicitur Cruditas morbi; quod obtinet aequè in morbis, ubi tota massa humorum infecta est, quam in iis, ubi una modò pars tali materie obsessa habetur.

924. Quod idem de solidis, quatenus vicio humorum aegrotant, verum est.

925. Cruditas illa (922. 923. 924.) cognoscitur 1. ex vigore morbi durante, vel crescente. 2. ex augmento assiduo symptomatum. 3. ab exercitio functionum adhuc valde laeso. 4. omnium optimè ex recessu humorum circulantium, secretorum, excretorum, & excrementorum, à statu sano, quoad copiam, vel qualitates; unde in sudore, lachrymis, mucos, salivâ, sputo, redditis per vomitum, bile, foecibus alvi, urinâ, ichore, pure, sanguine, menstruis, lochiis, lacte, abscessu, aphthis, &c. indicatur.

926. Si autem materia morbi prius cruda (922.), per actiones vitae, aut propriam indolem, vel per medicamenta apta, sic mutata est quoad molem, figuram, cohaesionem, mobilitatem, inertiam, ut minus recedat à statu salubri, minus laedat, adeoque impetum morbi imminuat, Cocta jam appellatur.

927. Status autem morbi ille, in quo haec (926.) ita fiunt, appellatur Coctio, Maturatio, vel *πενσιμός*.

928. Cognoscitur ille status morbi (927.), & materiae (926.) 1. ex quiete morbi, ejusdemque decremento, viribus vitae interim constantibus, vel & incrementibus. 2. à sedatione, imminutioneque, symptomatum, concomitante vitae robore. 3. à restitutione functionum in integrum. 4. ex similitudine humorum circulantium, secretorum, excretorum, excrementorumque, cum naturalibus, confer (919.).

929. Causa mutans Cruda (922.) in Cocta (926.) est actio Vitae superstes, immutatio spontanea materiae morbosae, virtus medicamentorum auxilians.

930. Materia morbi eousque cocta per causas suas, ut evaserit salubri simillima, appellabitur Resoluta; haec actio dicitur Resolutio, quae erit sanatio perfectissima, absque ullâ evacuatione contingens; supponens  
mate-

materiem benignam , optimam naturam , bona medicamenta.

931. In morbis Acutis , qui in humoribus consistunt , disponitur ut plurimum certo tempore materies morbi ita , ut fiat subita mutatio morbi in Sanitatem , vel in Mortem , quae permutatio Crisis appellatur ; atque ipsa materies ita disposita Critica dicitur.

932. Causa talis motus est vis Vitae superstes irritata à materie morbi variis conditionibus praedita , ut evacuetur , ut transmigret , vel ut occidat.

933. Si ad evacuationem , vel mutationem loci , apta est materia , nondum tamen similis salubri , parit mutationem in motu humorum diversam ab eâ conditione , quâ in corporibus sanis fieri solet , vocatur Perturbatio Critica.

934. Illae autem Permutationes , quae à vi Vitae incipiente movere , circumducere , miscere , separare , materiem criticam , oriuntur , si fiunt sensibiles , appellantur Symptomata Critica , suntque signa Crisios jam natae , aut mox futurae. Horum distinctio difficilis , ignoratio damni , & periculi , plenissima.

935. Saepius enim confunduntur cum symptomatibus à causâ morbi , morbo , vel crudâ materie morbi ortis ; unde plerumque



que sequitur infaustissima medendi Methodus.

936. Signa verò, quibus internoscuntur symptomata Critica à Morboſis ſunt primaria haec : 1. ſymptomata illa oriuntur à vi Vitae ſuperante vim Morbi, haec autem à vi Morbi praevalente ipſi facultati Vitali. 2. illa ſunt praegreſſa Coctione ſuis ſignis manifeſta, & bonâ reperta, haec in Cruditate comperta. 3. illa ſunt circa tempus proprium criſi, haec omni morbi tempore, maxime in augmento. 4. Illa brevi levant, haec citò nocent.

937. Primaria illa ſymptomata Critica, & ſigna, ſunt haec, quae criſin evacuantem praecedunt: poſt coctionem, tempore critico, ſubitò, ſine novâ manifeſtâ morbi cauſâ, oriens ſtupor, ſomnolentia, ſopor, vigiliae, delirium, anxietas, dyſpnoea, nox moleſta; rigor; dolor, rubor, titillatio, punctura, gravitas, denſitas in parte; tenebrae, ſplendor, lux, lachrymae ſpontaneae, in oculis; naufea; aectus; fitis; retractionis hypochondriorum, tremula agitatio labii inferioris.

938. Evacuationis Criticae praefentis ſigna habentur, & producta ſunt, ſi poſt animadverſa prius (936. 937.), deinde conſpicitur vomitus; ſalivatio; muci excretio; excreatio ſputorum; alvi fluor; urina; haemorrh-

morrhagia ex naribus, utero, haemorrhoidibus; sudor; abscessus; pustulae; tumores; bubo; parotis; aphthae; humorum ex loco in locum translatio.

939. Cognoscuntur haec (938.) critica salubria, nec per artis sollicitudinem turbanda esse, si praegressa fuerint (936. 937.) jam dicta: coctio praegressa; morbi status; vis vitae bonae; excrementa similia naturalibus, convenientia morbo, parti affectae, vitae, victui, aetati, sexui, temperiei; tempus; locus; levamen post haec tam quoad morbum, quam quoad symptomata; color, calor, robur, pulsus, respiratio, actiones omnes, statim restituta, vel incipientia multum restitui; tum constantia criticae evacuationis usque ad finem morbi: si enim omnia haec, vel pleraque, signa adsunt, tum perfecta crit separatio morborum à sano; diciturque Crisis perfecta evacuans, vel separans.

940. Si autem illa signa (939.) absint, aut horum contraria eveniant, tum apparet haec esse symptomata Morbi, non autem Vitae triumphantis; adeoque tunc mala sunt, atque curanda ut morbi ipsi; si verò omnia haec non adsint, sed tantum quaedam, eaque nec perfecta, tum cognoscitur materiem male criticam vagam huc, illuc, ferendam, parituram varia phaenomena, quae Crisis *μετασπική* appellatur.

941. Unde axiomata in diagnosticis, & in prognosticis, haec recepta sunt, & alia similia:

Evacuatio Critica post Coctionem semper bona.

Eadem die Critico bona.

Est autem varia quoad tempus, & quoad materiem, pro ratione aetatis, temperiæ, sexus, regionis, tempestatis anni, morbi, epidemicae constitutionis.

Erit illa ante Coctionem mala.

Coctio autem ipsa semper bona.

Quô Coctio citior, eô melior; non autem Crîsis.

942. Praenotio designans eventum morbi fundatur praecipuè in cognitis, & comparatis inter se, causis, à quibus pendet vita adhuc praesens, & superstes, in aegro, atque unde oritur morbus etiam in illo praesens; etenim ex hisce sic exploratè perspectis nascitur praesagium de exitu morbi in vitam, sanitatem, alium morbum, mortem; quin etiam ex iisdem intelliguntur tempora, & permutationes, quae hic accidunt.

943. Virtus causae, quâ Vita adhuc durat, cognoscitur ex functione quâlibet superstitute, primariô Vitali, Animali dein, atque etiam Naturali: quae quidem solent enunciari binis his axiomatibus: quô functiones plures magis similes sunt iisdem  
fun-

functionibus in fanitate fieri consuetis, eô vis Vitae major, & melior, eôque plus spei ad fanitatem perfectam recuperandam. Quô autem salubrior est in aegro functio illa, à quâ plurimae aliae pendent, ut à suâ causâ, eô pariter res aegri magis in vado. Et contrâ concluditur ex contrariis.

944 Functio autem scitur similis esse illi, quae in fanitate aderat, si effectus ab illâ bonâ functione inseparabiles, sensibiles, & in physiologicis enarrati, deprehenduntur esse tales, ut ibi explicati sunt: inprimis verô inde discimus bonitatem ejus, si causâ, materia, effectus, morbi per ipsas functiones superstites convertuntur in fanitatem, adeôque praecipuè ex bonâ coctione materiae morbosae, & ex bonâ excretionem.

945. Coctio quidem optima censetur illa, quâ cruditatis citissimè, & perfectissimè, fit similis humori naturali. Unde axioma: quô Coctio melior, eô plus spei pro Vitâ & Sanitate habetur.

946. Atque scitur, humores redire in conditionem salubrem, atque etiam partes solidas restitui, si actiones quaecunque, tempore Cruditatis laesae, restituuntur in integras; sique excreta omnia induunt similitudinem cum salubribus. Unde axiomata: quô actiones magis mutantur in sanas, eô melior Coctio: rursumque, quô excrementa omnia simi-

similia naturalibus eô Coctio perfectior.  
& contrâ.

947. Tandem etiam cognoscitur robur  
causae vitalis ex aetate, sexu, temperie, vi-  
tâ, natione, familiâ, ipsius Aegri.

948. Atque ex his omnibus (942. ad  
948.) Medicus colligit vitale robur in Ae-  
gro, causaeque illius magnitudinem.

949. Cognoscitur autem vis & magnitu-  
do causae morbum parientis 1. ex notis  
causis ejus magnis, malignis, pertinacibus.  
2. ex genio noto morbi per cognitam con-  
stitutionem epidemicam. 3. ex copiâ, ma-  
gnitudine, vehementiâ symptomatum. 4. ex  
cruditate. 5. ex mutatione magnâ qualita-  
tum sensibilibus, quoad figuram, molem,  
colorem, consistentiam. 6. ab excretis valde  
recedentibus à sanis.

950. Causis his (948. 949.) examussim  
cognitis, atque accuratè comparatis inter se,  
fit praedictio per haec axiomata:

Si causa vitae in Aegro longè efficacior  
quam causa morbi, tum Aeger, brevi, in-  
tegrè, sanabitur.

Si causae vitae & morbi aequales efficaciâ,  
praesagitur discrimen, duratio, alius mor-  
bus.

Si causa morbi longè efficacior causâ vi-  
tae, sequetur mors vel totius, vel par-  
tis.

951. Magnitudo periculi in morbis spectatur etiam excessu magno, quo causa morbi superat causam vitae.

952. Duratio illius mensuratur ex tarditate, quâ morbus tendit in *auxilium*; ex debilitate vitae; ex pertinaciâ, & tenacitate, materiae.

353. Alius morbus futurus scitur exinde, quod vis morbi, & symptomata ejus, remittunt absque coctione, atque absque bonâ, sufficiente, criticâ evacuatione, idque in morbo cum materiâ.

954. Morbus autem ille succedens saepe est peior priore, & diuturnior, pro diversitate partis laesae, quam novus ille morbus occupat, aut pro diversitate mutatae jam materiae morbosae vel solâ morâ temporis.

955. Sed & potest cognosci locus, quem materies male cocta morbi occupabit, ex pruritu, titillatione, rubore, dolore, calore, tumore, stupore, pulsatione, agitatione, molestiâ perpetuâ, partis alicujus in aegro, tum ex genio, & ideâ, vel ex epidemicâ conditione, morbi.

956. Quin etiam si cernitur, quod ars, vel casus, in parte quâdam corporis produxit ea, quae modô dicta (955.), tum etiam praevidetur materiem morbi in eam partem colligendam esse.

957. Ex omnibus his (921. ad 957.)  
con-

## DE PULSU ARTERIAE UT SIGNO. 371

constat nobis, quod cognitio Coctionis, & Crisios, maximè sit habenda, ut fiat debitum praesagium in morbis; sed & patet hanc fere tantum acquiri cognitâ functione Vitali, ut ejus praecipuâ causâ; haec autem maximè aestimatur Pulsu, & Respiratione; hinc ergo de his primò erit hic agendum: quum verò & Urina sit recrementum ex totâ massâ sanguinis, omnibusque partibus, vi vitae egestum, & haec postulat considerationem accuratam.

## DE PULSU ARTERIAE UT SIGNO.

958. **P**ulsus arteriarum (217. 218. 219.), quum nuncient conditionem definitam cordis nostri, ut motoris primi; tum indolem, copiam, motum; humoris nostri universalis, unde reliqui omnes; tum & statum varium arteriae, vasis fere primarii omnium partium corporis; patet in arte Signorum multum valere doctrinam de Pulsibus.

959. Pulsus igitur Fortis notat 1. vim validam cordis contracti muscularem; adeoque etiam valorem causae contrahentis, id est 2. validum, satisque copiosum, influxum humoris nervosi, cerebellosi, in villos cordis. 3. copiam cruoris. 4. circuitum, & secretionem, humorum optimè procedere.

Est ergo talis pulsus boni praesagii, si toto corpore, in omnibus ejus partibus, talis. Fallit saepe in morbis apoplecticis, & aliis quibusdam, ubi libero itinere à corde in cerebellum, ab hoc in cor, reliqua valde obstructa, imprimis in visceribus.

960. Debilis notat omnia contraria prioribus (959.), sed aliquando fallit in iis, qui valde obesi.

961. Pulsus Magnus notat 1. copiam cruoris. 2. vim cordis. 3. arteriam liberam, & contractilem. 4. Circulationem, & secretionem, bonam. Parvus designat contraria. Plenus inde, & Vacuus, intelligi possunt, quatenus verè observantur.

962. Durus autem adeo famosus varia quidem significat, ut 1. membranam arteriae sicciorem naturali; adeoque 2. obstructions in vasculis minimis membranas arteriarum contextentibus; 3. arterias plenas; sed 4. ad fines capillares inflammatoriâ tenacitate obstructas; 5. cruorem densum valde & compactum; hinc 6. circulationes, secretiones, excretiones, laesas; 7. omnia, caque sanè numerosissima, quae ex omnibus his sequuntur. Mollis autem significat omnia contraria, sed tamen in Peripneumoniâ acutâ fallit maximè.

963. Pulsus Rarus intra datum tempus notat 1. tardiores contractiones cordis; ad-  
côque



eôque 2. tardiores influxus humoris cerebellosi per nervos in villos cordis ; 3. circulum sanguinis sæpe expeditum, & aequabilem ; 4. humorum per omnia vasa circuitum facilem. Si autem talis est ex debilitate, malus habetur & periculosus. Pulsus autem Frequentior designat contraria ; ut & acria irritantia ; spiritus agitados ; febres, phrenitidem.

964. Pulsus aequalis roboris, & frequentiae, vitae constantiam declarans, bonus est : inaequalis ideô malus.

965. Intermittens, vitae vim labilem designans, perniciosus.

966. Fortis, magnus, aequalis, tardusque simul, omnium optimus. Fortis & magnus ; fortis & tardus ; magnus & tardus, simul, boni sunt. Debilis, parvus, durus, inaequalis, intermittens, frequens simul, est pessimus omnium. Atque eô quidem peior, quô plures tales notae concurrunt simul, & contrâ.

967. Myuri, ferrati, caprizantes, dicroti, hinc etiam facilè intelliguntur.

968. Ex doctrinâ Pulsuum itidem comprehendimus quid significet Calor, quippe qui effectus pulsus : etenim notat vas arctatum, humorem densum, propulsionem humorum validam, resistentias magnas circâ fines vasorum ; unde & imminutus calor con-

traria significat : & aestus , & frigus , quoad diagnofin & prognofin , fciuntur.

969. Tamen oportet meminiffe , quod natura arteriae fingularis , aetas , fex , animi affectus , fex res nonnaturales , habitus corporis , temperies propria , regio , tempeftas , mirificè haec omnia mutare queant. Et quod multum interfit , quo ordine pulfus diverfi fe invicem excipiant.

970. Sed & accuratiffimè eft obfervandus Pulsus , quatenus eft index materiae morbofae movendae , motae , excretioni paratae , & jam incipientis fecerni : nam ibi demonftrat egregiè tempus agendo aptum praeter coetera.

## DE RESPIRATIONE, UT SIGNO.

971. **R**efpiratio facilis , non dolens , conftans , in morbis designat organa omnia refpirationi fervientia ritè valere ; pulmones facilè explicari ; fanguinem commodè transmitti ; adeoque eum aptum effe fluere per vafa omnia corporis ; hinc optimi eft fempè praefagii. Difficilis omnia contraria designat ; adeoque praefagii fempè eft peffimi.

972. Quae autem refpiratio fimul valde dolet , haec ut plurimum notat aliquid inflamm-

inflammationis internae ; hinc pessimi semper auspicii.

973. Respiratio Magna semper notat pettus per se bene dilatabile , diaphragma mobile , explicabile abdomen , pulmonem , cruorem faciliè meabilem , & vires bonas ; adeoque bona quaeque in morbis portendit.

974. Respiratio Parva significat contraria quaeque priorum (973.) ; maximè autem designat pulmonem vel cruorem , vel alià materie , non meabili, rigidum ; fistulamve pulmonalem tumore quodam , aut aliquà materie sic obsessam , ut aëri vix queat immitti ; hinc est pessimi ominis.

975. Respiratio Lenta demonstrat pulmonem esse aequabiliter liberum , explicabilem ; sanguinem penetrabilem ; & aequabiliter pulsum ; hinc optimi vaticinii , si molestia abest , & desipientia.

976. Respiratio Celeris declarat organa respirationis laesa ; pulmones obstructos , rigidos , siccos ; cruorem ineptum transfluere ; ideoque semper apportat aliquid metuendi.

977. Respiratio Aequalis praedicit bonum pulmonem ; bona organa , bene coctum cruorem ; hinc bona vaticinatur ; inaequalis verò declarat causas vitae proximas periclitari ; adeoque semper mala est.

978. Respiratio Suffocativa, quae creat

aegro sensum suffocationis, eloquitur pulmonem inflammatum, obstructum, plenum, rigidum, siccum; cruorem autem immeabilem; hinc brevi lethalis est, nisi talis fuerit ex causâ spasmodicâ leviori in hysteriis, hypochondriacis, aut consueta planè, ut in asthmaticis.

979. Respiratio in supremâ parte thoracis exercitata designans conditionem pessimam pulmonis impleti, adeoque & periculum vitae, fere est lethalis.

980. Sublimis, quae fit cum claviculis elevatis, sterno agitato, motis scapulis, narium pinnis anhelosis, costis inferioribus, & abdomine, simul validè agitatæ, mortifera est; nam significat difficillimum motum cruoris per pulmones, atque simul deficientes vires.

981. Facilis, magna, lenta, aequalis, reficiens, peracta solo, leni, motu musculorum intercostalium, diaphragmatis, & musculorum abdominalium, est quammaximè salutaris. Illa autem, quae plurimas harum conditionum implet, bonitate optimam sequitur.

982. Difficilis, dolens, parva, celeris, anhelosa, inaequalis, suffocativa, sublimis, exercita omni molimine musculorum costis adnatorum, indubitatò lethalis. Sed ea, quae habet plurima horum vitiorum, eò est  
pejor,

pejor, quô plura eorum secum gerit.

983. Frigida lethalis; utpote fere semper nuncia gangraenae viscerum, & vasorum, interiorum.

984. Parva cum sibilo stertoroso, atque fervente quasi pulmone & gutture, citô lethalis, si reliqua signa mala adsunt: significat enim fere semper humorem vitalem immeabilem in pulmones congeri.

985. Magna, & celeris, saepe salutaris; signum, & causâ, bonae coctionis, & crisis,

986. Magna, & rara, denunciat cerebrum obstructum, atque morbos inde factos, futurosve; ut sunt coma, lethargus, deliria. &c.

987. Interim bene considerandum est, respirationem mirè turbari, & variari, in diversis hominibus, pro nativâ constitutione; formatione variâ thoracis, pulmonum, diaphragmatis, abdominis; diversitate aetatis; sexus; graviditatis; affectus animi; habitus corporis; regionis; tempestatis anni & coeli; atque similia.

988. Varius quidem ordo, quo variant se mutuô excipientes mutationes respirationis, multum affundit lucis diagnosi, & prognosi: nam ex malâ in bonam optima, & ex bonâ in malam pessima, permutatio est.

989. Quae autem tempore crisis insurgit, optima.

990. Quia ergo una respiratio nobis designat conditionem praesentem cordis, pulmonum, cruoris, liquidi cerebellofi, pleurae, thoracis, diaphragmatis, abdominis, patet observationem accuratam esse ejus summi momenti in omni, maximè in acuto, morbo ad fidam prognosin, atque diagnosin, firmandam.

## DE URINA, UT SIGNO.

991. **E**X conspectu Urinae, judicaturus de statu corporis sciat 1. Lotium sani hominis in eo ipso, & in aliis illi comparatis, varium esse pro varietate aetatis, sexus, temperièi, tempestatis anni, sex rerum nonnaturalium, medicamentorum. 2. hinc ergo in ferendo judicio de urinâ simul accuratissimè attendendum ad reliqua signa in morbis apparentia: aut aliter artem hanc ubique fallaciae esse plenissimam.

992. In urinâ examinandâ ad usum medicum pro diagnosi, vel prognosi, consideratur copia, color, odor, sapor, fluiditas, & contenta illi inhaerentia.

993. Copia urinae aucta ultra solitum designat aliquid horum sequentium, vel quaedam, aut omnia simul. 1. abundantiam potus

tus aquosi. 2. laxitatem singularem fistularum renalium. 3. perspirationem, sudorem, salivam, imminui. 4. diuretica assumpta. 5. cruoris miscelam imperfectam, quâ aquosa facile secedant a reliquis. 6. affectus nervosus, temperiem hystericam, vel morbum hypochondriacum.

994. Praesagit talis urina (993.) 1. crassitatem remanentis. 2. acrimoniam ejus. 3. sitim. 4. anxietates. 5. obstructions, harumque effectus. 6. tabem ex diabete, quae siticulosa, sicca, aestuans.

995. Urina Parcior longè solito procedens significat 1. potus penuriam, vel nimiam in eo abundantiam spirituum fermentatione productorum. 2. vasa obstructa, vel spasmo contracta. 3. augmentum aliarum quarumcunque excretionum. Si autem integrè intercipitur denotat ischuriam, ejusque causas varias (821.).

996. Praesagit talis secretio urinae (995.) futuras repletiones, gravitatem, torporem, soporem, tremorem convulsivum, mortem apoplecticam imprimis, si oritur ex causa secunda (995.).

997. Urina Tenuis, quasi aqua, limpida, excolor, insipida, inodora, copiosa exeuns, denunciatur 1. copiam aquae, vel potus aquosae ingestam. 2. vasa renalia admodum contracta, dum interim humores validè agitantur.

tur. 3. arctam cohaesionem olei , falis , & terrae , in ipsâ urinâ , horum tenacitatem , simulque difficilem aquosi cum his permissionem. 4. affectus animi enormes , insultus hypochondriacos , aut hystericos , pallorem virginum , partum modô antegressum. 5. viscera coctioni imparia , cruditates , pituitam , frigus. 6. obstructions vasorum & viscerum. 7. in acutis verô morbis impedimenta notat coctionis , & crises , atque hinc materiae morbosae depulsum in partes interiores corporis.

998. Urina talis (997.) portendit eadem fere ac (994.); in morbis autem acutis , & inflammatoriis , praedicat pessimam conditionem viscerum , deliria , phrenitides , convulsiones , mortem , natâ ex acri retento gangraenâ.

999. Urina Rubra , absque sedimento , in morbis acutis , docet 1. motum validum attritus inter partes humorem constituentes , inter vasa & humores. 2. intimam , & tenacem , permissionem , olei , falis , terrae , aquae , in humoribus. 3. hinc ergô cruditatem magnam morbi. 4. longam futuram durationem ejus. 5. & magnum in eo periculum.

1000. Urina autem haec (999.) praesagit 1. destructiones gangraenosas vasculorum minimorum , maximè in cerebro & cere-



cerebello; atque inde mortem. 2. coctionem difficilem. 3. crisin tardam, eamque valde ambiguam. Patet autem omnia haec (999. 1000.) eò pejora, quò magis rubra, simulque sine sedimento, urina.

1001. Hinc urina flammea, tenuis, sine ullo sedimento, notat quidem eadem, sed violentiora, unde & praesagium idem, sed longè adhuc periculosius.

1002. Rubra unà cum sedimento copioso, gravi, lateri rubro contrito, aut bolo rubrae, simili, designat 1. antegressum esse motum attritus vehementem. 2. vasa laxa. 3. cruorem acrem, salinum, solutum, nutritioni ineptum. 4. febres intermittentes valido paroxysmo defunctas. 5. in oris septentrionalibus his scorbutum.

1003. Praesagit 1. longitudinem morbi. 2. vasculorum attritionem, debilitationem, destructionem. 3. sudores, urinas, salivam, diarrhoeas, colliquativas. 4. ἀρεοφίαν. 5. hydropes quoscunque.

1004. Si in tali Urinâ (1002.) sedimentum est furfuraceum, squammosumve, designat eadem quidem, sed pejora.

1005. Si autem urina est colore croceo, immixta tingente, aut vitrum sic colorante, simulque habet sedimenta ut in priori (1002. 1004.), designat icterum, atque certa ejus symptomata in cute, alvo, hypochondriis, toto

toto corpore; unde & praefagia clara ex historiâ ejus morbi petenda.

1006. Viridis colore Urina unâ cum sedimento crasso significat 1. temperiem atrabiliariam. 2. ejusque materiem jam solutam excerni. 3. adeoque anxietates ad praecordia, perturbationes alvi, dolores iliacos & colicos,

1007. Praefagit talis urina materiem atrabiliariam solutam, motamque, raptum iri in cruorem, & viscera; unde infinita, & acuta, saepe mala; quae ex historiâ atrae bilis sic dispositae peti debent. Quin etiam ex his noscitur, quid sentiendum sit de urinâ nigrâ, utpote ejusdem, at peioris, naturae (788. 789.).

1008. Sanguis, pus, carunculae, filamenta, pili, anguillulae, grumi, arenulae, partes calculi, mucus in fundo, designant vitia renum, ureterum, vesicae, testium, vesicularum seminalium, prostaticarum, glandularum Cowperi, urethrae.

1009. Quenam verò sit natura mali designati per dicta symptomata, ut & quis locus sit affectus, docere debent signa simul concurrentia, & observata, in eo morbo, ubi dicta prodeunt.

1010. Pinguis apparens Urina plerumque gerit arenulas minimas viscido quodam nexas, & sic effingentes speciem membranulae

oleosae ; tum notat abundantiam terrae , & salis hebetioris , in sanguine ; praefagit hinc scorbutum , calculos , & similia.

1011. Urina autem verè pinguis & oleosa , rarior certè , si observaretur unquam , notaret. 1. vasa attrita per majorem motum , hinc soluta , cruori mista , & cum urinâ excreta pinguis. 2. humores acres. Et ideò minabitur , phthisin , & atrophiam.

1012. Urina , quae conquassata spumam diu retinet , notat olea & sales in lixivium saponaceum mista , atque soluta , adeòque 1. tenacitatem miscelae arctae. 2. coctionem difficilem , & crisin. 3. morbos fere pulmonicos , aut catarrhosos in capite.

1013. Urina foetida sponte , notat sales & olea attenuata , soluta , fere putrefacta ; hinc discrimen summum , tam in chronicis , quam in acutis , nec facilem sanationem.

1014. Urina in morbis colorata apparens , sed planè insulsa , clamat effoetas naturae vires , mortemque propinquam.

1015. Pallida , tenuis , cum sedimento mucoso , tenaci , fassamenta putrida spirans , fere semper notat calculum vesicae.

1016. In febribus autem acutis inprimis consulitur Urina , utpote satis certa praenuncia : nam 1. Urina quae habet sedimentum album , leve , laeve , aequale , citò subsidens , turbinatum , vix odorum , toto morbi

bi tempore usque ad crisin, est optimi indicii, & praesagii. 2. urina multa, alba, stranguriosa, cum sedimento copioso, alboque, critico tempore emissâ, sanat, & abscessus tollit. 3. urina die indice critici copiosior, cum sedimento albo, vel rubello, copioso, levante, notat die critico sanationem fore integrâ crisi. 4. urina tenuis & ruffa non subsidens; alba, tenuis, aquosa; aurea tenuis, constans, non turbata; turbida perpetuô nec subsidens; notat in morbis valde acutis coctionem impeditam, cruditatem magnam, crisin difficilem, morbi longitudinem, summum vitae periculum; sed in acutissimis inflammatoriis fere certam portendit mortem; denique in acutis moderatis designat longum, molestumque, morbum; deinde abscessum fore varium; aut *μετέστροφιν* mali variam.

1017. Urina igitur declarat nobis verè 1. sanguinis indolem, impetum; symptomata. 2. morbi statum, & coctionis. 3. statum secretionis, & crisos. 4. morbos renum, ureterum, vesicae, testium quodammodô, vasorum deferentium, vesicularum seminalium, prostatarum, glandularum Cowperi, urethrae. 5. aliquàs aegritudines in bile natas. Coetera, si sola ex solâ urinâ conjiciuntur admodum incerta, & ridicula fere, sunt.

## T R I E I N H.

1018. **T**Ria sunt munera Artis tuendae Valetudini sanae; nempe conservare Sanitatem praesentem; Morbos in temperie ut in semine latentes, & facile excitandos, praecavere; Vitam disponere ad longaevitatem.

1019. Sanitas enim, quum sit aptitudo in corpore ad exercendas actiones, & quum haec consistat in determinatâ mobilitate partium tam firmarum, quam fluidarum, necessariô haec ipsa, inquam, Sanitas, si semel ponitur perfecta, deteret ex suâ naturâ partes firmas, consumet fluidas, corrumpit utrasque, adeoque se ipsam destruit.

1020. Proinde Sanitas conservatur jugiter restituendo eandem copiam, & qualitatem, partium omnium in corpore, quales ante descriptam destructionem (1019.) in corpore erant in firmis, fluidisque, partibus.

1021. Restitutioni huic (1020.) materiem praebent, cibus, potus, forte & aër; hanc praeparant, & aptant, gesta in corpore per actiones vitales, naturales, animales: praeparatam applicant locis requisitis, & reparandis, eadem gesta: denique & per ea liberatur à superfluis, crudis, nocituris.

1022. Quamobrem patet, totam hanc  
B b                      artem

artem Sanitatis tuendae absolvi descriptione legum, quae definiunt illum definitum usum classium recensitarum (744.), vel (745.), quo satisfiat illi scopo jam descripto (1020.).

1023. Tamen difficile est ita promulgare has leges, ut observatio earum omni homini aequaliter profit.

1024. Cujus difficultatis causa in *idiosyncrasia* ut plurimum haeret; ideòque operatur saepe effectus oppositos in hominibus, qui tamen eandem normam vivendi sequuntur.

1025. Ita quidem, ut unicuique fervetur saepe sua, & integra, Sanitas, licet utantur homines non tantum vario, sed & planè opposito, usu sex rerum nonnaturalium; quum contrà, si vivendi rationem permutaverint vicissim inter se, mox utrique alieno more fruenter aegrotent, qui suo morigeri bene valebant.

1026. Ipsa quoque consuetudo, quam non male alteram naturam, vel *idiosyncrasiam*, appellant, fert vix credenda; sive spectaveris effectus aëris, cibi, potus, motus, medicamenti, veneni, sive consideraveris reliqua.

1027. Quamobrem mutatio subita à consuetis in nova est ubique, & semper, quam maximè periculosa; licet ex malis vulgò habitis in bona putata transiverit.

1028. Sed, sensim mutando, saepe variare vitam quotidianam, egregium est auxilium tuendae Sanitati.

1029. Aër maximè gravis, adeoque simul, ut fere semper est, serenus & siccus, suo cuique loco saluberrimus habetur.

1030. Aëris effectus varii; ejus favens, vel nocens, natura; descripta habentur, ubi de causis Sanitatis (1060.) & Morborum (746. ad 754.) in aëre latentibus actum est; unde proinde peti debent.

1031. Qualitates etiam aeris, excessu suo producentes morbos, emendari possunt oppositis inductis: frigidus enim, & humidus, poterit mutari in calidum, & siccum, ope ignis accensi, per ligna ficciora, & aromatica, nutriti; halitu aromatum calidiorum sponte, vel igne, fragrantium; vento calido admissio, vel arte excitato; si verò calore, & ficcitate aër peccat, emendatur exhalatione dispersae frigidae; vento artificiali; vel exspiratu halituum aquosorum ex plantis frigidis aquae immixtis, ut sunt salix, populus, rosa, sambucus, opulus, morus. &c.

1032. Aër igitur serenus, gravis, temperate calidus & siccus, à mediterraneis puris, & à fluminibus, spirans, leni agitated vento, subitarum & magnarum mutationum expers, apricus & ruralis, ab exhalatione

lationibus salinis, oleosisque defoecatus, optimus est in genere Sanitati tuendae.

1033. Cibus autem censetur optimus ille, qui simplicissimus, parum foeculentus, acrimoniâ omni carens, haud praeditus magnâ mobilitate suarum partium, sano nostro corpori simillimus, aut illi facillimè assimilandus per vires nostras coctrices, tum in acquisitionem praedictarum dotium arte culinariâ praeparatus, est.

1034. Qualis habetur omnis quidem, qui deligitur 1. ex seminibus frumentaceis, farinosis, bene maturis, puris, moderatè ficcatis, satis recentibus, Tritici, Zeae, Secalis, Hordei, Avenae, Oryzae, Fagopyri, Mays, Milii, Panici, Phalaridis; atque tritu, subactu, fermentatione, coctione, praeparatur ita, ut sapore, & odore, gratissimo, se commendet nomine Panis. 2. ex leguminosis tam corticibus tenerioribus, quam seminibus adhuc viridibus, aut maturis, Fabarum, Phaseolorum, Pisorum, Lentium, Cicerum, Viciarum; dum maceratione, coctione, tritu, saepe levissimâ tostione praemissâ, parantur. 3. ex oleribus recentibus, viridibus, aut colligando folia crescentia leniter utcunque suffocatis, Lactucae, Intybi, Cichorei, Portulacae, Apii, Hippofelini, Brassicae, Malvae, Betae; maximè, si levi coctione in  
pro-



proprio succo moriuntur. 4. Ex fructibus tam solidioribus, ut cinarae, nuces, amygdalae, aut bulbis raporum, vel radicibus Dauci, Pastinacae, Raphani, Betae, & Similibus; quam mollioribus, ut poma arborrea, vel plantarum scandentium annuarum; pyra; baccae; pruna, cerasa. 5. ex succo, & corpore, animalis sani, junioris, non nimis pinguis; siue fuerit quadrupes, avis, piscis, siue & insectum, vel crustaceum; si elixatione, affatione, frixatione, suffocatione, praeparantur, quo & lac & ova referuntur.

1035. Alimenta dura, sicca, crassa, ponderosa, foeculenta, profunt his, quibus sunt valida viscera, celeris digestio, motus muscularis ingens, humores moti valde in sanitate. Mollia, humida, tenuia, levia, defoecata, his obsunt, vel perpetuam fere mensam imperant.

1036. Illis verò, quibus viscera debilia; difficilis digestio, vita quieta, sedentaria, otiosa, profunt cibi arte, vel naturâ, similimi chylo diluto.

1037. In temperie alcalescente conducunt acescentia (1034. 1. 2. 3. 4.); in acescente profunt alcalescentia (1034. 5.).

1038. Ex quibus paucis tota ratio delectus, copiae, praeparationis, alimentorum peti potest; si modò prius cognoveris usuri

viscera , humores , temperiem , actatem , sexum , vitae genus , studia.

1039. Copia cibi optima cuique , quam sequitur sensus refectionis , non torporis. Tutior sobrietas , sed debilibus : excessus melior , sed robustis.

1040. Condimenta autem ex acidis , sale , aromatibusve , petita , nocent sanis acrimoniâ suâ noxiâ , vascula tenuissima laedunt , & falso appetitu per stimulum excitato corpus gravant plus , quam nutriunt.

1041. Quin & ex iisdem regulis intelligitur bonitas potus (1035. ad 1041.); si enim ille requiritur tantum ad emendandam sitim , siccitatem , crassitiem humorum , vel eorum acrimoniam , tum aqua frigida , limpida , levissima , inodora , insulsa , cursu exercitata per flumina pura , est potus optimus homini robusto.

1042. Si verô potus requiritur simul eo scopo , ut calefaciat , in motus stimulet , & attenuet , tum profunt cerevisiae coctae , fermentatae , ad defoecationem usque tantum asservatae , ut & vina limpida , fragrantia , grata. Sed & illorum delectus , copia , usus , determinatur per conditiones assumpturi.

1043. Cibi minimè pingues , & potus aquae , firmissima reddunt & fortissima corpora.

1044. Corporis Motus ad primum usque exortum lenissimi sudoris, vel usque ad sensum incipientis lassitudinis, post initia coctionis, cum sensu levitatis, optimus est. Unde & Quietis regula pendet.

1045. Somni tempus, quando corpus sanum torpet. Optima ejus mensura agilitas corpori, dum evigilat, nata.

1046. Omnia medicamenta, vel evacuantia, vel acria, cujuscunque tituli, vitanda omninô sunt.

1047. Sed purgationes cutis externae per frictiones, loturas, balnea, fomenta, nationes, deterfiones, egregiè profunt.

1048. Animi autem affectus, non sunt omninô suppressendi; sed neque excitandi nimis: torpor enim oritur, vel circulationis perversio. Spes, & desideria, corpori saluberrima deprehensa sunt.

## Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Ξ Ι Σ.

1049. **P**Raecaventur morbi, dum, simul-  
ac adfuturorum signa deprehen-  
duntur prima, statim occurritur eorum cau-  
sis.

1050. Primaria verô remedia prophylactica morborum brevi oriturorum sunt pro-  
fectô haec; abstinentia, quies, potus aquae  
calidae, deinde blandus & aliquamdiu con-

tinuatus motus usque ad initia lenis fudoris, tum postea somnus largior corpore bene tecto : his enim crassa diluuntur , laxantur vasa , excernuntur noxia.

1051. Neque est aliud , quod plus defendit corpora contra vim causarum externarum , quam si quis verno tempore tardè minuat vestimenta hyberna , rursumque citò augeat aestivas vestes autumnali tempore.

1052. Eodem etiam facit quam plurimum moderamen diaetae simplicibus descriptum & paucis regulis his: aestate conducit victus levis , mollis , laxans , humidus , lenis , ex oleribus , fructibus , lacte , juscullis ; cum potu copioso aquoso , vel admodum diluto ; & cum motu corporis leniore , vitato omni violentiore.

Hyeme prodest victus gravis , durus , ficcus , aromate vel sale acrior , caro assa , panis plus coctus ; cum potu parciore vini meraci ; & cum motu corporis validiore plus exercitato.

Vere , & Autumno , victus moderandus mediâ quasi inter aestivum & hybernum temperie ; considerando simul , in quodnam horum temporum plus , minusve , inclinaverit.

## DIAETA AD LONGAEVI- TATEM.

1053. **C**Orpus bene sanum per actiones à vitâ sanâ inseparabiles sensim ita mutatur, ut fibrae minimae rigidissimae fiant, vascula autem tenuissima concrecant in fibras concretas, & humoribus non pervias, vasa majora durescant, arctenturque, omnia autem simul contrahantur, compingantur, concrecant sibi invicem, unde siccitas, immobilitas, imminutio senilis. Hinc vasculorum minimorum munera destruuntur, humores in iis stagnant, lentescunt, coalescunt inter se, & cum canalibus propriis, adeoque subtilissimi deficiunt, coctio debilitatur, reparatio deficit, crassiores per sola majora vasa lenti decurrunt, & vitam solam absque animalibus actionibus sustentant, unde tandem mors senilis per has mutationes accidit inevitabilis, & ex ipsâ Sanitate sequens.

1054. Quae igitur citior accidet, si actiones vitae sanae violentiores fuerint; tardior, si moderatiores. Atque in moderamine justae hîc mediocritatis videtur promitti longaevas possibilis arti, maximè si hygieine & prophylaxis conspirant ita in suos effectus, ut non turbent huncce scopum; cuncta fe-

re huc redeunt , si collecta erunt.

1055. Debent corpori conciliari omnes illae conditiones , quae explicatae sunt (885.) , quantum ullâ arte id obtineri poterit. Actiones corporis ita instituendae , ut reparatio perditî , assimilatio assumpti , incrementi requisiti terminus , foecis expulsio , blandè , lentè , assiduô , fiant ; unde labor moderatus , assiduus , ad initia levissimae lassitudinis prodest ; in pueritiâ levior , sensim incrementum cum aucto robore corporis , rursusque cum senio diminuendus semper. Vita interim varia omni fere ratione ; praeprimis in agriculturâ.

1056. Animae operationes eligendae illae , quae singulari genio uniuscujusque maximè sponte placent , hae autem ipsae ita dirigendae , ut , moderatione servatâ , spiritus nec torpeant quiete , nec dissipentur , aut rodant , per nimios motus. In pueritiâ animi contentio acrior prohibenda , sensim plus exercenda , in senio sensim magis , magisque , moderanda. Occupationes saepe variatae.

1057. Cibi simplices , sicci , duri , tenaces , difficilîus putrefaciundi , non acres ; ex Vegetantibus panis , radices , fructus austeriusculi ; ex Animalibus carnes macilentiores salitae , aut pisces sic praeparati , maximè annosiores , se probaverunt. In pueritiâ  
lac ,

lac, sensim panis, dein reliqua danda eô firmiora, quô plus crevit robusta aetas, in senio sensim redeundum ad victum pueritiae.

1058. Potus aquae bonae, frigidae, parvus, soli siti, dilutioni, temperiei inferviens, maximis laudatur effectuum exemplis; cerevisia, & vinum, matura, pura, blanda, admittuntur moderato usu, nimia valde nocent. In pueritiâ lac, sensim dilutius, deinde aqua in robore actatis, in senectute vinum molle, edentulum.

1059. Interim abstinentia summa, diaetae accuratissimae, exsiccantes, emaciantes, rarissimè interpositae, mirifici usus.

\* 1059. Increcente senio introductio nutrimenti per apposita externa, halitu, fotu, balneo, clysmate, unguento, fiet.

1060. Aër purus, campestris, montanus, ut & umbrosus in sylvis, tum quoque insulanus, frigidior, laudatur hîc prae coeteris.

1061. Excretio crassi circâ senectutem tutissimis juvanda, iis nempe, quae magis excitent fibras, & solvant foeces; ubi crocus, sal, gummi aromatica, praecipua sunt cum melle, & molliori vino.

1062. Mutationes fere radicales humorum per res solventia, horum dein excretiones succedentes, ut sunt receptae curationes per

## 396 DIAETA AD LONGAEVITATEM.

per virtutem argenti vivi , aut per decocta attenuantia, exsiccantia, sudorifera, saepe disponunt corpus quam optimè ad expulsum veterascentis, & instaurationem novae vitalis materiae, unde prudens Ars per has ad vitam longam ducit.

1063. Vapores, fatus, inunctiones, balnea, clysmata, ex odoratis suavibus, lenibus, lacte, jure carniū, oleo, animalibus vivis, ariditatis senilis egregia remedia, mortis remorae, vitae longae auxilia, in juventute nocent.

1064. Sed tamen ex dictis (1053. ad 1064.) constat illa, quae corpus vastum, durum, constans, aetatis patiens, reddunt, & morbos validos arcent, plerumque vividissimae mentis aciem per rudiora organa hebetare, impedire. Nec ideò auxilia perfectissimam sanitatem generantia causae sunt, vel auxilia, procurandae longaevitati.

1065. Vanissimae autem jactantiae, nullâ verâ ratione, nec experimentorum fide, firma promissa sunt, quae in hunc scopum commendantur; scilicet usus Entis primi Cedrini Helmontiani; Elixiris proprietatis Paracelsi; Tincturae Physicorum Adeptis laudatae; Entis primi ex metallis, fossilibus, animalibus, vegetantibus; Purgationis repetitae per Hellebori nigri folia; Spiritus sulphuris per campanam; Spiritus florum rorisma-



foris-marini ; Virtutis attrahentis Spiritus ex sano corpore Juvenis ut in Artephio ; animalium longaeavorum , aut saepe iterum renovantium partes ; sigillatorum planeta- rum vitam producentium.

1066. Neque methodo tamen vel opti- mâ vitam in numerosos adeo annos protra- hi posse , ut Chemicî Adepti spem faciunt , ullo modo verisimile fit : imò suis redar- guuntur ubique omnes hi experimentis.

## Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η.

1067. **U**ltima haec pars Institutionum Medicarum docet praecepta ge- neralia , quae tradunt quomodo in ipsâ cu- ratione aegrorum Medicus absolvere queat quatuor haec munera , 1. conservare vitam. 2. tollere causas morbi. 3. auferre ipsum morbum. 4. abigere effectus morbi praesen- tes.

1068. Ut quatuor haec ( 1067. ) perficiantur , corpus aegri arte mutari debet ; quare requiruntur instrumenta , quorum ap- plicatorum efficaciam mutationes necessariae his peragendis excitentur ; illa autem vo- cantur Auxilia , Remedia , Juvantia , vel Medicamenta.

1069. Haec autem remedia sunt appli- canda unicuique aegroto singulari ita , ut in  
eo

eo fiat mutatio necessaria (1068.); quare Medicus scire debet primò quidnam in eo debeat mutare, atque deinde quibus auxiliis ad haec uti; ideòque & nosse debet effectus, qui ab applicatis his in hoc aegro sequuntur; quae ambo tantum potest discere ex iis, quae in hoc aegrotante ipsi innòtescunt ita certò per sensus, aut per accuratum rationium, ut inde perspiciat actionem quaesitam; & auxilia.

1070. Ipsum illud, quidcunque demum sit, quod sic deprehensum in aegro mentem Medici ita instruit (1069.), vocatur Indicans; sed intellectus Indicantis in Medico natus appellatur Indicatio; Id verò, quod cognoscitur agendum, dici solet Indicatum.

1071. Indicans (1070.) proinde poterit esse omne id, quod cognoscitur in Aegro, vel circà eum, praesens, praeteritum, futurum, ita, ut hanc cognitionem (1069.) pariat; quare id ipsum multiplex invenitur.

1072. Tamen omne id (1071.) revocari potest 1. ad vitam in Aegro superstitem, ejus causas, naturam, sequelas, gradus. 2. ad morbum in eo praesentem, ejus causas, indolem, sequelas, symptomata.

1073. Etenim ex omnibus his (1072.) discit Medicus 1. quid sit agendum, ut servetur vita praesens; ut reficiatur labefacta;

ta; ut illa tollantur, quae vitam destruere, vel imminuere, possent. 2. quatenus sint eligenda huic operi instrumenta, quomodo haec adaptari, applicari, certo ordine, & tempore, debeant.

1074. Illa tandem pars Therapeutices, quae tradit regulas, quarum demonstratione deteguntur Indicantia (1070.), & Indicata (1073.), vocatur Methodus Medendi. Cujus jam sequitur brevissimum compendium.

## METHODUS MEDENDI.

1075. **I**N omni aegro vita superest, tum causa vitae, ejusque effectus; vocantur hae Res Naturales, res secundum Naturam, & saepe Natura ipsa.

1076. Quum verò vita semper agat, erunt in Aegro superstites aliquae actiones, quae & sanitatem prius comitabantur, & ideo possunt censerì reliquiae sanitatis prioris, effectusque vitae praesentis, quae nomine Virium donari possunt.

1077. Quae ritè examinatae deprehenduntur pendere à motu humorum per vasa superstite; qualiscunque ille fuerit.

1078. Ille autem reductus ad minima possibilis, saltem adhuc ponit circularem motum humorum per cor, pulmones, cerebel-

rebellum ; in quo consistit ergô vis minima vitae ; quae etiam variis gradibus augeri inde potest.

1079. Patet quidem evidentissimè haec (1075. ad 1079.) Medico deprehensa , & cognita , in aegro , requirere sui conservationem , atque restitutionem in integrum. Quae cognitio etiam appellatur Indicatio Vitalis , vel Conservatoria.

1080. Causa cognita morbi indicat correctionem , vel ablationem , sui. Censetur causa prior effecto ; ideoque indicatio haec vocatur *προφυλακτική* , vel Praeservatoria , utpote eradicatione causae morbum futurum praevertens.

1081. Morbus verô ipse perspectus indicat sublationem sui. Quae indicatio vocatur Curatoria , vel *θεραπευτική*.

1082. Symptomata denique cognita , si dant plus periculi , vel molestiae , quam ut curatio eorum queat differri eousque , donec morbus , unde pendent , sanatus sit , indicant sui mitigationem , & curationem singularem ; diciturque haec Indicatio Urgens , vel Mitigatoria , aut Palliativa.

1083. Unde jam constat non posse indicari bene agenda , & actura , nisi cognita prius Vitâ , hujus causâ , statu , viribus , effectis ; tum & perspecto prius morbo , ejus causâ , statu , viribus , effectis.

1084. Item indicari prius quid agendum sit, deinde autem per quae, quâ dosi, conditione, tempore, ordine, &c.

1085. Quum verò omnia haec (1083.), singula sint in uno, eodemque, aegro, ita ut singula quaeque singulare quid indicent agendum, atque etiam dictent singularia auxilia adhibenda esse, accidit saepe, ut unum horum aliud quid indicet, quam quidem aliud, imò quandoque requirat contrarium quid agendum, aut oppositum remedium, quam quod requirebat alterum indicans. Hinc itaque nata est utilis illa, & celebris doctrina Indicantis, contraindicantis; repugnantis, permittentis; coindicantis, correpugnantis; quae sanè ex dictis facillimè intelligitur.

1086. Quando itaque contingit contraria hujusmodi (1085.) simul occurrere Medico, praestò sunt Axiomata Medica, quae determinant quid eligendum sit ex dubiis, itaque tollunt aliter hinc orituram difficultatem: primaria sunt.

1. Quidquid indicat in aegro, id petit conservationem, vel ablationem, sui.

2. Quidquid in aegroprehenditur secundum naturam, id conservationem sui semper requirit.

3. Quidquid in Aegroprehenditur contra naturam, id ablationem sui jubet.

4. Constat iis, quibus nutritur, corpus.

5. Similibus conservanda similia.

6. Causa curans per remedia morbos est Vita superstes, & propria cuique temperies; illâ deficiente iners medela.

7. Ergo ubi aequè urget Indicatio vitalis, & simul alia quaelibet, erit tum semper satisfaciendum priori.

8. Sed ubi Indicatio impar simul urget, tum semper erit satisfaciendum maximae.

9. Juvantia, & nocentia, praecipuè indicant.

10. Contraria tolluntur contrariis.

11. Natura gaudet consuetis, aegrè fert insolita quaeque.

12. In maximis malis citò, & semel, tentanda summa remedia.

13. In mitiori malo sensim, & repetendo, danda remedia leniora.

## INDICATIO VITALIS.

1087. **V**itae conditio cognoscitur per spectis ejus Viribus.

1088. Hae innotescunt per effecta in aegro edita.

1089. Quae sunt exercitationes superstites functionum adhuc permanentium.

1090. Hae autem sunt propulsiones humorum per vasa, & viscera.

1091. In quibus ergo requiritur copia debita humoris apti, & hujus per ipsa vasa actio continuata.

1092. Vasorum actio unicè pendet à contractione illâ fibrarum, quâ hae ab humore transfluente distractae, & in arcus distentae, se accurtant, in lineas rectas disponunt, versus axin suae cavitatis accedunt, humores propellunt contentos: adeoque hae sunt propriè vires vasorum variè determinandae pro figurâ illorum.

1093. Patet autem has requirere vim elasticam, & contractilem, fibrae, quae renitatur suae distractioni.

1094. Atque simul exigunt in majorum vasorum membranis vasculosis influxum humoris tenuissimi acti in vascula minima nervosa, & in alia, alternè ad pulsum humorum crassiorum per vasa maxima.

## CARDIACA, ET DIAETA AEGROTI.

1095. **Q**Uum verò Cor sit causa princeps omnium illorum motuum, unde stires Vitales aestimantur, hinc auxilia indicationi vitali satisfaciëntia jure quodam vocantur Cardiaca, licet soli cordi proximè non inserviant.

1096. Varia quidem haec esse invenies,

sed tamen reduci posse, & debere, ad aliquas classes; nempe 1. nonnulla restitunt in corpore copiam requisitam humoris sani, vel illi quam proximi (1091.). 2. alia autem infundunt fibrosae compagi vires roboratas, atque conciliant iis requisitam elasticitatem (1092. 1093.). 3. Et quaedam augent copiam, & motum humoris nervosi, ut repletis vasculis minimis roborentur vasa tam majora, quam minora (1094.). 4. denique ultima stimulant fibras motrices, atque sic movent vasa inertia, & humores stagnantes.

1097. Ad primam ergo horum classem (1096. 1.). refero liquores, qui sunt 1. praediti facultate nutriendi corpus ipsius aegri. Et 2. ita praeparati prius, ut non indigeant iis motibus manducationis, digestionis gastricae, atque intestinalis, qui in aegris debilibus, & exhaustis, vel deficiunt, vel nimis tardè operantur. 3. ex tali materie constant, quae sponte sua non putrescat facile, dum scilicet deficit vis expellens satis citò, quia debiles jam sunt actiones viscerum; aut dum in corpore assumptis admiscetur aliquid humoris morborosi & saepe putrefacti, saliva, bilis, aliudve quodcunque fuerit. 4. & denique ne sint talis indolis, quae similis humoribus in aegroto corpore forte morborosis, eorum malignitatem, sicque causam saepe mor-



morbi foveat, augeat, ejusve symptomata excitet.

1098. Tale Cardiacum (1097.) indicatur dandum à defectu virium unâ cum signis exinanitorum vasorum quibuscunque.

1099. Materies autem singularis in hoc Cardiaco requisita cognoscitur, si Medicus primò noverit accuratè indolem propriam humoris vitiosi, qui in aegro praedominans peccat; tum enim eligenda est ea materies Cardiaci, quae opposita sit illi detecto vitio: haec autem doctrina jam tradita habetur in Semeioticis (909. ad 920.).

1100. Ergò, ubi humores vergunt in naturam alcalinam (725. 757. 911.), tum materies cardiaca haec (1096. 1. 1097.) optimè petitur 1. ex decocto bene maturato feminum frumentaceorum lenissimè prius quodammodò tostorum, cum aquâ purâ longâ coctione praeparatorum, ut fiat inde ptisana levior, flos meracior, vel cremor paulo spissior, aut puls crassior, Graecorum; aut ex similibus praeparatis ex micâ panis cum aquâ, ut sunt panadae, vel panatellae, Italorum, variâ pariter spissitate differentes; vel Britannorum, & Germanorum, talia facta ex avenâ celeberrimo usu laudatissima; inserviunt his omnia femina frumentacea, & leguminosa, sic praeparata (1034. 1. 2. & 53. parte prior.), & emulsa, vel decocta,

amygdalarum , pistachiorum ; papaverini  
 seminis &c. 2. Ex fructibus bene maturis,  
 gratis, acidodulcibus, maximè succulentis,  
 recentibus , aut in saccharo conditis , vel  
 in gelatinam versis , cum aquâ coctis , &  
 cum pauxillo panis incocti deinde praepara-  
 tis : talia hîc apta sunt poma acidula,  
 vinosa ; Cydonia matura ; Aurantia Indiae  
 occidentalis , & Lusitaniae ; pyra acidula,  
 vinosa ; Persica ; Armeniaca ; pruna ma-  
 tura , ficcata , Gallica , Hispanica , Damas-  
 cena , acidodulcia ; Cerasa ; Mora ; Uvae ;  
 Uvae passae ; Ribesia ; Rubi fructus ; Baccae  
 vitis Ideae , Sambuci , Ebuli ; Fraga ; &c.  
 3. ex fructibus , pulposis , mollibus , simi-  
 liter diuturnâ coctione in aquâ resolutis , at-  
 que deinde condimento sapidiore gratioribus  
 redditis ; cui apta censentur operi poma Cu-  
 cumeres , Cucurbitae , Melones & Cinarae  
 capita. 4. ex oleribus lacteis , blandis , a-  
 cidulis ; Brassica rubra ; Rapa ; Intyba ;  
 Cichorea ; Portulacae ; Acetosae ; Scorzo-  
 nerae , Tragopogona ; Sisara ; huc spectant.  
 5. Lac animalium solis herbis pastorum ;  
 ejus serum ; lac defloratum ; flos ; lac aci-  
 dum ; lac ebutyratum ; & similia.

1101. Quorum quidem omnium (1100.)  
 delectus , praeparatio , condimentum , co-  
 pia , occasio adhibendi , ordo offerendi , in-  
 dicantur ab aetate , sexu , temperie , victu  
 con-

consuetudo, causa, morbo ipso, statu morbi, duratione ejus praeterita & futura, symptomatibus, anni tempore, coelo, & similibus, quae circa aegrum adsunt.

1102. Si autem indoles acida (912. 760. 725.) deprehenditur praedominari, tum Cardiaca haec (1096. 1097.) petenda sunt ex familiâ animalium (1034. 5.) quorumcunque salubrium: quorum cum partes firmiores diuturnâ, sed levi, coctione cum aquâ resolvuntur in jus tenue, meracius, gelatinam, consummatum, vario gradu tenacitatis differentia: ova eô referuntur: & quae ex his binis variâ compositione nata habentur. Optima hîc quae aliis animalibus pascuntur.

1103. In usu eorum (1102.) observanda iterum omnia, quae modò recensita (1101.).

1104. Si muriatica acrimonia praëst (913. 760.), conveniunt descripta (1000. 1102.) salis condimento orba.

1105. Ubi autem peccat oleosum acre (761. 762. 765.), eadem (1104.) dempto oleo, & pinguibus, dilutiora prosunt.

1106. Quin etiam facilè apparet quibus utendum sit in temperie nimis fluidâ, aut crassâ, humorum: quum praestô sit materies in recensitis modò (1100. 1101. 1102. 1103.) ad hosce casus apta.

1107. Ad classem alteram Cardiacorum (1096. 2.) censentur pertinere illa, quae 1. fibrillis nimis flaccidis vasorum applicant partes illas, quae adhaerescences iis, eas rigidiores reddunt: qualia sunt omnia, in quibus moderata virtus adstringens laudatur; quae sunt inprimis poma, & pyra, austriuscula, Cydonia, Punica; fructus leniter acerbi, corni, arbuti, mespili, omnis Myrobalani, glans quercina, Berberis, Myrti, Acaciae, Rosae, Sorbi, Hypocystidis; Herbae, Pentaphylla, Tormentillae, Lapatha, Plantago, Portulaca, Pimpinella, Bistorta, &c.; Flores Granatorum, Rosarum; Cortices Granatorum, Peruviani, Tamarisci, Radicum Capparidis, Myrobalanorum; Succum Acaciae, Pruni Sylvestris, Omphacii, Mastiche, Thus, sanguis Draconis, Lacca, vina Austera; Terrestria, vel Metallica, Boli, Rubricae, Cretae, Alumina, Vitriola, Chalybs. 2. quae fibras corporis resolutas à se mutuò vi austerâ compingunt in unam molem; qualia sunt omnia praecedentia, sed inprimis quae valde acerba deprehenduntur; ut sunt vegetantia & fossilia austerissima; fructus immaturi, vitriola calcinata, ossa acriter calcinata. Inprimis si juventur illa motu frictionis. &c.

1108. Indicantur talia (1107.) necessaria esse tum, quando adest magna debilitas in  
toto

toto corpore, unâ cum pallore, frigidityte, torpore, colluvie serofâ, flaccidityte corporis notabili.

1109. Sed in exhibendis iis prudens requiritur cautela petenda maximè ex jam dictis (1101.); sed praecipuè tamen ex consideratione certi experimenti hujus, quo scimus austerâ in primas vias nimis, in interiores difficulter, agere.

1110. Classis autem tertia Cardiacorum (1096. 3.) videtur consistere inprimis in subtilissimâ parte animalium sanorum, juniorum, vegetorum, derivatâ copiosè in corpus debile ex defectu hujus: fieri id videtur 1. inspirando exhalationes ex iis emanantes, dum fomenti instar applicantur corpori aegro. 2. sugendo lac ex ipsis uberibus. 3. primo jure decocti carnis clauso vase parati assumendo. 4. vaporibus odoratis, blandis, ut Croci, Jasmini, Citrii, Aurantii, Melissae, & similium. 5. vino fragranti, limpido, suavi, fatis volatili, & mobili.

1111. Cardiaca haec necessaria sciuntur, quando cognoscuntur vires deficere, simulque apparent evidentiâ signa languoris ad omnes motus musculares, simulque valde impediuntur exercitia sensuum, inprimis verò si tum simul cernuntur signa clara humorum crassiorum per reliqua vasa. Hinc & alia intelliguntur.

1112. Ultima tandem classis Cardiacorum (1096. 4.) multiplex profectô admodum invenitur, quae ideô in varias subdividi debet doctrinae facilioris ergô. 1. itaque sunt Succii recentes omnium illorum fructuum, in quibus gratus, acidulus, penetrans, sapor, atque reficiens, suavis, fragrans, odor, inest, simulque aliqua vis nutriendi. Primarii sunt Aurantium tam acidorum, quam dulcium, inprimis Curaçavicum; Granatorum maturorum; Pomorum fragrantium vinosorum; Ananas; Melonum; Ceraforum sapidissimorum; Fragorum; Mororum; Baccarum Rubi Idaei; Uvae odoratae; Ribesiorum nigrorum; Prunorum acidulorum; malorum Armeniacorum, Persicorum; & multa similia: quae in siccâ, calidâ, debilitate sunt optima stimulantia. 2. huc spectant odores diffusi vegetantium odoratorum, quorum suavecolentia est  $\alpha$ . lenis, & fere unicuique tolerabilis, ut habentur Cortices Arantiorum, Citriorum, Limoniorum; Flores Borraginis, Betonicae, Botryos, Buglossi, Croci, Jasmini, Liliorum, Ladani, Melissae, Melissophylli, Myrti, Philadelphiae, Sambuci, Sassafras, Hyacinti tuberosi, Radicis Rhodiae, &c. vel  $\beta$ . acrior & calidior, ut in Abrotano, Absinthio, Amomo, Agallocho, Anetho, Angelicâ, Aniso, Artemisiâ, A-

coro,

coro, Cypero, Calaminthâ, Chamaepyti, Cumino, Chaerophyllo, Caro, Coriandro, Caryophyllis, Cinnamomo, Cardamomo, Dictamno, Galangâ, Hyssopo, Imperatoriâ, Junipero, Lavendulâ, Lauro, Mace-re, Menthâ, Majoranâ, Maro, Mastichinâ, nuce Myristicâ, Ocymo, Pulegio, Rutâ Sabinâ, Salviâ, Serpillo, Thymo, Zingiberi &c. quo & Gummi Ferulacea, & alia, reducuntur, Ammoniacum, Bdellium, Elemi, Galbanum, Myrrha, Opopanax, Sagapenum, Asa foetida, Camphora, Styrax, Liquidambar. 3. odores quidem planè singulares in multis mirificas stimulationes producentes, ut inveniuntur in Ambaro, Benzoino, Castoreo, Moscho, Styracè tam siccâ quam liquidâ, Zibethâ. 4. Ex his omnibus intra corpus receptis, ibique agentibus. 5. numerosa hic est series eorum, quae volatili, tenui, acri, stimulante, vi praedita nervos mirè afficiunt, & reduci queunt  $\alpha$ . ad acidâ, ut sunt vina, & aceta, tam simplicia, quam aromaticâ facta.  $\beta$ . ad spirituosa dicta, ut sunt omnes Spiritus vegetabiles fermentatione parati simplices, vel Aromatum odoribus repleti.  $\gamma$ . Spiritus Alcalinos volatiles simplices, aut unitos Alcoholi, aut & oleis Aromatum.  $\delta$ . olea aromatum stillatitia, vel pressa.  $\epsilon$ . denique composita ex his innumerabilia pro arbitrio artificis,

## 412 CARDIACA, ET DIAETA AEGROTI.

ficis, quo epithemata, linimenta, potus medicati, suffimenta pertinent: ut & huc referas aquas stillatitias aromaticas simplices, compositas; balsama odorata arte facta simplicia, composita; Elaeo-sacchara varia; Confectiones cardiacas nomen à primario accipientes; Spiritus aromaticos, oleosos, compositos, cardiacos; Sales, volatiles oleosos, aromaticos, spirituosos, admodum varios; Tincturas cum alcohole paratas ex fragrantissimis quibusque aromatibus: & multa similia pro cujusque genio inventa.

1113. In usu horum omnium (1112.) maximâ cautelâ opus: data enim in corpore, ubi humores haerent in vasis non dispositis ad facilem liquidorum transmissionem, excitant motum, qui tendit in destructionem citam. Itaque iterum attendendum ad omnes cautelas datas (1101.).

1114. Indicatur hoc genus Cardiacorum (1112.) à defectu motus circularis liquidorum orto ex solâ inertîâ fibrarum unâ cum humoribus blandis, vasisque transmittendo aptis: quænam verò singularis species eligenda sit, docemur consideratâ indole mali peccantis, & Cardiaci adhibendi.

1115. Quin etiam patet simul jam actum esse de victu aegri ad curationem morbi requisito (1097. ad 1115.).



## ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ.

1116. **M**Orborum causae (797. ad 801.) accuratè cognitae per sua signa (871. ad 1012.) indicant sui ablationem, si ergo in partibus firmis haerere considerantur, requirunt ablationem destruentis, vel laedentis, externi, aut unionem partium morbosè separatarum, vel separationem partium morbosè unitarum, aut ablationem superflui, vel denique supplementum deficientis.

1117. Indicantia haec (1116.) occurrentia in partibus majoribus, & sensilibus, requirunt Chirurgiam, quae tota occupatur, ut per suas operationes manu artifice peractas, vel per sua remedia applicata, haec quinque dicta peragat. Ut videri potest apud optimos in his Auctores, Paracum, Hildanum, Solingen, Dionis, &c.

1118. Si verò in interioribus haeserint eadem (1116.), aliis remediis, licet in operatione ultimâ similibus, sunt oppugnanda: inter quae quum Venena sint primaria, primò de his agendum erit.

## Α Ν Τ Ι Δ Ο Τ Α.

1119. **V**Enena velocia (796.) ingesta, vel applicata (744. 1. 4.), causae

fae morborum factae vi propria, vel corruptione prius inductâ partibus infectis, indicant 1. causae venenatae ablationem. 2. veneni jam suscepti, vel inevitabiliter suscipiendi, correctionem. 3. aut ejus expulsionem ex corpore. 4. mitigationem symptomatum. 5. munitionem corporis contrâ vim ingerendi, vel applicandi, Veneni.

1120. Causa venenum spargens, atque communicans corpori, vel athmosphaerae immiscens miasmata, vel corpori jam applicata illi miasmata inspirans, si sensibilis est & cognita, facilè aufertur. 1. α tollendo rem venenatam, & quidem inprimis eam flammis vivis, magnisque, comburendo. β. Aërem corrigendo, qui miasmata defert; quod fere optimè fit vaporibus densis rerum accensarum, vel calefactarum, quae oppositam habent vim veneno cognito. Ut in peste, causticis, alcalicis, halitibus putridis, conducunt fumi aceti, spiritus salis, pulveris pyrii: in acidis exhalationibus venenatis, sparsi odores spirituum alcalinorum oleosorum. γ. aërem mutando, dissipando, renovando, per ventum arte factum; inprimis si simul per ignes magnos accensos transmitti queat arte Hippocraticâ. δ. eum fugiendo, vel ad alteram partem montium altorum transcendo. 2. Tollendo, vel corrigendo, id materiae venenatae, quod corpori jam ingestum, vel & applicatum, est.

1121. Venenum ipsum praefens cognitum corrigitur applicatione talium, quae valent inertes reddere illas ejus qualitates, quibus nocet corpori.

1122. Quae 1. in multis venenis haecenus vix noscuntur nisi deleteriâ tantum facultate vix patente nisi per solam mortem infecti; 2. in aliisprehenduntur per mirabilia, & vix explicanda, effecta; 3. in nonnullis per effecta in aliis notis morbis occurrentia; 4. denique in quibusdam intelliguntur à priori, quod ajunt, dum cognitâ veneni naturâ facillimè praevidentur.

1123. Priora (1122. 1.) dicta nocere toti substantiae haecenus indicant accuratè opposita remedia, aequè parum intellecta, ac illa venena quoad scientiam effectus. Haec propriè vocantur ἀντίδοτα, ἀντίδοτοι, ἀλεξι-κακα, ἀλεξιφάρμακα, ἀλεξιθήρια, θηριακά. Quae solâ experienciâ cognita ex historiâ Venenorum peti debent.

1124. Secunda (1122. 2.) dicta obesse qualitate occulta similiter exigunt remedia mira, Specifica dicta, vix nisi mero casu inveniendâ, in historiam Venenorum referenda, inde petenda.

1125. Tertia (1122. 3.) antequam interimant, dum effectus prius morbosos produ-  
cunt, quibus ita corrumpitur fabrica corporis, ut in certis morbis cognitis, requirunt

ut adhibeantur illa remedia, quae Medicina observavit valere in sanatione talium morborum, qui similibus effectis se distinguebant.

1126. Si cognoscuntur venena (1122.4.) applicata, vel applicanda, corpori, tum verò opus erit illa medicamenta adhibere, quae habeant praesentem, promptam, vim cnervandae malignitati illi cognitae; haec autem sunt quamplurimum oppositâ malignitate valida, ideòque nocitura corpori omninò, nisi illud prius venenum adesset.

1127. Unde cernimus veneni indolem cognosci quidem ex historiâ Physicâ, & Medicâ venenorum; ut & ex scientiâ Mechanicâ; tum ex Chemicâ; denique etiam ex Anatomicâ effecta exhibente. Atque Scientia hinc nata hîc Indicat.

1128. Atque ex illâ habitâ indicatione (1127.) scitur remedii correcturi materies, praeparatio, dosis, applicatio, moderamen.

1129. Primaria autem, & fere communia, contra omnia ferme venena, Antidota, quae ideòque summi sunt usus ubi cognoscitur venenum datum, sed ignoratur singularis ejus natura, sunt haec praecipuè: Aqua sincera, calidior paululum cruore nostro salubri, affatim, subitò, diu, ingesta, injecta; applicata; tum lixivium leve ex aquâ communi & sapone veneto, simili copiâ, modo, tempore, usurpata; aut aqua simplex

plex saponacea facta cum oxymelle simili usu adhibita; olea blanda, recentia, pressa ex lenibus, pinguibus & farinaceis, seminibus, statim, multum, diu hausta, injecta, applicata, vel similia ex oleo animalium recentium cum multâ aquâ subitô decocta; tum plerumque in multis celeribus Acetum; denique & Opium. Generale autem antitoxicon prophylacticum nullum omninô cognoscitur hætenus, quin & repugnat tale esse.

1130. In dandis antidotis singularibus summâ prudentiâ opus: quum enim hæc polleant singulari virtute corrigendi hujus, illiusve veneni tantum, habent ut plurimum violentiam æquè magnam, vel majorem, ac est illa, quam debellant. Ideoque hæc simul concurrentia in corpore, se mutuô destruant, inertia evadunt, nec multum nocent: si verô adsunt solitaria æquè noxia sæpe deprehenduntur, ac ipsa venena, quibus domandis exhibentur.

1131. Antidota autem hæc omnia five universalia (1129.), five singularia (1130.), fuerint, possunt, & debent, ita præparari, applicari, dirigi, ut apta sint citô, perpetuô, intactis suis viribus, pervadere ad illa loca, in quibus haeret virus, atque ibi illud domare: debet ergo intelligentiæ Medici semper præstô esse classis, quæ complectitur omnes diversitates applicationum, quæ primariæ sunt æris

suffumigium ; vapor ficcus , vel humidus ; ad pulmones ; Haustus ; Clyfma ; Epithema ; Balneum , Fomentum ; Injecta in uterum , aut in veficam , fauces , &c.

1132. Venenum fufceptum expellitur ex corpore 1. minuendo refiftentiam eo loco , per quem tutiffimè expediri queat , ubi minus nocet , ubi exitui proximum habetur , ubi viscera vitalia minus laedit ; tum enim vi Vitae , vel Medicamentorum , eò pellitur , ibi expelletur. Id fiebat olim mirabili tum habito , jam industriâ Rhedi facilè intellecto , fuctu Marforum , & Pfyllorum ; hodie per cucurbitas magnas , validas , cum multâ flammâ applicatas , faepe renovatas ; per fomenta tepida & valde emollientia ; per hirudines ; fcarificationes ; friftiones ; calores ; Emplafta. 2. Attraftione magneticâ , quâ corpus vi fingulari trahens venenum , aegrum liberat , ut de carne venenatae beftiae , de lapide Ceraftis , calculo ferpentum , & fimilibus , narratur. 3. omni medicamento validiffimè diluente , & movente ; qualia funt vomitoria cita , purgantia celeria , fortiffima fudorifera , & forte diluentia diuretica. Unde Diafcordia , Mithridatia , Theriacae , Orvietana , Confectiones opiatae , profunt , quibus tamen minus tutô fides adhibetur ut univerfalibus vel Therapeuticis , vel Prophylacticis , antidotis. 4. partem toxi-

co affectam quam ocysimè auferendo, ne sincera trahat, quod caustico ex ferro ignito optimè fit.

1133. Symptomata saeva venenorum effectus jam sensibiles, juxtâ doctrinam pathologicam non difficulter reducuntur in suas classes; tumque poterunt curari ac si essent morbi quidam singulares; de quibus postea agetur.

1134. Corpus munitur contra venena applicanda imprimis 1. usurpando largiter antidota generalia, & singularia, quae modò tuta sint, si prius cognoscitur indoles ejus toxicæ, quod praevidetur applicandum. 2. partem corporis, cui metuitur, inungendo iis, quae leniter oleosa. 3. omnes partes corporis retinendo in perspiratione aequabili: sed nullum tutum hic universale cognosci jam dictum (1129.), licet jactentur plura.

1135. Quae autem de venenis hæctenus (1119. ad 1135.) dicta, similiter intelligenda sunt etiam de peste, contagio, & aliis. Videntur autem optimè dicta intelligi ex subsequenti praecipuorum toxicorum & antidotorum forte non inepto compendio.

1136. Enimverò 1. nonnulla Venena possunt referri ad acria manifestò, sed ita ut acrimonia singularis sit, & tamen phlogistica, caustica, gangraenam creans, putrefaciens:

faciens: talia sunt primaria. Cobaltum. Arsenicum Citrinum. Arsenicum rubrum. Arsenicum album sublimatum. Realgar. Lapis Armenus. Lapis Lazuli. Hæc applicata internè, externè, inflammant, erodunt, dolores, ardores, ficcitates; primò in primis locis læsis, mox in toto corpore, excitant; hinc ori, faucibus, oesophago, ventriculo, intestinis, morbos acutissimos inflammatorios creant; nauseas, vomitus, dysenterias, choleram, Ileum, inflant; palliditatem lividam producunt; inde vertigines, convulsiones, mortem, aut hâc evitatâ, pallorem, paralyfin, contracturam. Indicant Aquæ tepidæ, acidiusculæ, mellitæ, copiosum, diuturnum, bibendo, injiciendo, balneando, usum promptissimum. Si vomitu, & alvo, rejici potest, eò melius, & magis repetendum. Jura pingua, lac, olea, oleosa, butyrum, profunt. Deinde requirunt usum diuturnum laxantium, mollium, pinguium, acidulorum, tam ingerendo, quam balneo.

1137. Ex vegetantibus similia (1136.) fere sunt, Aconita. Anacardium. Anemone. Apium risus. Apocynum. Arum. Azedarach. Cataputia. Chamaelæa tricoccos. Chamaeleon niger. Clematidis. Colchicum. Corona Imperialis. Cyclaminum. Dracontium. Elaterium. Esula. Euphorbium. Flos Africanus. Grana Nubiae. Helleborus albus, niger,



ger, viridis. Hermodactyli. Hyacinthi. Laureola. Mezeraeum. Mel venenatum. Napellus. Nigella Sylvestris. Oleander. Ranunculi. Ricinus. Scammoneum. Semina oleosa, diuturnâ corruptione acriter rancida facta. Tithymali. Thapsia. Horum effectus fere similes ac modò dicta (1136.); quin & indicatio perfectè eadem.

1138. 2. Alia violenta quidem sunt & acria venena, ita tamen ut simul quasi viscosa, in ventriculo haerentia, & singulari modo cerebrum, nervosque, inde afficientia: ut sunt Chrysomela. Cicutamajor, minor Petroselino similis, aquatica Gesneri. Huc ob aliam causam refer Crocum. Daty-ra. Hyoscyamus. Nux vomica. Oenanthe apii folio, succo viroso. Opium. Solanum Melanocerafos. Hinc vertigines, scotomiae, deliria, furores, nauseae, vomitus, dysenteriae, convulsiones horrendae, apoplexia, mors. Indicant praesentissimum usum promptissimi vomitorii; aquosa oleosa, mellita, acidula, ingenti copiâ ilico ingerenda, assidue repetenda, per clysmata, balnea, potus. Sedato morbo sudorem per Theriacaliam fortem, & saepe repetitum. Tum diaetana mollem, & tenuem.

1139. 3. Sunt venena acria manifestâ aciditate; ut nempe  $\alpha$ . Spiritus Salis. Spiritus Nitri. Aqua regia. Aqua fortis. Spiritus

sulphuris. Spiritus vitrioli.  $\beta$ . eadem acida unita metallicis corporibus, & hinc validissima, ut sunt solutio Auri, atque ejus Crystalli. Solutio Argenti, & ejus vitriolum, lapisque infernalis. Solutio Cupri, atque infusalis. Solutio argenti vivi in Spiritu nitri, falis, Aquâ forti, Aquâ regiâ, aut ejus calcinatio cum oleo vitrioli; & hinc natus Mercurius praecipitatus ruber, albus, viridis; sublimatus corrosivus & dulcis; calx, turbith. Impregnatio antimonii cum aquâ regiâ, & hinc calx escharotica. Ab his nascuntur sapes horrendi, foetores acidi, inflammationes, erosiones, escharae gangraenosae, nausae, vomitus, dysenteriae, cholerae, tormina atrocissima, cardialgia, Iliaca, colica, tumores ad glandulas, cadaverosus foetor, salivatio, syncopae, mors. Petunt haec dilutionem per aquea; obtusionem per olea; inversionem per lixivium saponacea, vel leviter alcalica; absorbentia fortissima acidorum; deinde verô, impetu sedato, frequentem usum olei, juris pinguis, & similium emulsionum.

1140. Tum 4. alia venena acria manifestô alcalina cognoscuntur; suntque cineres ustorum vegetantium. Alkali inde factum; idem cum calce saxiusti igneum redditum. Ova, humores, caro, omninô putrefacta; sales inde separati; iidem ignei facti per sublimatio-

tionem ab alcali fixo, calce, lapide calaminari, cretâ, ferro, &c. haec autem creant citissimam, violentissimam, igneam, inflammationem, erosionem, gangraenam, dolores urentissimos ubique, sitim immanem, convulsiones, febres acutissimas, foetorem cadaverosum, dissolutionem intimam humorum, putrefactionem horum & viscerum, mortem. Petunt autem ad curationem dilutionem per aquosa laxantia; obtusionem per oleosa, pingua, terrestria pingua; inversionem per acida diluta, volatilia, facile mobilia; deinde dietam diuturnam ex acidulis, oleosis, emollientibus.

1141. Et 5. quaedam habentur acrimonia singulari saepe lethalia, ita tamen ut illa acrimonia vix se manifestet alio, quam deleterio in homine, effectu. Aes. Aëris calx usta. Aëris calx per corrosiva. Aëris flos. Ejus squamma. Antimonii crocus. Ejus calx ustulando parata. Ut & vitrum hinc factum. Flos Antimonii sincerus solo igne, aut & ope salis ammoniaci factus, dein ablutus. Haec assumpta nauseas, vomitus, dysenterias, choleras, hypercatharces, dolores atroces viscerum, spasmos, tetanos, syncopas, anxietates horrendas, mortem, creant. Exigunt pro curatione, diluentia; emollientia; obtundentia; acida; mellita; supernè, in-

fernè, externè, statim, diu, usurpata; deinde opiata, & oleosa.

1142. Quin etiam numerantur 6. Venena acria merè mechanica. Adamas. CrySTALLUS montana. Limatura ferri. Limatura aeris. Alumen plumosum. Vitrum contusum. Et similia. Haec pungunt nervos, vulnerant vasa, convulsiones, haemorrhagias, excitant, inde ulcera, & similia mala. Indicant usum olei, butyri, citum, copiosum.

1143. 7. Sunt toxica quae constringendo, incrassando, obstruendo, exsiccando, citâ vel lentâ morte perimunt. Calx viva, & extincta forte huc spectat. Gypsum. Plumbi minera, limatura, squamma, calx, cerussa, minium, vitrum, lithargyrium. Cinis stanni usti. Synopsis. Psyllii semen. Cynosbati spongia. Fungi. Agaricus. Viscum. Haec conglutinant, constringunt, praefocant, miserrimos hinc morbos, & saepe, post omnem miserabilitatem languorum tolerantium, mortem, creant. Demonstrant necessitatem usus vomitoriorum, purgantium, diluentium, acidorum spirituosorum, alcalium oleosorum spirituosorum, saponaceorum omnium; quae citò & diu continuato, vel repetito, usu adhibenda.

1144. Octavô denique habentur venena heteroclita, toti vitae adversa, nec, explicato effectu vel virtute, hætenus bene nota,

ta, quae assumtu, applicatu, aut ictu, mortem inducunt. Cantharides. Aranea. Tarantula. Aspis. Vipera. Cerastes. Prester. Seps. Scorpius. Canis rabidus. Bufo. Buprestis. Stellio. Salamandra. Lepus marinus. Pastinaca marina; & similia. Haec varios, miros, vix explicabiles, effectus edunt, dein necant. Indicatio in his, si internè assumta sunt, statim evacuare per vomitum; summopere diluere per aquosum; maximè emollire per laxantia, emollientia, oleosa; putrefactioni resistere per acida spirituosam, & salina. Si externo ictu, morfu, applicatu, agunt; tum indicatur veneni eductio per locum contagii, fugendo, scarificando, urendo, emolliendo, fovendo; tum sudorem fortiter eliciendo per antidota penetrantia, diluta, putrefactioni adversa; Veneni enervatio per acida, salina, vel per specifica antidota.

1145. Ultimò sunt quaedam uno momento specie halitus suffocantia, ut carbonis clausi vapor. Aër subterraneus diu reclusus. Halitus vini fermentantis. Farina volatilis fungi perniciosi. Fumus sulphuris. Et similia multa potius tacenda. Haec ex praecedentibus intelliguntur pulmoni, nervisve, applicata, aut vix sanari queunt.

1146. Causae autem remotiores morborum, sensu cognitae, faciliè mutantur, aut

tolluntur: nam indicant mutationem in sex rebus nonnaturalibus.

1147. Si autem eadem (1146.) magis rectae sunt, tamen cognitae per sua effecta sensibilia, indicant per haec sua phaenomena remedia apta.

1148. Decursus etiam horum phaenomenon (1147.) ritè observatus docet nos, quo auxilio, tempore, ordine, modo, & viâ, utendum sit, ut causa morbi proxima in corpore humano corrigi, vel expelli, queat.

1149. Quin etiam docet nos accurata observatio eorundem, quid deficiat, & quae supplementa adhibenda sint.

1150. Ut & qui motus excitandi, sustinendi, sopiendi, minuendi, sint in eundem scopum.

1151. Ordinata igitur in his, & exacta, cognitio effectuum docet egregiè correctionem, & ablationem, causae.

1152. Unde etiam cognoscitur, quod hactenus duplex via sit cognita, quâ itur in cognitionem causae, nempe methodicâ, vel specificâ dictâ.

1153. Methodica quidem ut cognoscat causam proximam, & tollat, utitur his auxiliis, & viis 1. accuratissimè explorat & ordinat phaenomena (1147. ad 1152.), observatque sollicitè naturae decursum. 2. si videt vitam labascere in iis agendis, quae ad expug-

expugnationem causae morbi requiruntur, illi succurrit per cardiaca (1095. ad 1116.) administrata, vel per ablationem impedimentorum, quô evacuantia mali praeternaturalis ducunt. 3. ubi autem cernit actiones vitae nimis insurgere, adeoque causam morbi magis intricare, quam extricare, tum adhibet moderamen ut reducantur ad eum gradum impetus, qui hîc requiritur; quod efficit per aquosa diluentia, blanda laxantia, mollia glutinosa, evacuantia causam materialem virium; opiata, anodyna. 4. nihil omninô agendo, vel mutando, nisi quod evidentissimè cognoscitur faciendum ex indicatione clarissimâ.

1154. Specifica autem dicta tollit causam morbi simpliciter applicando tale quid, quod solo usu novit eô valere, non attendens ad illa quatuor modô dicta (1153.). Quaerit ergo nomen mali, & remedium; ut in curâ febris intermittens per corticem peruvianum, doloris per opium, veneni singularis cujusque per cognita sua singularia, propria, corrigentia, vel attrahentia, aut expellentia antidota.

## INDICATIO CURATORIA IN MORBIS SOLIDI.

1155. **S**I ipse morbus haeret in partē solidā simili, cognitus facillimè praebet indicationes suas.

1156.

1156. Etenim si est unitas ibi soluta requirit ad curationem 1. ablationem rei peregrinae, vel mortuae, interpositae inter partes separatas. 2. harum adductionem ad se mutuo usque in situm naturalem. 3. quietem non turbatam in hac ipsa unione. 4. conservationem in naturali sua humiditate; calore, mollitie. 5. conglutinationem iterum naturalem ope advecti, applicati, moderati, sani, liquidi nutritii.

1157. Tria priora efficit dextra Chirurgi; quarto conducunt balsama, unguenta, olea, mollia, blanda, putredini contraria. Balsami de Tolu, Peru, Palmâ, Copayvâ, Mechâ, Terebinthina nativa, Butyrum, medulla; unguenta, balsamus Arcaci, Unguentum basilicum; oleum pressum olivarum, semen lini, eadem cum floribus herbarum balsamicarum digesta, ut oleum hyperici, verbasci, althaeae, agrimoniae, liliorum alborum. Et quae ex his infinita alia. Quinto satisfit praescriptione requisitae in aegro diaetae.

1158. Rigiditas nimia partium solidarum cognita indicat laxationem earundem: quae obtinetur 1. fotu, balneo, potu, injectu, vapore, aquae tepidae, 2. iisdem modis applicato decocto leni emollientium vegetabilium: Althea. Malva. Verbascum. Acanthus mollis. Parietaria. Mercurialis. Semen foeni



foeni Graeci, Cicerum, Lini, Malvae, Cydoniorum, Tritici, Avenae. profunt. 3. iisdem modis applicato molli oleo. (1157.4.). 4. moderato, saepe renovato, motu.

1159. Flacciditas nimia partium solidarum cognita indicat roborationem earundem: quae obtinetur 1. Cardiacis iis, quae descripta habentur (1107.). 2. majori motu corpori applicato per frictiones, vectiones, exercitia, ut callositas paululum densior concilietur parti. 3. calore sicco. 4. simili victu, & aëre.

1160. Ex quibus etiam patet, quid agendum sit in elasticitate auctâ, vel imminutâ; in debilitate nimia fibrae ultimae; in fragilitate ejus; in nimia ejus contractione, vel distractione.

1161. Morbi partis solidae organicae haerentes in mole, situ, cohaesione, indicant quae jam dicta (1116. 1117. 1118.).

1162. Reliqui autem morbi in partibus solidis praesentes, pendent inprimis à vitio fluidorum (vid. Aetiologiam totam Pathologiae.); quare nos jam ducunt ad considerationem hujus.

## INDICATIO CURATORIA IN MORBIS CORRIGENS FLUIDA.

1163. **H**UMORES in morbo peccantes perspecti indicant sui immutatio-

tionem, vel evacuationem; idque, vel in toto, vel in unâ parte affectâ.

1164. Vitium humoris in unâ parte singulari haerens semper ponit, vel tenacitatem liquidî, vel malam conditionem solidi, & ideô indicat mutationem in meabilitatem, tam viae, quam materiae.

1165. Materies in loco nimis tenax mobilis, & meabilis, redditur 1. per diluentia aquosa, tepida, specie potus, fatus, vaporis, balnei, injecti, applicata eô modo, ut quam proximè loco obsessio adsint, ac fieri potest. 2. per salina resolventia similiter appositâ. Nitrum. Sal prunellae. Sal polychrestus, Nitrum stibiâtum. Sal gemmae. Sal marinus. Sal ammoniacus. Flos salis ammoniaci cum sale alcali fixo. Sal Borax. Fel vitri. Sales vegetantium ustulatorum. Sales alcalini fixi. Sales alcalini volatiles. Tartarus solubilis. Tartarus regeneratus; sunt praecipua. 3. per saponacea ex oleo pressio & alcali fixo. Ex oleo stillatio & alcali fixo. Ex oleo pressio & alcali volatili. Ex oleo stillatio & alcali volatili. Bilis animalium eô spectat. Et succi plantarum absterfivi. Lactucae. Chondrillae. Sonchi. Hieracii. Taraxaci. Scorzonerae. Tragoponi. Cichorei. Endiviae. Saponariae, hic praecipuae, & egregiae. 4. per illa, quae causas singulâri coagulum facienti contraria sunt.

sunt. Ut in coagulo per acida facto usu alcalium leniorum ; in coagulo glutinoso & pingui usu saponaceorum ; in coagulo à quiete usu salium & saponaceorum ; in coagulo phlogistico , nitrosis , & saponaceis herbaeis ; 5. per Cardiaca (1112.), salina , aromatica , oleosa , spirituosa , quatenus ut stimulantia considerantur.

1166. Via impedita redditur meabilis  
 1. aperiendo meatus potui , fotu , vapore , balneo , aquae calidae , emollientibus & salinis temperatis , medicatae ; calore moderato ; frictione sicca , vel humidâ , calidâ.  
 2. idem fit materiem impactam unâ cum vasis oppletis fovendo , molliendo , agitando , coercendo , ut emollitio , putrefactio , suppuratio , totius loci affecti resolutio in pus fluidum contingat. Huc faciunt Farinae blandae , lentae , tritici , fecalis , avenae , lini , fabarum , pisorum , lentis , orobi , foeni graeci &c. tum Radices emollientes Malvae , Bismalvae ; liliorum alborum , ceparum asfarum ; Flores Altheae , Verbasci , Meliloti ; Folia Malvae , Bismalvae , Acanthi , Mercurialis , Parietariae ; Ficus ; Vitelli ovorum ; Gummi aromatica acria , Ammoniacum , Galbanum , Opopanax , Sagapenum ; Butyrum recens ; tum quae ex his formâ cataplasmatum , unguenti , emplastri , componuntur. 3. materiae sic praeparatae viam aperiendo per sectionem.

432. INDICATIO CURATORIA IN  
nem scalpello factam, vel per caustica applicata.

1167. Humorū vitia in totā massā eorum peccantia cognita prius juxta doctrinam Semeiotices (910. ad 918.) indicant sua remedia contraria.

1168. Nempe fluiditas nimia requirit inspissationem; quae acquiritur 1. victu gelatinoso ex animalibus, & vegetantibus. 2. potu aquoso farinoso non fermentato. 3. auctā actione viscerum per ea, quae praememorata (1159.). 4. usu idoneo Cardiacorum (1107.).

1169. Spissitudo autem si peccat exigit attenuationem: haec procuratur 1. victu ex cibis imprimis fluidis, & levibus; jura carniū cocta cum oleribus moderatē attenuantibus, Endivia, Cichoreo, Chaerophyllo, Apio, Brassicā, & panis optimē fermentatus, conducunt. 2. Condimentis acrioribus, Sinapi, Erysimō, Erucā, Sisymbrio aquatico, Nasturtio, Raphano hortensi & rusticano, Lepidio, Cochleariā, Capsico condito, cepis, porris, alliis, aromatibus orientalis & occidentalis Indiae. &c. 3. potu acriore, fermentato, vetustiore, spirituosō, aromatico, cerevisiā, vino, hydromelle, vino in spiritus converso. 4. diluendo potu, fotu, balneo, injectu, aquosorum, adjutorum per calorem, vel & motum cursus, exer-

exercitii, frictionis, equitationis, vectionis. 5. per valida stimulantia sudorifera, diuretica, purgantia, vomitoria, epispastica, mercurialia, aromatica de quibus postea (pag. 448. &c.). 6. per valida resolventia, ut sunt alcalini fixi, volatiles, saponacei (1165. 2. 3. 4.) sales, atque ea, quae ex his componendo fiunt.

1170. Motus verò nimius humorum quorumcunque per vasa circumducendis, fecerendis, excernendis, humoribus dicata, indicat sedationem ejus, quae fit 1. ablato illo singulari stimulo, qui fibras irritans motum illum excitat; aut & correctione ejus per sua contraria; cognoscitur inprimis indagine acris, & correctione ejus statim secutura (1172. ad 1178.). 2. imminutione totius massae fluidorum. 3. quiete inducta per opiata, & anodyna.

1171. Idem ille motus nimium imminutus excitat excitationem majoris impetus, qui produci potest 1. ablato impedimento per remedia corrigentia, vel auferentia. 2. ope Attenuantium (1169.) & Cardiacorum (1095. ad 1115.).

1172. Acrimonia humorum in genere cognita (910.) etiam in genere indicat reductionem acrimoniae ad inertiam majorem; haec autem efficitur 1. victu assiduo ex iis alimentis, quae fere insipida, farinacea, ge-

latinosa, blandè oleosa, qualia sunt lac cum pane & paucis acidum prohibentibus. Jus carnis recentis, junioris, coctione, vel expressione, paratum. Carnes, piscesque, recentes. Panis triticeus bene fermentatus, perfecte coctus. Amygdalae bonae, recentes. Nux Cocos utriusque Indiae cum suo lacte. Pistachia. Fructus horaei suaves perfecte maturi. 2. potu aquae. 3. quiete animi, & corporis. 4. diluentibus aquosis, lenientibus farinosis, & suboleosis, emollientibus blandis; quae fiunt specie ptisanæ, emulsionis, fomenti, balnei, haustus, clysmatis, injecti. 5. Opiatis & anodynis.

1173. At acrimonia Acida (912.) petit correctoria sua; ut sunt. 1. victus ex ovibus, carnibus, piscibus, suboleosis, unâ cum condimentis humores in alcalescens determinantibus (1169. 2.). 2. potus aqueus, vel oleosus pinguis, ut ex Cerevisiis, imprimis Brunsvicensis Mumma; ex Vinis, Malvaticum, Canariense, Hispanicum, hydromel merum & vetus. 3. quies primò, quamdiu acor ingens prædominatur, postea motus sensim auctus, & tandem satis magnus; animi hilaritas. 4. medicamenta acidum  $\alpha$ . absorbentia, lapis cancerorum, chelae cancerorum, ossa piscium, ostracodermata quaelibet, conchae, margaritae, corallia, creta, terrae pingues, armenae, lemniae, sigillatae, lapis haematites,

tes, sanguis draconis, limatura ferri, stannum, & similia, igne, atque tritu, potentiora.  $\beta$ . acidum convertentia in salem compositum blandum & facile meabilem, ut ut sunt sales alcalini volatiles, fixi, saponacei.  $\gamma$ . obtundentia idem blandâ oleosa virtute (1157. 1158. 2. 3.) emollientia.  $\delta$ . diluentia aquosa mollia (1172. 2. 4.)

1174. Rursum detecta acrimonia Alkalina (911.) exigit 1. dietam ex lacte animalis herbis mollibus pasti, ejus sero, lacte deflorato, lacte ebutyrato; ex fructibus horaeis; ex farinosis acidis, vel facile acrescentibus (1100.). 2. potum aquosum, farinosum, subacidum, vel fermentatum levio-rem. 3. quietem, frigus moderatum. 4. Medicamenta quae alcali  $\alpha$ . destruendo illud in salem compositum blandum, & facile meabilem convertunt, ut sunt acida fere omnia; ex Animalibus serum lactis acidum, lac ebutyratum, lac acidum factum; ex Vegetabilibus, acetosa, acetosella, oxys trifoliata, cerasa acida, ribesia, baccae sambuci, berberis fructus, succus Aurantii, Citrii, Limonii, Omphacium, vinum Rhenanum, Mosellanum, Acetum, Aceti Spiritus, Aceti foex, Tartarus Rhenanus, ejus cremor, ejus crystalli, Tamarindi, Acaciae succus. &c. ex Fossilibus spiritus sulphuris, vitrioli, salis, natri, tam puri, quam dulces, aut congesti

in aliquod corpus, ut nitrum nitratum, sal marinus acidus redditus, &c.  $\beta$ . quae illud obtundunt inforbendo, ut sunt multa, Trochisci V. C. de viperis, terrae omnes pingues, molles, antitoxicae habitae, Melitensis, Armena, Lemnia, &c. vel obvolvendo, ut omnia olea lenia, recentia, pressa, sulphura viva, & depurata, horumque flores.  $\gamma$ . diluentia aquosa mollia (1172. 2. 4.).

1175. Acrimonia Muriatica inventa (913.) indicat 1. dietam perfectè insulsam. 2. potum aquosum levissimè acidulum spirituosum. 3. Medicamenta emollientia, farinosa, diluentia, tum quoque lixiviosa ex calce vivâ. 4. generalia illa, quae expugnando acri in genere apta (1172.).

1176. Acrimonia Oleosa, aromatica, biliosa, exusta, putrida, rancida, exigit 1. victum ex insipidis, insulsis, farinosis, oleribus, fructibus acidulis, cibis lenissimè acidulis. 2. potum ex aquâ & oxymelle dilutissimo, vel decocto fructuum. 3. quietem & frigus moderatum. 4. medicamenta saponacea, sed leniter acescentia, mel, manna, cassia, saccharum, succi recens pressi fructuum horaeorum maturorum (1100. 2.), aut olerum quorundam (1165. 3.), oxymel, sapo, talia fere sunt. 5. generalia contra-acria (1172.).

1177. Acrimonia tandem acida austera indicat medelam (1173.) & (1169.).



1178. Quicumque bene intellexit fundamenta hactenus jacta in hac methodo medendi, simulque curatè expendit Hippocratica opera, atque Galeni in illa eruditas curas, ille profectò cognoscet remedia requisita ad coctionem, & crisin, in morbis Acutis, & Chronicis, excitandam, promovendam, gubernandam, absolvendam.

1179. Etenim consistunt haec tantum in attenuatione spissi (1169.), in lenimine acris (1172. ad 1178.), in aperturâ viarum obstructarum (1166.), in roboratione laxi (1159.), in laxatione rigidi (1158.), moderamine motus (1170. 1171.), ut evolventi placita Vêterum liquidò constabit.

1180. Quin etiam ex iisdem definiri potest, quid sentiendum sit de jactatâ omni quidem tempore, & inprimis per primarios Chemicorum, Panaceâ, si prius attentè considerantur haec axiomata:

1. Panacea non agit suâ virtute in cadaver.
2. Sed requirit actionem vitae superstitis, ut in exercitium suae potestatis excitetur.
3. Non etiam agit in partem corporis perfectè mortuam, adhuc toti cohaerentem, sive in pus conversa sit, vel in ichorem, vel in sphacelum.
4. Sed terminatur extensio virtutis ejus in solo vitali adhuc.
5. Non restituit per se liquida vitalia perdita.

438. INDICATIO CURATORIA, &c.

6. Nec eadem exquisitè corrupta reducit in indolem naturalem, ex. gr. pus, ichorem, putidam saniem, liquamen canceri.

7. Non restituit partes solidas extirpatas, aut consumptas planè, vasorum, viscerum, artuum.

8. Multi, admodumque varii morbi possunt oriri ab unâ, eâdem, simplici, materiali, & efficiente, causâ, si illa variis modis diversis partibus corporis applicatur.

9. Equidem à solo motu spirituum animalium variato plurimi certè morbi oriri, foveri, crescere, possunt.

10. Ut & à solis obstructionibus superflite vitâ natis.

11. Tandem à solis spasms, flatibus, stimulis exiguis, venenisque.

1181. Qui enim omnia dicta, verissima quidem, ponderat, clarè videbit, uno medicamento multos morbos saepe tolli, nullo autem omnes.

1182. Remedia autem maximè universalia nota hæctenus, sunt aqua, ignis, argentum vivum, opium.

1183. Et his quidem plurimum usurpatis, sed cautissimè absconditis, nomen sibi maximum comparaverunt, qui Medicinam Universalem possedisse vulgò creduntur.

1184. Iterumque inde constat, quaenam correctoria medicamenta in morbis dicantur, & an sint ulla universalia.

INDICATIO CURATORIA IN  
FLUIDIS EVACUANS.

1185. **M**Orbi materia, vel id, quod ad levamen ejus educendum ars indicat, evacuatur equidem per duplicem viam: 1. per naturalia emunctoria, & spiracula, totius cutis externae, narium, oris, faucium, oesophagi, ventriculi, intestinorum, vesicae, urethrae. 2. per artificialia in vasis sanguiferis per phlebotomiam, arteriotomen, scarificationes, hirudines; in vasis lymphaticis per caustica, & vesicatoria; in utrisque per fonticulos, setacea, ulcera, fistulas.

1186. Hinc prima distinctio Evacuantium habetur à diversitate Emunctorii, per quod educunt materiem morbosam.

1187. Altera autem petitur à diversitate materiae, quae per singulas quasque partes educitur.

## SUDORIFERA.

1188. **P**rimò itaque per cutim educitur ex corpore Sudor, & materia Perspirabilis; medicamenta quae priorem eliminant vocantur Hydragoga, vel Sudorifera; quae alteram educunt, appellantur Diaphoretica; quorum quidem non adeò magna differentia, utpote solo gradu actionis diversa. Sunt autem talia 1. omnia, quae humores

validius movent per totum corpus (1171.);  
2. illa, quae interim simul imminuunt resistentiam in vasis exhalantibus circa cutim.

1189. Prius illud efficitur inprimis. 1. potu copioso aquae valde calidae. 2. Acidis fermentatis, acetosis, maximè stillatitiis, vegetabilium, aut & valde attenuatis fossilium, iteratis destillationibus subtiliorum (1174. 4. α.), inprimis si haec aquae calidae mista bibuntur. 3. Alcalicis volatilibus, & fixis, aquâ calidâ dilutis. 4. Salibus omnibus compositis dictis (1165. 2.) aquâ solutis, quô & saponem referendi (1165. 3.); item crystalli ex metallicis, vel sales iis juncti, aut ipsae partes metallicaе valde attenuatae, nec fortiter acres, ut stibium diaphoreticum vulgare, stibium diaphoreticum Helmontii, sulphur stibii fixatum Tachenianum, Bezoardicum minerale, Mercurius diaphoreticus, Aurum diaphoreticum Crollii, Cinnabaris, & plura similia, quae examinata deprehenduntur vel nihil agere, tumque diaphoretica dici, vel acrimoniâ salinâ adhaerente operari, tumque sudorem saepe exprimere. 5. aromatibus acris, subtili, acrimoniâ praeditis, ut sunt praecipuè Absinthium, Abrotanum, Ageratum. Apium. Asparagus. Anisum. Angelica. Asarum diu coctum. Asclepias. Acorus. Aristolochia. Ammoniacum gummi. Bardana. Becabunga.

Betonica. Carlina. Carduus benedictus. Calamintha. Caltha. Cardiaca. Caryophyllata. Carum. Caryophylli. Centaurium minus. Cinnamomum. Crocus. Chamaemelum. Capilli veneris. China. Dictamnus creticus. Dictamnus albus. Eupatorium. Erysimum. Eruca. Galanga. Gentiana. Hyssopus. Laurus. Levisticum. Marrubium. Matricaria. Melissa. Mentha. Nasturtia. Origanum. Porrum. Pulegium. Rosmarinus. Ruta. Sabina. Salvia. Sanicula. Sarsaparilla. Sassafras. Satureja. Scabiosa. Scolopendria. Scordium. Serpillum. Tanacetum. Thlaspi. Thymus. Veronica. Virga aurea. Urtica. Zedoaria. Et composita ex his; Theriaca aucta. Theriaca diateffaron. Mithridatium. Electuarium de Ovo. Diafscordium. Orvietanum. Et plurima similia, ut sua cuique placent.

1190. Posterius (1188. 2.) verò efficitur 1. mundatione accuratâ totius cutis per vapores, lotiones, balnea, frictiones. 2. laxatione omnium vasculorum cutaneorum, & subcutaneorum, quae felicissimè impetratur vapore aquae calidae toti cuti, exceptâ capitis, applicato. 3. aucto calore externo circa corpus nudum tepore lecti, balnei vaporis, spiritus vini accensi. His ipsis (1189. 1190.) denius agentibus promovetur Perspiratio insensilis, Diaphoresis dicta.

1191. Praeparatur corpus ad faciliorem

## 442 APOPHLEGMATIZONTA.

ejus exercitationem, si id requiritur, i. attenuatione (1169.), & dilutione humorum. 2. vasculorum laxatione (1158.) & aperturâ (1166.).

1192. Sudor & Diaphoresis indicantur in morbis:

1. A praesentiâ incipientis sudoris Critici solventis, vel levantis, morbum.
2. A tenuitate materiae morbosae dispersae, vel dispergendae, per omnia vasa. Ut in peste, morsu venenato, lue Gallicâ subtiliori, nec fixatâ hæctenus.
3. A temperiæ singulari ipsius Aegri.
4. A constitutione Epidemicâ cognitâ.
5. Ab obstructionibus variis, & ubique in toto corpore haerentibus, resolvendis; maximè in morbis subcutaneis, scabie, psorâ ferâ, leprâ, lue Gallicâ ulcerosâ.

## APOPHLEGMATIZONTA.

1193. **I**N Nares se evacuant omnes partes membranae pituitariae Schneideri, quae ingens, & per varia cava distributa est (494.), & secernit mucum (497.), falso pro pituitâ cerebri habitum; huc & materia humida oculorum tam naturalis, quam lachrymosa (513.); tum materies liquida in coryzâ, crassior in catarrho pituitoso; adeoque ingens hîc copia humorum evacuari tam vi naturae in morbis, quam & per medicamenta, potest.

1194. Indicatur haec evacuatio instituenda;

1. A gravedine, coryza, catharro, sternutatorio morbo, pure per nares destillante, morbis oculorum lachrymosis.

2. A temperie aegri multum levamen capientis ab hujusmodi evacuatione.

3. A revulsione faciundâ à pulmonibus in broncho, peripneumoniâ, phthisi, gravedine pulmonali.

1195. Excitatur fotu, vapore, vel decocto per nares attracto, 1. aquae calidae cum emollientibus diu coctae. 2. Ejusdem melle aut saccharo paulo acrioris redditae. 3. decocto mellito ex betonicâ, lavendulâ, majoranâ, pulegio, roremarino, rutâ. 4. ipsis his herbis viridibus contortis, sicque in nares inditis. 5. omni stimulo acriori, ut saccharo, sale, sale Ammoniaco, pulvere antimonii, aut semicaustico ex tabaco, nigellâ sylvestri, Helleboro, Euphorbio. Haec Er-rhina, & Ptarmica.

1196. Sistitur si nimia sit, maxime si fortis sternutatio comitatur, & destillatio acris:

1. Lacte recenti, tepido, malvacco, naribus attracto.

2. Suffumigiis blandis ex vapore accensi Benzoini, mastices, olibani, succini, thuris; aut leniorum aromatum, ut sunt majorana, mastichina, pulegium.

Coeterum, si nimis exercetur haec evacu-

cuatio , damnosâ consuetudine huc derivat assiduô humores.

1197. Quum verô per os , & in illud , se evacuent nares (1193.), ductus salivosi (65.) , tonsillae & membrana Schneideri (65 5.), hinc primô hic est Indicatio, medela, remedia, cautela, ut (1194. 1195. 1196.): quare & hîc Apophlegmatismi , & Gargarismata.

## S I A L O G O G A.

1198. **E**Vacuatio Salivae magna , & artificialis , indicatur :

1. A crisi tali.

2. A singulari naturâ morbi haerente inprimis ad glandulas , & ad membranas adiposas, inprimis autem in cura Luis Gallicae.

3. A naturâ morbi Epidemici.

1199. Corpus cō praeparatur quam optimè usu largo, aliquamdiu continuato, praemisso decoctorum attenuantium , diluentium , lenientium , actu calidorum ; Scabiosa, Parietaria, Bardana, China, Sarsaparilla, Sassafras, Santalum , hîc praecipua.

1200. Excitatur :

1. Collutionibus oris (1197.).

2. Masticatione lentâ, continuâ, materiae tenacis, ut Mastiches, Cerae, Myrrhae, maxime si his acria permista , ut Pyrethrum, Leucanthemum Canariense sapore Pyrethri, Zingiber, Piper, &c.

3. Hau-



3. Hauriendo vapores acres , irritantes , ut Tabaci , Salviac , Rorismarini , Majoranae , Thymi , Serpilli , &c.

4. Inprimis & egregiè actione medicamentorum , quae levem quidem , sed diuturnam , nauseam creant , ut est stibium non penitus fixatum , nec tamen planè emeticum , parum Vitrioli vulgaris simul sumtum , &c.

5. Iis quae omnes partes cruoris penitus dissolvunt , in lympham vertunt , in ptyalissimum convertunt : ut sunt argentum vivum crudum , cinnabaris , solutio argenti vivi in aquâ forti , praecipitatus albus , ruber , Turbith minerale , Mercurius sublimatus solutus. &c. priorum autem primum unâ cum calido fotu capitis , cervicis , colli , faciei , eam actionem promover.

1201. Nimia salivatio minuitur , vel sistitur , aut saltem emollitur :

1. Largo , assiduo , usu , potus tepidi blandissimi , ut decocti Malvae , & Glycyrrhizae , in hydrogalacte.

2. Sedando impetum per emulsiões blandas , oleosas , anodynas , addito prudenter diacodio , vel opio.

3. Revelendo in alias partes per evacuationem quamcunque magnam , inprimis hydragogam alvinam. Ubi tamen summâ prudentiâ opus est , ne impetus motae , & hîc semper acris , materiae , ruat in alias partes  
majo-

majori cum periculo, quare qui hic bene dividit, is tutô imperat.

## E M E T I C A.

1202. Vomitoria indicantur:

1. A foeditate matutinâ oris, ejus amarore, ructu, nausâ, morfu ventriculi, appetitu lenrè ablato, sine febre comitante, vel causâ.

2. A spontaneo vomitu unâ cum magnâ ejus facilitate.

3. A naturâ materiae cognitæ, ut mobilis, vel immobilis.

4. A loco affecto repletionem, & obstructionem, infra diaphragma, maximè si ea affectio primaria, nec aliud repugnat.

5. A naturâ generali morbi, vel epidemicâ.

6. A constitutione anni.

1203. Vetantur a contrariis horum (1202.).

1204. Praeparatur corpus aegri ad faciliorem, tutumque, Vomitus.

1. Reddendo materiem mobilem, diluendo, attenuando, resolvendo (1169. 1165.).

2. Vias laxando, lubricando, per emollientia, oleosa, blandâ.

3. Prius mittendo sanguinem, si corpus est plethoricum, aut nimis forte, simulque validissime agitatum.

1205. Excitatur:

1. Irritando spiritus oblatâ ideâ maximam nau-

nauseam producente; aut agitatione quâdam non consuetâ, in mari &c.

2. Irritando fibras faucium & pharyngis pennâ oleo madidâ, aut simili quâdam re.

3. Copiâ magnâ ingestâ aquae insulsae cum oleo, melle, saccharo, & similibus, tepidis.

4. Omni acri valde, & simul viscoso; Anethi flore, & semine. Asari foliis. Atriplicis radice & semine. Aut violentioribus iisdem, Cataputiâ. Esulâ. Cyclaminis radice. Flore, succo, cortice, Ebuli. Floribus, seminibus, radice Genistae. Helleboro utroque. Semine Nasturtii, Ricini, Thymelaeae, Cnici, radice Bryoniae, Iridis, Tithymali. Gratiolâ. Nicotianâ.

5. Antimoniatis. Croco. Vitro. Floribus. Regulo; in substantiâ, in infuso, sapa, syrupus, vinum emeticum. Mercurius vitae. Tartarus Emeticus. Et similia; quae vario gradu violentiae varia effecta praestant.

6. Mercurio acri factô per acida, in quo etiam varia admodum distingui possunt, prout acidum copiosius, & apertius illi adhaeret, vel parcius & tectius.

1206. Horum quidem delectus, dosis, formula, tempestivitas, indicantur ab aetate, sexu, temperie, anni tempestate, ideâ morbi & materiae educendae.

1207. Promovetur potu copioso leni, aquoso, mellito, tepido, post singulos quosque vomitus.

vomituum paroxysmos affatim ingesto, reje-  
cto, repetito.

1208. Sedatur iisdem (1207.); hausto oleo  
blando; opiatis; aromatibus; acidis gratis, cor-  
roborantibus, ingestis, aut externè applicatis.

## P U R G A N T I A.

1209. **I**N Intestina plurima evacuari que-  
unt, adeoque hâc viâ educi queunt  
ex corpore, saliva, mucus, oris, faucium,  
œsophagi, ventriculi, bilis duplex, pan-  
creatica lymphâ, humor intestinorum dilu-  
tus vel mucosus, materies atrabilaria cruo-  
ris, viscerumque hypochondriacorum; ma-  
teries sanguinis serosa, tum purulentia quae-  
libet ex abscessu quocunque critico, symp-  
tomatico, morbofo.

1210. Indicatur haec Evacuatio:

1. A fluxu alvi non colliquativo.

2. A materiâ peccante, ejusque loco.

3. A loco repleto, vel obstructo sub dia-  
phragmate.

4. A naturâ singulari, generali, epide-  
micâ, morbi.

5. A revulsione.

6. A signis coctionis.

7. A statu aegri.

1211. Vetatur a contrariis.

1212. Materies movenda praeparatur, si  
opus est, iisdem ac ad Vomitus (1204.).

## 1213. Excitatur :

1. Diluentibus , simulque leniter stimulantibus , magnâ copiâ , jejuno corpore , in frigore modico , haustis. Aquae , minerales dictae , tam ferratae , sulphureae , quam salinae , tales sunt ; serum lactis ; succi horaeorum maturi , recentisque.

2. Lubricantibus simulque acrimoniâ facili stimulantibus utcunque. Olea blanda , recentia , pressa. Jura pingua. Decocta emollientia , horumve extracta. Saccharum. Mel. Cassia. Manna. Terebinthina. Rosae pallidae. Syrupus rosarum solutivus. Rosarum pallidarum succus. Gummi Ammoniacum , Galbanum , Myrrha , Opopanax , Sagapenum , mediocri dosi sumtum.

3. Leniter acribus , simulque paululum crassioribus , ideôque inprimis in primas vias agentibus. Pruna acido-dulcia. Ficus recentes. Uvae corinthiacae. Rheum. Tamarindi. Myrobalani. Tartarus. Aloe. Mercurius dulcis rudius tritus. Polypodium.

4. Acribus. Asarum. Carthami semen. Agaricus. Mechoacanna. Jalappa. Turpethum. Hermodactyli. Senna. Soldanella. Turiones Sambuci , & Ebuli. Scammoneum. Diagrydium. Flores Persicae.

5. Acerrimis fere causticis. Helleborus niger. Veratrum. Iris. Gummi Gotte. Esula. Gratiola. Elaterium. Lapis Lazuli. Euphorbium.

bium. Mezeracon. Cryſtalli argenti, Mercurius præcipitatus, albus, ruber, flavus.

6. Variis ex his, & vix enumerabilibus, compositis, formâ pilularum, Electuarii, vini medicati, &c.

1214. Horum delectus, dosis, formula, præparatio, oportunitas indicantur, ut de vomitoriis dictum est (1206); inprimis verò ex indole materiae educendae. Unde varias appellationes nacta sunt; ut *εμερογονία*. Purgantia per *διήγεσιν*. Minorativa. Laxantia. Cholagoga. Phlegmagoga. Hydragoga. Melanogoga. Panchymagoga. Quorum nominum origo intellectu facilis.

1215. Promovetur juscule salito, pingui, butyrato, sero lactis recenti, & similibus.

1216. Siftitur pote oleo, oleosis blandis; acidis; adstringentibus; opiatis; spirituosis; revulsione in alias partes quascunque.

1217. Fit & evacuatio alvi per Clysmata: indicantur haec:

1. A loco affecto.
2. A materie educendâ.
3. A viribus attritis aegri, ejusve temperie, simulque urgente necessitate evacuationis.
4. A siccitate, calore, motu nimio humorum in acutis.
5. A conciliandâ revulsione, & lenimine requisito in fibris, & humoribus acribus.

1218. Clysmata itaque varia sunt:

1. Di-

1. Diluentia ex aqua, fero lactis, cerevisiâ dulci.

2. Emollientia & lenientia simul ex jure pingui, oleo, farinosis decoctis, decoctis emollientibus, lacte, saccharo, sapone, syrups.

3. Stimulantia leviora, aqua falsa, nitrosa, decocta purgantium leniorum (1213. 2. 3.); urina.

4. Acria, ex decoctis purgantium acrium & acerrimorum (1213. 4. 5.).

5. Certissima fere ex fumo injecto Tabaci. Atque hinc suppositoria monentia, stimulantia, acria, intelliguntur. Mel coctum spissum. Saccharum durum. Sapo. Praebent cum acris haec cuncta.

1219. In his iterum observanda eadem ac in vomitu, & in purgatione (1206. 1214.).

## D I U R E T I C A.

1220. **E**Vacuatio per vias Urinae indicatur:

1. A signis coctionis.

2. A fluxu critico materiae morbosae per renes.

3. A materie peccante salinâ, saponaceâ, terrestri subtili, scorbuticâ, purulentâ.

4. A loco affecto.

5. A constitutione Epidemicâ.

6. A temperie aegri auscultante huic evacuationi, vel assuetâ.

1221. Vetatur a contrariis.

1222. Excitatur usu:

1. Aquae copiosae, vel aquosorum.

2. Salibus alcalinis fixis, volatilibus, simplicibus, vel compositis.

3. Salibus fixis neutris compositis, marino, gemmae, nitro, borace, alumine, Tartaro, Tartaro Tartarifato, ostracodermatis solutis cum acido in corpore nostro, vel extrâ illud; eo succus conchyliorum, & ostreorum, spectat. Et Ammoniacus.

4. Acescente humore animali, fero lactis acido, lacte acido, cove ebutyrato.

5. Acidis levibus vegetabilibus Arantii, Citrii, Limonii, Ribesiorum, Sambuci, vino tenui Mosellano, Rhenano.

6. Spiritibus acidis aceti, nitri, salis, sulphuris, aluminis, vitrioli, simplicibus, compositis; fale succini.

7. Apium, Asarum coctum, Asparagi, Amygdalae amarae, Chaerophyllum, Daucus, Eryngium, Eupatorium, Miliun folis, nuclei Persicorum, Ononis, Petroselinum, Pimpinella, Ruscus, Saxifragia.

8. Quaecunque ex omnibus his composita.

1223. Diuretica juvantur vacuo stomacho; coctione praegressâ; motu corporis leni; aëre frigidiusculo, calidis interim lumbis, hypogastrio, pube, perinaeo.

1224. Sistitur, aut sedatur. usu:

1. E.



1. Emulsionis viscidioris gelatinosae.
2. Adstringentium, & roborantium simul (1107. 1159.).
3. Opiatis.
4. Determinatione in alia loca : inprimis autem sudore per motum, aut sudorifera, excitato, & aliquamdiu continuato.

MENAGOGA ET ARISTOLOCHICA.

1225. **E**Vacuatio sanguinis menstrui, vel puerperii, per uterum indicatur :

1. Ab aetate;
2. A plethorâ.
3. A morbo quocunque hinc pendente, ejusque symptomatibus; ut inprimis in puerperio.

1226. Exercetur :

1. Determinantibus ad uterum; fomentis, balneis, pedum, crurumque; frictionibus saepe exercitatis in pedibus, cruribus, femoribus, hypogastrio; cucurbitis ad femora, & crura superiora, applicatis, saepe renovatis; missione sanguinis ex venis pedum; Emplastris ex gummi foetidis, umbilico, femoribus, cruribus, datis.

2. Aperientibus loca uterina & vasa per vapores, balnea, fomenta, injecta; similiaque internè assumpta; Aristolochia. Artemisia. Calamintha. Cardiaca. Chamaedrys.

Dictamnus. Levisticum. Majorana. Mar-  
rubium album. Matricaria. Mentha. Pu-  
legium. Rosmarinus. Ruta. Sabina. Satu-  
reja. Tanacetum. Gummi foetida. Aloe.  
Myrrha. Crocus. Borax. Chalybs. Succu-  
num. Sal alcalinus volatilis. Olea stillatitia  
aromatica &c. sunt praecipua.

3. Remediis Chirurgicis, Diaeteticis,  
Pharmaceuticis, quae contraria sunt impe-  
dimento singulari evacuationis; quae tan-  
tum inveniri possunt singularibus signis in  
quâlibet specie propriis.

1227. Sistitur, si nimia fuerit;

1. Revulsione.

2. Adstrictu vasorum (1107. 1159.).

3. Opiatis.

## P H L E B O T O M E.

1128. **M**lssio sanguinis intra terminum,  
quo vires non minuuntur:

1. Copiam minuit humorum arterioso-  
rum & venosorum.

2. Ergo resistentiam movendorum reddit  
minorem.

3. Adeoque & plenitudinem vasorum,  
ut & horum ad se mutuam compressionem.

4. Hinc vasis nimis distensis contractio-  
nis, id est elasticitatis, exercitium reddit.

5. Rarefacit liquida.

6. Sol-

6. Solvit eadem.
7. Resolvit.
8. Obstructa expedit.
9. Circuitum, secretionem, excretionem, promovet.

10. Revellit.

11. Refrigerat.

1229. Hinc morbos quam plurimos, eosque varios admodum, tollit; simul tamen mutationes miras profert.

1230. Indicatur:

1. A copiâ nimîâ.

2. A resistentiâ nimîâ cordi natâ per humores.

3. A motu suffocato per nimium tumorem a copiâ; vel à rarefactione, natum in arteriis.

4. A motu suffocari incipiente per nimiam extensionem vasorum, quâ ipsa vasorum elasticitas destruitur.

5. A sanguine nimium densato.

6. Ab eodem nimis coëunte.

7. Aut nimium inspissato.

8. Ab iis, quae sunt signa obstructionis inflammatoriae, & magnae, deprehensis ubique in corpore; primaria quidem deprehenduntur talia esse, dolor, tumor, rubor, aestus, anxietas; dum interim sudor, sputum, urina, admodum supprimuntur.

9. A motu nimio humorum per vasa; aut etiam a motu tardiori eorundem orto ex dictis (1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. hujus.).

10. A calore nimio per omnia vasa.

11. A nimio impetu cruoris moti in unam partem; ut in haemorrhagiis & fluxionibus.

12. Ab epidemicis cognitis.

13. Ab aetate, sexu, victu, temperie.

14. A cacochymia.

15. A conciliando ingressu medicamentorum in vasa, horumque simul admistione procuranda, tum & excitanda vi eorundem, in magnis curationibus perficiendis.

1231. Optima fit:

1. Lato vulnere, secando inflicto.

2. In venâ liberâ, magnâ, facilè detegendâ, remotâ ab arteriis, nervis, tendine.

3. Accelerando velocitatem cruoris, dum fluit, respiratione forti.

4. Motu muscutorum circa venam apertam.

5. Jacenti aegro.

1232. Praeparatio fit ad feliciorum ejus administrationem:

1. Frictione.

2. Fomento.

233. Vetatur:

1. A plurimis Chronicis, in quibus plurima

rima obstructa, paucusque admodum fluidus cruor vasis restat.

2. A senio,

3. A temperie.

4. A cognitâ naturâ Epidemici, vel Endemici, morbi.

5. A crisi jam factâ alibi.

6. A paucitate cruoris rubri, & debilibus hinc viribus.

7. A recenti statu puerperii.

1234. Unde patet quanto humani generis damno hoc remedium vel semper, vel nunquam, adhibendum censeatur, ut in doctrinâ Johannis Baptistae Helmontii, & Leonharti Botalli videri potest.

1235. Sanguis educendus ex vasis Haemorrhoidalibus indicatur:

1. A temperie atrabilaria.

2. A morbis cum phantasiâ laesâ.

3. A consueto fluxu eorum vasorum jam suppresso.

4. Ab eruptione sanguinis per novas jam vias, qui olim felicius per haemorrhoides evacuabatur.

1236. Elicitur:

1. Emolliendo haec vasa fomento molli, calido, ex aquâ, oleo, melle, emollientibus, specie clysmatis, vaporis, fomenti, applicatis.

2. Aperiendo per frictum cum asperis, aut per hirudines.

3. Ufu Aloëticorum.

1237. Scarificationes agunt stimulando, & evacuando.

1238. Hirudinum actio & hinc bene intelligitur.

1239. Setacea autem & fonticuli dolore leniore stimulant, genus nervosum concutunt, serum evacuant, nimiae repletioni exitum dant.

1240. Unde & liquet, ubi, & quando, indicentur.

1241. Stimulantia, dolorem, calorem, rubedinem, creantia medicamenta, motu nervis conciliato, & determinatione in loca imperata agunt.

1242. Unde infinita certè, eaque saepe exoptatissima, effecta praestant, quorum etiam cognitâ necessitate indicantur.

1243. Revocari vulgò haec solent in doctrinâ Medicâ 1. ad Dropaces validè adhaerentes simulque penetrantes formâ Emplastri calidè applicati iterumque avulsi repetito opere donec rubeat, tumeat, caleat, pars affecta. Materies his: Pix. Oleum. Bitumen. Castoreum. Cinis sarmentorum. Galbanum. Piper. Pyrethrum. Sal gemmae. Sal Ammoniacus. 2. ad Sinapismos lenes, phoe-

phoenigmos dictos, formâ cataplasmatidis applicitos, relictosque, donec rubor, calor, pruritus, tumor, appareant. Materies: Sinapi. Bryonia. Allia. Cepae. Nasturtium. Squilla. Euphorbium. Ranunculi. Thapsia. 3. ad Vesicatoria; quae sinapismi fortiores, formâ eâdem, violentiore effectu. Materies eadem. Diversitas in dosi auctâ acris. E. G. ficus ad p. i i i. acris p. i. mistae dant phoenigium. Ficum p. i. acris. p. i. dat vesicatorium. Ficum p. i. Acris p. i i i. Dat vesicatorium forte. 4. ad Causticum potentiale, formâ singulari pultis, vel & cum linteo carpto applicatum. Materies: Ranunculi. Esula. Tithymalus. Sal alcali fixus. Lapis infernalis. Mercurius sublimatus. Spiritus, & sal, alcalinus, volatilis. Effectus, inflammatio, eschara. 4. ad Causticum actuale dictum ex ferro ignito.

## CURATIO PALLIATIVA.

1244. **M**itigando symptomata semper Metiam aliquid de morbo primario tollitur.

1245. Unde omnia sanans symptomata simul, totum fere morbum sanat.

1246. Primaria autem hîc considerata sunt

sunt sitis, dolor, vigiliae nimiae, & lipothymiae.

1247. Sitis à siccitate totius corporis sedatur potu largo, continuato, calido. aquoso, farinoso, paucis acidis admistis grato. Decocta hordei, avenae, panis, dilutiora; serum lactis, hydrogala, zythogala; decoctum tenue, insulsum, vitulinum absque pingui, profunt; ut & ex fermentatis Cerevisia tenuis non aromatica. Balnea. Fomenta. Clysmata, hic etiam in usum vocata profunt.

1248. Sitis à siccitate partis singularis, ut oris, linguae, faucium, oesophagi, levatur: 1. usu praecedentium (1247.). 2. coluendo, & gargarizando, saepe per eadem. 3. aperiendo glandulas, & meatus, salivales, per epithemata, & fomenta, ex laxantibus, humectantibus, aperientibusque. Ubi posca cum micâ panis egregii usus est.

1249. Sitis a sale acri lixivioso, vel & ab acri aromatico, orta tollitur iisdem omnibus (1247. 1248.), utpote diluentibus; maximè verò, si his admiscantur acida, & nitrosa. Unde & scitur, quomodo sedanda illa, quae à sale muriatico, utpote solis egente aquosis.

1250. Si verò oritur sitis a materie inepta



ep̃tâ tranare per canales , tum diluentibus ,  
& resolventibus , tollitur.

1251. Dolor, ut symptoma, sedatur:

1. Acre diluendo : quod fit aquâ calidâ,  
farinosâ, applicatâ per potum, fotum, clyf-  
ma, balneum (1172.).

2. Obstruens diluendo, resolvendo, per  
similia, & per resolventia (1160.).

3. Vascula nervosa laxando, potu, fotu,  
balneo, injectis, humectantium, laxantium,  
anodynorum, blandè aperientium (1158.  
1166.).

4. Acre ipsum corrigendo suis remediis  
(1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177.).

5. Obstruens, acre, obstructumque, libe-  
rando à nimîâ pressione humoris vitalis (1170.).

6. Obstruens, acre, obstructumque, emol-  
liendo, suppurando, depurando (1166.2.).

7. Sensum obtundendo stupore inducto  
per narcotica internè exhibita, vel applicata  
externè. Talia sunt : 1. levia, flores papave-  
ris Rhaeados, semina ejusdem; Flores & semi-  
na Papaveris sativi; Lactuca sativa capitata  
aestivo tempore lacte praegnans. 2. fortia,  
capita papaveris hortensismatura, exploso se-  
mine, ante ariditatem collecta; lac ex papa-  
vere Europaeo, fere maturo, laeso, stillans.  
3. fortiora, Opium Thebanum, vel Orient-  
tale. 4. fortissima, mandragora; solanum

mania-

maniacum, Cicutæ aquatica Gesneri, Stramonium, Hyoscyamus, Petum, & similia non affluetis venena. Ex quibus omnibus fiunt externè fomenta, litus, emplastra; internè verò, aquae, tincturae; syrapi, pulveres, pilulae, condita, confectiones magnae opiatae, ut diascordium Fracastorii, diascordium Sylvii, Theriacae, Veneta, Andromachi, & aliorum, Mithridatium, Philonium variorum, Trypherae Persarum vel Arabum, requies Nicolai, Orvietanum, & multa similia.

1252. Vigiliae nimiae ex malo, quod ipsum cerebrum infestat, ortae difficulter admodum sopiuntur; & vix, nisi extirpato prius morbo hoc cephalico; id in phrenitide, comate vigili, melancholiâ, maniâ, &c. patet.

1253. Si oriuntur à siccitate nimia, compescuntur, victu, potu, fotu, balneo, injectis, ex aquosis, farinosis, emollientibus, laxantibus, multum, diuque usurpatis. Althea, malva, violaria, lactuca, cichorea, hic prae coeteris probata.

1254. Si oriuntur ab acri quocunque, curatione acris (1251. 4.) tolluntur.

1255. Si verò inde fiunt, quod humores moventur validius, aut rapiuntur nimis in cerebrum, curatio absolvitur 1. Sedantibus

(1170.). 2. Derivantibus, quae fomenta, balnea, epispastica, applicata inferioribus; haec ex emollientibus, acribusque simul componuntur, unde herbae emollientes, farinosae, cum sale, aceto, fermento acri, aromatibus fortissimis, cepis puta, alliis, &c., hinc laudatissimae; etiam pisces, carnes, recentes eò commendantur. 3. Repercutientibus simul ad superiora applicatis; quae memorantur acetum simplex, Sambucinum, Rosaceum, Violaceum, Oxycratum; unguentum Populeon, Rosaceum; olea anodyna solani, violarum, papaveris, hyoscyami.

1256. Opiatis internis, hoc in casu, vix utendum, nisi constet malum consistere in solo nimio motu spirituum.

1257. Quo casu, praemissis primò evacuantibus, & diluentibus, tum demum prodest.

1258. Excretiones autem nimiae sedantur per ea, quae in pertractatione evacuantium nimis agentium dicta sunt. (1188. ad 1228.).

1259. Nimia excretio cruoris per laesas arterias, venasve majores, sedatur compressu, ligaturâ, combustione vasis, inspissatione fluidi, contractione solidi. Ubi Alcohol vini, spiritus aethereus terebinthinae, primaria. 1260.

1260. Lipothymiae ortae a stagnante humore, & ab anxietate spasmodicâ, sanantur diluendo, laxando. Si autem a vitio spirituum torpidorum, tum omni stimulo Cardiaco (1112.). Si ab evacuatione, per repletia curantur (1097. ad 1107.). Si a suffocatione hystericâ tum per foetida Anthysterica.

## F I N I S.



# I N D E X

## RERUM ET VERBORUM.

Numerus Arithmeticus paragraphum,  
non verò paginam denotat.

A.

- A** Bdominis musculi. 86. n. 5. ejus ar-  
ctatio in inspira-  
tione. 609. 616. Resti-  
tutio in Expiratione. 619  
Abdominis Viscera triplicis  
generis. 311  
*Absorbentia* Vasa Chyli,  
&c. 106, 334, 336  
*Acidorum* Variæ species, &  
varii effectus. 760. cor-  
rectio. 1173  
*Acida* quibusnam conve-  
niant? 1037, 1100,  
1174, &c.  
*Acrimonia* humorum unde?  
455  
*Acrimonie* varia genera, va-  
riique effectus. 760. ad  
763  
*Acrimonie* cujusque signa  
diagnostica. 911. ad 916.  
Correctio singularis.  
1172. ad 1177. &c.  
*Acutissimi*, peracuti, & acu-  
ti Morbi quinam sint?  
736  
*Acutissimi* Morbi cur ad Pe-  
ctus frequentes. 308  
*Adnata* membrana Oculi,  
529
- Ægrotare* quid sit? 2  
*Aer* masticatis, & degluti-  
tis cibis, admistus quid  
ad digestionem faciat?  
69, 78  
*Aeris* ingressus in Pulmones.  
197, 608. Sanguini Pul-  
monico non admiscetur.  
201  
*Aer* vehiculum particula-  
rum odoratarum, ejus-  
que per nares adducti ne-  
cessitas ad Olfactum. 500.  
ad 506  
*Aeris* varia a variis causis  
constitutio. 752  
*Aer* quis saluberrimus?  
1029, 1032, 1060  
*Aeris* nimium æstuan- }  
tis. 746 }  
gelidi. 747 }  
nimium humidi. 748 }  
nimium sicci. 749 }  
nimium gravis. 750 }  
nimium levis. 751 }  
*Aeris* hujusmodi correctio.  
1031  
*Aerea* Pulmonis Vasa. 194.  
ad 197  
G g Affe-

# INDEX R E R U M

- Affectus animi unde?* 572.  
*moderati juvant.* 1048.  
*Violenti nocent.* 771  
*Alcaline acrimoniae signa.*  
 912. *correctio.* 1174  
*Alcalescentia quibusnam*  
*convenient?* 1037, 1102,  
 1173  
*Allantois membrana pla-*  
*centae, ejusque usus.* 684  
*Αμνιων* quid sit? 845  
*Αμνιος* membrana placen-  
 tae Uterinae, ejusque usus.  
 682  
*Αρτηριών* Vasorum. 707  
*Αρτηριών* natura, varii  
 gradus, & causae. 859  
*Animales functiones quae-*  
*nam dicantur.* 695  
*Animalcula seminis mascu-*  
*lini.* 651. &c.  
*Anodynorum variae classes*  
 a 1247. ad 1256  
*Antagonistae. Vid Musculi.*  
*Antidota quænam dicantur?*  
 1123. *Antidota Univer-*  
*salia quænam?* 1129.  
*Singularia.* 1136. ad 1154  
*Aortae ortus & progressus.*  
 231. *Valvulae 3. Sigmoidae.*  
 157  
*Αρτηριών* natura & causa. 830  
*Apophlegmatizomata reme-*  
*dia.* 1193. *quando indi-*  
*cantur.* 1194  
*Apoplexiae natura & causae.*  
 860  
*Appetitus laesi symptomata,*  
*eorumque causae.* 803  
*Applicata externa quos*  
*morbos producant.* 779  
*Aqua pura optimus potus.*  
 56, 1041, 1058  
*Aquens humor Oculi.* 526  
*Arabum Medicina in qui-*  
*bns laudanda, in quibus*  
*verò vituperanda.* 16  
*Aretaeus Cappadox Medici-*  
*nam Hippocraticam or-*  
*dinatius digessit.* 14  
*Aristolochica remedia*  
*quando indicantur.* 1225.  
*eorum materies.* 1226  
*Arteriarum figura, tunicae,*  
*pulsus.* 132.  
*Arteriarum naturalis visus*  
*ad contractionem.* 213  
*earum resistentiae im-*  
*pulso sanguini.* 215  
*Arteriarum actio in sangui-*  
*nem?* 218. & 220  
*Arteriarum diastole Cordis*  
*Systolae Synchrona.* 217.  
*exceptis Coronariis.* 217,  
 218  
*Arteriae Pulmonalis Valvu-*  
*lae.* 152, 153  
*Arteriae Carotidis utriusque*  
*ortus, via, distributio.*  
 231, 233, 236  
*Arteriae Vertebrales.* 232,  
 233. &c.  
*Arteriae Lienis.* 314. ad 317  
*Arteriae Spermaticae.* 641.  
 ad 643  
*Arteriae Mammariae, ha-*  
*rum*

rumque cum Epigastricis  
communicatio. 666  
Arteriæ umbilicales, ca-  
rumque usus. 679. ea-  
rum post partum conso-  
lidatio. 692.  
Arytænoidea cartilago, &  
Arytænoideus musculus  
Laryngis. 194  
Asperæ Arteriæ structura.  
195. ramificatio. 196  
Asthmatis natura, & causæ.  
832  
Attentio quid sit? 584  
Auditus natura. 547. ratio  
quæ excitatur. 561. &c. de  
auditu varia quæ sita. 565.  
auditus læsi symptomata  
& causæ. 848. ad 852  
Auricularum Cordis fabrica  
muscularis. 148, 187  
Auriculæ Cordis simul la-  
xantur, simulque con-  
trahuntur *ἀρρηκτα* cum  
Ventriculis. 159  
Auris externæ *membrana*,  
ejusque munus. 548.  
*figura*, hujusque utilitas.  
549. *Concha externa*.  
550. *meatus auditorii*  
structura & mechanis-  
mus. 551. *membrana*  
*Tympani*. 552. hujus  
usus. 553. *mallei* positi-  
ra, connexio, musculi,  
actio. 554. *Incudis*, *ossi-*  
*cæli orbicularis*, & *stape-*  
*dis* structura & usus. 555.

*stapedis musculus*. 556.  
*foramen Ovale*. 555, 556.  
ejus *membranæ actio*.  
557. *Labyrinthus*. ibi-  
dem. *Concha interna*.  
558. *Tubæ Eustachianæ*  
structura, & usus. 558,  
& 560. *foramen rotun-*  
*dum*, ejusque utilitas.  
559. *nervus auditorius*.  
561. *Cochleæ structura*.  
562. ejus usus. 563

B.

**B** *ἀρρηκτα*, indoles, causæ.  
850, 851  
Bilis Cysticæ origo, 348.  
Hepaticæ origo & emissæ-  
rium. 343, 344. utriusque  
differentiæ. 98. natura  
& effectus. 99. circula-  
tio singularis. 106. ex-  
cretio in Intestina, ubi,  
& quando fiat. 346, 347  
Bilis excretio parcior, vel  
nimia quos morbos creet?  
773  
Bilis variæ species & deno-  
minationes, ac varii Ef-  
fectus morbosi. 788, 789  
Biliaræ generationis, aut  
excretionis læsæ sympto-  
mata, horumque causæ.  
817  
Biventer seu Digastricus  
musculus Maxillæ infe-  
rioris, ejusque mecha-  
nismus. 60  
Bronchiorum structura, di-  
stri-

# INDEX R E R U M

Atributio, Vesiculares fi-  
nes, usus. 196

Bruta automatico appetitu  
Medicinam sibi quæren-  
tia. 4

Buccinatoris musculi, ortus.  
insertio, usus. 62

C.

**C**alculosarum concretio-  
num Origo, & Effe-  
ctus. 791

Calor corporis unde oriatur?  
& quid designet? 968

Canalis arteriosi in Foetu si-  
rus, & usus. 681. quan-  
do, & cur degeneret in  
ligamentum. 691

Cantus natura. 631. ejus  
varietas, & gratia unde  
pendeat. 632. ad 634

Capulae Glissonianæ Actio.  
337, 338

Cardiaca quænam dicantur?  
1095. eorum variæ clas-  
ses, materia, & varius  
usus. 1095. ad 1115

Cari indoles, & causæ. 858  
Cataphoræ natura & causæ.  
ibid.

Catarrhi suffocantis inge-  
nium & causæ. 834

Cava. V. Vena Cava.

Cavernosa corpora Penis.  
655, 656

Causa morbi quid sit? 737.  
interna, & externa quæ-  
nam dicantur; 738, 739.  
Proxima. 740. Remota.

741. Prædisponens seu

προϋποθέτων. 742. Proca-  
tarcticae quænam? 743.  
harum divisio Vulgaris  
in Res sex non Naturales.

745. accuratior divisio  
in 4. Classes. 744

Caustica Actualia, & Po-  
tentialia, eorumque ma-  
teries. 1243. n. 4. 5

Ceratoglossi musculi. 62.  
& 70

Cerebri & Cerebelli Vasa  
sanguinea, a 231. ad 235.  
dura meninx ejusque Va-  
sa. 234. pia mater, ejus-  
que textura vasculosa.  
233. & 236. Cortex, ejus-  
que situs varius intra cra-  
nium, ac intra thecam  
Vertebralem. 237. 267.  
& 268. Corticis substan-  
tia an glandulosa juxta  
Malpighium? 263. 264.  
an verò mere Vasculosa  
juxta Ruischium? 265.  
Medulla substantia quæ-  
nam? 266. 269. ejus ori-  
go a Cortice. 237, 238.

266. ejus fibrarum di-  
stinctio. 270. harum de-  
cursus. 271. 273. earum-  
dem immensa exiguitas  
& infinitus numerus. 287.  
sunt tamen cavæ. 274.  
quæritur an sint emissaria  
glandulosa juxta Malpi-  
ghium. 263, 264. an ve-  
rò



- tō meræ continuationes  
 arteriarum in fibras ner-  
 vosas desinentium juxta  
 Ruifchium. 265. Venti-  
 culi, eorumque usus. 272.  
 Medullæ variæ partes &  
 denominationes. 269  
 a Cerebro actiones Anima-  
 les, a Cerebello Vitales.  
 401. 415. 600  
 Cerealia quomodo præpa-  
 rentur in meliorem nu-  
 tritionem. 53  
 Cerevisia quomodo paratur?  
 56  
 Ceruminis origo glandulo-  
 sa, indoles, & usus. 551  
 Cholerae natura & causæ.  
 810  
 Chorion membrana placeu-  
 tæ Uterinæ. 682  
 Chorocides tunica Oculi.  
 519  
 Chronici morbi quinam di-  
 cantur. 736. n. 3.  
 Chyli præparatio in Ven-  
 triculo a 77. ad 89. pro-  
 pulsio in duodenum. 83.  
 quid a bilis admistione  
 patiatur. 99. quid a Lym-  
 phâ Pancreaticâ. 101.  
 quomodo in Vasa Lactea  
 pellatur. 103, 104, 113.  
 quibus tum constet parti-  
 bus. 105. cur pars quæ-  
 dam Chyli Vasis absor-  
 bentibus Intestinorum in  
 venas meseraicas se exo-  
 nerare credatur. 106.  
 ejus ulterior propulsio per  
 Lactea quomodo fiat.  
 115. quomodo ad  
 Glandulas Meseraicas di-  
 luatur. 117. ejus progres-  
 sus ad cisternam Lumba-  
 rem, ubi adhuc diluitur.  
 121. adscensus in Du-  
 ctum Thoracicum, (ubi  
 adhuc dilutior redditur)  
 & hinc in subclaviam si-  
 nistram. quibus auxiliis  
 promoveatur? 124, 125.  
 Chyli ingressuri subcla-  
 viam, natura. 126. & 127.  
 170. ad 175. cur parva  
 copiâ simul ingrediatur  
 subclaviam? 161. inci-  
 piens ibi ejus miscela cum  
 sanguine. 162. perfe-  
 ctior mixtio in auriculis,  
 & corde. 163. perfectis-  
 sima in Pulmone. 200.  
 chyli successiva mutatio  
 in materiem subtilissi-  
 mam nutritioni aptam.  
 450. ad 452. Chyli uovi  
 perpetua necessitas ad nu-  
 tritionem, unde? 455.  
 456  
 Cibus. V. Ingestâ.  
 Cilia, eorumque usus. 508  
 Circulatio sanguinis proba-  
 ta per Arteriotomiam,  
 136. ad 142. per Phlebo-  
 tomiam. 143, 144. per li-  
 gaturas. 141, 143. circu-  
 latio hæc quomodo in ad-  
 ultis  
 G g 3

# I N D E X R E R U M

- ultis fiat? a 147. ad 160  
 Circulationis in Foetu ratio.  
 679. ad 682. & 695. 882  
 Circulatio in variis partibus  
 varia. 222 ad 224  
 Circulationis causae fictitiae  
 refelluntur, Ebullitio, 177  
 Calor. 178. Fermentum.  
 179. Vera causa Cordis  
 structura muscularis. 181  
 Circulatio qualis in somno?  
 590. n. 5. & 7. 597  
 Circulatorius humorum  
 motus solida destruens,  
 & eadem reficiens. 462.  
 ad 465  
 Circulatio spirituum nervo-  
 forum. 292  
 Circulatio Lymphae. 295.  
 &c.  
 Cisterna Lumbaris Chyli.  
 121  
 Clysmata quando indican-  
 tur? 1217. eorum mate-  
 ries varia. 1218  
 Cochleae structura. 562.  
 Usus. 563  
 Coctio Ventriculi quibus  
 Instrumentis peragatur  
 a 77. ad 89. fictitiae  
 causae refelluntur. 88. &  
 107  
 Coctionis Ventriculi laesae  
 symptomata, & causae.  
 807  
 Coctio crudae materiei quid  
 sit? 926, 927. ejus signa.  
 928. Causa. 929. quibus  
 adjuvetur auxiliis. 1179
- Coctio quaecumque optima?  
 945, 946  
 Coecum Intestinum, ejusque  
 munus. 109  
 Coeliacae Affectionis natu-  
 ra, & causae. 813  
 Collectio Humorum quid  
 sit? & unde oriatur? 794  
 Colorum Origo, & Varie-  
 tas, unde? 532, 533  
 Colum Intestinum, ejus  
 positura, structura, mu-  
 nus. 109  
 Comatis Vigilis & Somno-  
 lenti natura, & causae.  
 858  
 Compositionis malae mor-  
 bi. 712  
 Conceptus quomodo fiat?  
 671, 672, 673. & ubi fiat?  
 674. de Conceptu variae  
 quaestiones. 694  
 Concha externa auris. 550.  
 interna. 553  
 Condimentorum praecipua  
 materies. 54. non con-  
 ducunt tuendae sanitati.  
 1040  
 Conformationis malae  
 morbi. 705. ad 709  
 Conglobatae, & Conglo-  
 meratae Glandulae. V  
 Glandula.  
 Consuetudo altera Natura,  
 & ejus Effectus. 1028  
 Contractio Muscularis. V.  
 Musculus.  
 Convulsionis Natura, & cau-  
 sa. 864  
 Co-

Coracoceratohyoidei Musculi. 72

Cor. ejus situs, connexio.

182. *Auriculæ* earumque

structura. 148, 187. *Ven-*

*triculi*. 184. *Valvulae*,

harumque munus. 149.

ad 157. & 219. Structura

*muscularis* & columnæ

carneæ, harumque usus

ibidem & 149. *Nervi*.

185. *Vasa Coronaria*,

quorum impletio & de-

pletio ἀρροιας cum Vasis

reliquis sanguineis. 183.

*Diaſtole*. 190. *Syſtole*.

187. quo mechanismo

haec contractio & restitu-

tio alternatim fiat? 409

*Auriculæ* simul, & *Ven-*

*triculi* simul alternatim

contracti, & laxati. 159

Cornea tunica oculi. 518

Corpus natura, operatio-

nibus a mente diversum,

26. β. in mentem tamen

agit, & ab eâ patitur. δ.

hujus ratio ignota hacte-

nus. ι.

Corporei motus triplicis

generis. ζ.

Corpus humanum Fluidis,

& Solidis constat. 39

Corporis Pyramidalis stru-

ctura, & usus. 643

Cortex Cerebri. Υ. Cete-

brum.

Costæ, earumque descri-

ptio. 612. earum motus

in inspiratione. 609. D. I.

instrumenta hujus actio-

nis 613. ad 617. restitu-

tio in expiratione. 619

*Crisis* & materies Critica

quid sit? 931. *Crisis*

causa. 932. Critica per-

turbatio. 933. Critica

symptomata. 934. quo-

modo a morboſis distin-

guenda. 936, 937. *Crisis*

præſentis ſigna, & variæ

ſpecies. 938. *Crisis* ſa-

lubris ſigna. 939

*Criſin* quænam auxilia

promoveant. 1179

*Cryſtallina* lens. 527. ejus

*Tunica*. 524. uſus. 538

*Cutis* ſtratum pingue, ejuſ-

que vaſa, cellulae oleo-

ſae, uſus. 416. ſtratum

nervosum. 417. reticula-

re corpus, ejuſque papil-

lae nerveae, *Tactus* Or-

ganum. 418. pili ho-

rumque uſus. 419. Ar-

teriae ſubcutaneae, ea-

rumque emiſſaria. 420.

*Venae* ſubcutaneae. 421.

meatus. 422. *Epidermi-*

dis ſtructura & uſus. 423.

glandulae miliares. 424.

*Cutis* & *Cuticulae* vari

colores unde? 868

*Cutanei* morbi plurimi un-

de orti? 422

*Cutis* purgatio ſaluberri-

ma. 1047

# INDEX RERUM

## D.

**D**ecrementum Senile unde? 474  
 Deglutitio quibus peragatur instrumentis. 70. ad 75. quibus de causis laedatur? 806  
 Dentis Incisorii eorumque actio. 61  
 Molares, eorumque actio. 62  
 Diabetis Natura, & causae. 824  
 Diaeta requisita ad Sanitatem Tuendam. 1033. ad 1043. ad longaeuitatem obtinendam. 1057. ad 1059. Diaeta aegrotorum. 1095. ad 1115  
 Διαίτης. quid sit? 707  
 Διαπνῶσις. ibidem.  
 Diaphoretica medicamenta quatenam dicantur? 1188. eorum materies. 1189. ad 1191. Indicatio. 1192  
 Diaphragmatis ortus, insertio, structura, Vis in abdomen. 86. n. 5. a. ejus nervi. 617. ejus actio in Inspiratione. 610, 616. Restitutio in Expiratione. 619  
 Diarrhoeae natura, & causae. 814  
 Diastole Cordis. 190, 191. Cordi naturalis, & σύσχυσις Systolae Arteriarum. 217

Diastole arteriarum illis violenta, & Systolae Cordis Synchrona. 217  
 Δίπνος quid sit, & unde oritur? 863  
 Diuretica quando Indicentur. 1220. eorum materies. 381. & 1222. quomodo iuventur. 1223. & infringantur. 1224  
 Diopaces, eorumque materies. 1243. n. 1  
 Ductus Communis biliaris. 346 Higmoreianus Testium. 644. Pancreaticus Wirsungianus. 96. 100. Thoracicus Pecqueti, ejusque Valvulae. 124. 125  
 Duodeno Intestino quatenam sint propria. 96  
 Dura Mater. V. Cerebrum.  
 Δυσπνοία Natura, & Causae. 822

## E.

**E**jaculatorium Vas seminis. 645, 648  
 Embryo. V. Foetus.  
 Emetica. V. Vomitoria.  
 Εμπροσθενότομος quid sit? & ejus Causae. 864  
 Εμψυαίσις quid sit? 709  
 Epidermidis structura & usus. 423  
 Epididymis, ejusque structura, & usus. 645. &c.  
 Epiglottis quomodo deglutendis occludatur? 71. quo-

# ET VERBORUM.

quomodo aerem admit-  
tat, & emittat. 194

Epilepsiae Natura, & Cau-  
sae. 862

Evacuantia Remedia quo-  
tuplicis generis. 1185.  
ad 1187

Evigilationis Causa, &  
Phaenomena. 590. n. 8. 9

Expirationis *Vitalis* modus,  
& Organa. 619. *Violen-  
tae* modus, & organa.  
622. alternae reiteratio-  
nis causa. 620

F.

**F**aemina in quo differat a  
Viro, respectu sterni,  
Thoracis, Clavicularum.  
&c. 623. & 660. & quae  
differentia circa Pelvim.  
659. faeminis laxiora  
vasa, quam Viris. 661.  
& perspiratio minor.  
662

Fenestra Ovalis Auris,  
ejusque membrana. 556.  
ad 557

Rotunda, ejusque mem-  
brana, & usus. 559

Fibra ultima muscularis  
Tendine instructa, & Ven-  
tre. 393. ejusmodi fibrae  
Origo, & indoles. 394.  
395. plurium fibrarum  
adunatio in unum fasci-  
culum singulari mem-  
branâ involutum. 396

Firmum. Vide Solidum.

Flacciditas nimia solidorum  
quomodo corrigenda.

1159. ejus signa. 916

Fluiditas nimia humorum  
quae mala producat. 784.  
quomodo corrigatur,  
1168. ejusque signa. 916.  
ex Fluidis quomodo fiant  
solida. 444. 445

Fluxionum natura, & causa.  
794. 795

Foecis Intestinalis materies,  
& separatio ab humori-  
bus. 108. 109. reductus in  
Ileum quomodo impedi-  
tus, & propulsio in Co-  
lon quomodo promotâ.  
ibidem. delapsus ad  
sphincterem ani 110.  
expulsio ex sphinctere.  
111

Foetor unde oriatur? 870

Foetus incipiens formatio  
intra uterum. 675. ejus  
incrementa. 676. quae  
partim a materie nutriti-  
tiâ Lymphaticâ per Os  
hausta. 682. & forsân  
partim a sanguine mater-  
no per Venam umbilica-  
lem ad eum delato. 681

Foetus maturi situs in Ute-  
ro. & nisus ad Partum.  
685

Foetus reperti in Ovario.  
669. in Tubis Fallopi-  
anis. 668. in Cavo Abdo-  
minis. 672

Gg 5

Foex

# INDEX RERUM

**Foex** Alvina in Foetu cur,  
& ubi aggregetur. 682.  
683. ejus egestio post  
Partum quomodo fiat. 693  
**Fonticulorum** Actio. 1239  
**Functio** quid sit, & quotu-  
plex? 695  
**Funiculi Umbilicalis** binae  
arteriae, & Vena. 677  
679. Urachus. 684

G.

**G**aleni Medicina qualis  
sit? 15  
**Galli Hippocraticae Medi-**  
**cinae Restauratores.** 17  
**Gargateonis muscoli.** 71  
**Genioglossi muscoli.** 62. &  
70. 71  
**Geniohyoidei muscoli.** 71  
**Glandularum simplicium,**  
& **Conglomeratarum dif-**  
**ferentia.** 241. *simplicium*  
*seu conglobatarum* stru-  
ctura, & vasa sanguinea,  
lymphatica, nervosa.  
242. folliculus. 247, 249.  
**Emissarium.** 249, 251,  
252. **Glandulosae stru-**  
**cturae altera ratio.** 262.  
**Conglomeratarum ex sim-**  
**plicibus adunatis compo-**  
**sitio, commune recepta-**  
**culum, & emissarium.**  
257, 258. **Glandulosae**  
**secretionis ratio.** 245. &c.  
**Secretorum humorum**  
**variae species.** 246. hu-

jus varietatis causae. 253  
**Glandis Veretri structura.**  
654, 655  
**Glottidis fabrica, munus.**  
194. deglutiendis quo-  
modo ocludatur. 71  
**Gustus Organum, ejusque**  
**historia.** 485, 487  
**Objecta.** 488. **modus,**  
**quo excitatur.** 489  
**Varia quaesita de Gustu,**  
490

**Gustus laesi symptomata &**  
**causae.** 854

H.

**H**aemorrhoidum Eva-  
cuatio quando indi-  
cetur, & quibus auxiliis  
promoveatur. 1236  
**Harvaeus Circulationis san-**  
**guinis Inventor, & cetræ**  
**Medicinae Fundator.** 18,  
160

**H $\mu$ ερκλωπικς** natura & cau-  
sa. 841

**H $\mu$ ερπληγία,** quid sit, & un-  
de oriatur? 861

**Hepar** quotnplici sanguine  
irrigetur. 326, 332. ad  
336. & 350. n. 4. **Vene**  
**portarum** ramificationes  
arteriosae per Hepar. 339.  
**Vennae Cavae** distributio-  
nes per illud. 341. **Arteria**  
**Hepatica** ejus nutritioni  
inserviens. 350. 1. **Vennae**  
**Hepaticae** in  $\alpha\lambda\upsilon\gamma\omicron\nu$  sub  
septo desinentes. 350. 3.  
*Lym-*

- Lymphatica*, eorumque  
ortus, & terminus. 350.2.  
*Nervus Hepaticus*. 345.  
*Acini glandulosi*, ex qui-  
bus adunatis lobuli, & ex  
his lobi hepatis. 342. ho-  
rum Acinorum emissaria  
in Porum Hepaticum de-  
finientia. 343. eorumdem  
actio secretoria *bilis*. 344.  
*Vesica Fellea*, ejus figura,  
situs, canalis *Cysticus*  
abeuns in ductum com-  
munem, qui in Duode-  
num penetrat. 346. Ve-  
sicæ hujus Vasa, glan-  
dulae, & *bilis Cysticæ*  
ortus. 348. *Bilis utrius-  
que* differentiae, & natu-  
ra. 98
- Hippocrates Medicinæ  
Graecæ fundator. 13
- Hirudinum actio. 1238
- Hygieine quid doceat? 36.  
1018
- I.
- Ideæ quomodo exciten-  
tur. 566. ad 569. ea-  
rum Varietas objectiva  
unde? 570. ideæ clæræ,  
distinctæ, vividæ, un-  
de? 575. ad 578
- Idiosyncrasia* quid sit? 889.  
ejus Effectus. 1024
- Ilei natura, & causæ. 816
- Imaginatio prima. 582. al-  
tera. 583
- Incudis structura, conne-  
xio, & usus. 555
- Incontinentia Urinæ qui-  
bus ex Causis oriatur. 823
- Incrementum corporis quo-  
modo fiat? 458, 459, 467  
incrementum quando  
maximum. 466
- Indicatio *Vitalis* vel *Conser-  
vatoria* quænam sit?  
1079. unde petenda?  
1087. ad 1094. quomo-  
do illi satisfaciendum?  
1095. &c. *Prophylactica*  
seu *Præservatoria*, quæ-  
nam? 1080. unde pe-  
tenda? 1116. quid exi-  
gat? 1117. &c. *Curato-  
ria*, seu *ὑγιαίνουσα*. 1081.  
unde petenda in morbis  
solidi, & quid requirat?  
1151. ad 1162. in mor-  
bis fluidi quid exigar?  
1163. &c. *Palliativa*,  
vel *Mitigatoria*, vel *Ur-  
gens*, quænam sit? 1082.  
quomodo illi satisfiat?  
1247. &c.
- Ingesta: eorum varia admo-  
dum materies humano  
generi nutriendo apta.  
49. ad 57. præparatio in  
multis cur necessaria. 53.  
ad 57. Ciborum man-  
ducatio quibus instru-  
mentis peragatur. 58 ad  
68. eorum incisio unde?  
61. Arctatio & attritio  
inter dentes molares quo-  
modo

# INDEX RERUM

- modo peragatur? 62. ingestorum admistio aeri, & liquoribus in os manantibus quid proficiat? 67. eorum protrusio versus fauces. 70. propulsio in Oesophagum. 71. delapsus in Ventriculum. 74. ingestis quid ab aëre & humoribus in Ventriculo contentis contingat? 78. quid ab ejus structura Musculari. 83. eorum conversio in Chylum quibusnam aliis adhuc fiat auxiliis? 86. Cibi quinam optimi tuendae sanitati. 1033, 1034. & quinam ad longaevitatem obtinendam? 1057. quinam conducant robustis. 1035. & quinam debilioribus. 1036. eorum assumpta copia quaenam optima. 1039. Potus quisnam saluberrimus? 1041, 1042, 1058. Ingluvies seu sinus Gulae, cur? & quibusnam adsit animalibus? 77. Inspirationis Vitalis Phaenomena. 609. &c. Causae. 611. Organa. 612. Alternae reiterationis causae. 620. Violentae instrumenta. 621. Intercostrales musculi. 613. eorum actio in Inspiratione. 615. Restitutio in Expiratione. 619. nervi. 617. Interspinales musculi colli. 621. Intestinorum crusta villosa & Tunica *a. intima*, ejusque structura & usus. 91. *β. altera* hanc succingens *vasculosa & glandulosa*. 92. *γ. Musculosa* parte concavâ annularibus, convexâ longitudinalibus fibris constans. 93. hujus musculosae structurae Effectus. 93, 103. 104. *δ. Extima* a Peritonaeo orta. 94. Intestinis Tenuibus quaenam sint communia. 95. Duodeno quaenam propria? 96. Intestini Coeci, Vermicularisejus appendicis, & Valvulae Tulpianae, munus. 109. Coli Valvulae, ligamentum musculosum, positura, munus. 109. Rectum valvulis & ligamento musculoso cur careat? Intestinorum Tenuium longitudo. 108. Coli longitudo. 109. Ischuriae natura, & causae. 821. Iris Oculi. 521. ejus dilatatae, vel contractae fibrae musculares. 520. Effectus. 536. K. Ka-



# ET VERBORUM.

K.

**K**ακοχρημία quid dicatur? 719. Variarum ejus species. 782

L.

**L**abiorum musculus, horumque actio. 62  
Labyrinthus auris internae. 557

Lactis natura, & partes. 689.

Lac in Puerperarum mammis quando, & quomodo generetur. 687. de Lacte varia quaesita soluta. 690

Lachrymarum origo, & indoles. 512. Lachrymantibus unde stillicidium per Nares. 513

Lactea Vasa, eorum insertio obliqua in Intestina. 113. quomodo eorum orificia aperiantur ingressu Chylo. 103, 104. Valvulae semilunares, earumque usus. 115, 116

Lacteorum primi generis initium, decursus, finis & usus. 116

Lacteorum secundi generis, initium, decursus, finis & munus. 117

Laryngis cartilagineae, musculus, actio. 194

Λιποπρίας natura & causae. 812

Λιποθυμίας, & Λιποψυχίας natura & causae. 829.

Curatio. 1160

Lemae Oculorum unde oriantur? 413

Lethargi natura, & causae. 858

Levatores musc. ani. 111

Levator Scapulae. 621

Lien. ejus situs, cohaesio, perpetua agitatio. 313.

ejus arteriae, harumque ramificatio, & fines. 315. ad 317. Lienis glandulosa corpuscula. 316,

321. Cellulae membranosa. 320. Vena splenica, hujusque ramificatio, foramina, fines. 319.

Nervi Lienis, eorumque usus. 322. Vasa Lymphatica, horumque situs, & origo. 318.

Lienis actio. 323, 324. soli Hepati inserviens. 326. 350. n. 11. Absurda varia de Liene. 328

Linea alba. 86

Linguae muscularis substantia, ejusque musculus externi. 62. Lingualium Papillarum origo, natura, Vaginulae, munus. 485. ad 487

Lochiorum origo, & qualitates variae. 686

Longaevitas quibus auxiliis obtineatur. 1054. ad 1066

Loquela quomodo edatur? 630

Lux,

# INDEX R E R U M

**Lux**, ejusque natura & proprietates. 532  
**Lympha**, ejusque natura & partes. 123, 176, 248, 249. ejus secretio glandulosa. 247. Lymphatica Vasa tam arteriosa, quam venosa. 246, 249. Lymphaticae Venae valvulosae. 249. Lympha parrium sub Diaphragmate positarum quò feratur. 121. quò Lympha Thoracis. 124. quò lympha Cerebri. 295. Lympha vel in cisternam lumbarem, vel in ductum Thoracicum, vel in venas sanguiferas derivata. 250  
**Lymphae Pancreaticae & Intestinalis**, nimia, vel impedita excretio, quos morbos producat? 774. & 808.  
**M.**  
**M**agnitudinis excedentis, vel deficientis morbi organici, 711  
**Mallei auris** descriptio. 554  
**Mammarum Vasa Sanguinea**, Lactifera, Papillae. &c. 688. Arteriae mammariae cum Epigastricis communicantes. 666. hinc mammae instantibus menstruis turgidae ibidem.

**Manducatio** quibus organis peragatur. 58. ad 68  
**Manducationis laesse** causae. 805  
**Maxillae inferioris articulationis** cum osse Temporum. 59. ejus musculi abductores. 60. Adductorum quatuor paria. 61  
**Maxillaris glandulae** structura, situs, usus. 65. 2.  
**Mearus Auditorii** structura, & mechanismus. 551. meatus Eustachianus. 558, 560  
**Meconium**, cujus sitindolis, & quomodo excernatur. 693  
**Medicinae Ortus**, Progressus, & Fata a 1. ad 20.  
**Medicinae definitio**. 22.  
**Objectum**. 21. **Finis**. 20.  
**Principia & fundamenta**. 24, 25  
**Medicina antiqua Orientalis**. 7  
**Medicina Graeca** ab Hippocrate in unum corpus redacta. 13. ab Aretaeo Cappadoce ordinatius digesta. 14  
**Medicina Galenica** in quibus laudanda; in quibus vituperanda. 15  
**Medicina Arabum**, ejusque laudes, & vituperia. 16  
**Mc-**

- Medulla Cerebri. &c. Vid. Cerebrum.
- Memoria quid sit? & unde originem habeat? 579
- Menagoga Remedia quandoam indicantur. 1225. eorum materies. 1226
- Mens naturâ, operationibus &c. a Corpore plane diversa. 26. β, γ. in corpus tamen agit, & ab eo patitur. ibidem. δ. hujus tamen Sympathiae causa ignota. ι. Mentis cogitationes aliae purae, aliae mixtae. ς.
- Menstrua, eorumque origo, symptomata, & alternus itus & reditus unde? 665. Varia in variis copia; variae viae; varium initium, & finis respectu aetatis unde? 667. quomodo possint, & quando debeant provocari. 1225, 1226. quomodo sisti queant. 1227
- Mesenterii connexio cum Intestinis. 95
- Meseraicarum glandularum actio. 117, 123
- Μετέωσις materiae morbosae. 940. quomodo cognoscitur locus, in quem migratura est materia morbi. 955
- Morbi definitio. 2. 696
- Morbi cur humano generi lapso coaevi? 3
- Morborum Differentiae. 699
- Morborum Similarium natura. 700. sedes. 701. origo. 703
- Morbi Organici. 703. ad 713
- Morbi Humorum excessu vel defectu peccantium. 715. ad 718
- Morbi humorum qualitate peccantium. 719. ad 734
- Morborum distinctiones ratione causae, subjecti, temporis, effectuum, status. 736
- Morborum Αἰτιολογία. 737. ad 800
- Morborum Συμπτωματολογία. 801. ad 870
- Morborum Σημειωτική. 878. &c.
- Mors senilis cur inevitabilis. 474, 475, 1053, 1054
- Morsus quibus instrumentis fiat. 59, 61
- Motus muscularis. V. musculus.
- Motus Voluntarii a Cerebro, Naturales a Cerebello. 415. &c.
- Motus corporis quantus sit saluberrimus. 1044
- Motus muscularis nimius quos pariat morbos? 766, 767. & quos nimium immi-

# INDEX RERUM

- imminutus? 769  
 Motus nimius Humorū  
 quos morbos pariat? 783  
 Muci secretio glandulosa,  
 ejusque natura & usus.  
 497. absterfio quā fiat?  
 498  
 Musculi simplicis unus *Ven-*  
*ter*, unusque *tendo*. 343  
 Musculi fere omnes conspi-  
 cui ex binis simplicibus,  
 opposito situ nexis, com-  
 positi. 399. muscularium  
*fibrarum* origo, & na-  
 tura. 394, 395. *Tendi-*  
*num* origo, & indoles.  
 399. *Arteriarum* in mu-  
 sculos distributio, & fi-  
 nes. 397. *Venae* & *Lym-*  
*phatica* musculorum.  
 398. *Nervi*. 395  
 Musculi rubedo, pallor, mo-  
 les, imminutio senilis un-  
 de?  
 Muscularis *contractionis*  
*phaenomena*, & status.  
 402. & 406. *Restitutio-*  
*nis* phaenomena & cau-  
 sae. 406. n. 8. & 407  
 Muscularium fibrarum &  
 Vasorum perpetuus &  
 spontaneus in contra-  
 ctionem visus, hinc An-  
 tagonistarum necessitas.  
 401  
 Muscularis motus non pen-  
 det praecipue a sanguine.  
 400. sed *causa* ejus in  
 succo nervoso quaerenda.  
 403. 404. &c.  
 Musculi Cordis contractio,  
 & Restitutio quomodo  
 alternatim fiat? 409  
 Musculorum Respiratorio-  
 rum alterna actio. 601. &c.  
 Muscularis contractionis  
 causae fictitiae. 408  
 Muscularis actionis Vis.  
 410. 411. & hujus Vis  
 directiones Varias unde?  
 412  
 Musculi Abdominis. 86. 5.  
 Alarum nasi constricto-  
 res. 491. Ani Levatores.  
 111. Hyodis Ossis. 71.  
 72. Palpebrarum. 410.  
 Labiorum. 72. Oculo-  
 rum. 410. Intercostales.  
 613. Laryngis. 194. Lin-  
 guae. 62, 70. Maxillae  
 inferioris. 60, 61  
 Musculi Palpebrarum. 410.  
 Superciliorum. 509. Sca-  
 pulae. 621. &c.  
 Myopum Visus ratio. 537,  
 538. quomodo emen-  
 detur. 539  
 N.  
 Narium figura, attra-  
 ctio odoratorum,  
 & musculi constrictores  
 alarum. 491. *Sinus*, co-  
 muniq̃ue descriptio. 492.  
*Ossicula spongiosa*, co-  
 rum situs, & structura  
 cellulosa. 493. *membra-*  
*na*

# E T V E R B O R U M.

- na glandulosa*, ejusque in-  
 sinuatio in sinus, & in  
 cellulas ossium spongio-  
 forum. 494. *Nervi Ol-*  
*factorii* origo, distribu-  
 tio, indoles. 495, 496.  
*Muci* Secretio, natura,  
 & usus. 497. hujus ab-  
 stersio ope nervi moto-  
 ri irritati. 498. Canalis  
 Nasalis. 513
- Naturales Res, seu Res se-  
 cundum Naturam quae-  
 nam dicantur? 1075.  
 sex Res non Naturales  
 quae nam sint? 745
- Naturales Functiones quae-  
 nam dicantur? 695
- Nauseae natura & causae,  
 809
- Nervosarum fibrarum ori-  
 go. 266. decursus. 271.  
 273. substantia fistulosa.  
 274. liquidum nervo-  
 sum, & ejus natura. 275.  
 (Vid. Spiritus nervosi.)  
 Actio Nervorum ope hu-  
 jus liquidi. 284. & 404.  
 &c.
- Nervorum paria decem in-  
 tra Cranium orta, & 31.  
 extra Cranium. 280
- Nervi intra Cranium & the-  
 cam Vertebralem pulpo-  
 si; inde egredientes quae-  
 nam induant *integumenta*  
 281. horum Involucro-  
 rum usus. 282. eorum-
- dem depositio ubinam  
 contingat? 283
- Nervosus succus. V. Spiritus Nervosi.
- Nervus Auditorius. 361
- Nervus Opticus. 516
- Νοκιάλας* Naturae & Cau-  
 sa. 841
- Numeti Excedentis vel de-  
 ficientis Morbi Organici.  
 710
- Nutritio quid sit? 436. ejus  
 necessitas 434. ad 462.  
 Nutritionis modus. 437.  
 locus ubi peragitur. 446.  
 Materies quae nam? 447,  
 452. hujus materiei qua-  
 litates. 453. Causa, sc.  
 circulatorius motus per  
 Conica, & Cylindrica  
 Vasa. 458, 463, 464
- O.
- Obliqui Musculi Abdo-  
 minis. 86. & 622
- Oculi *defensio* per Cilia, su-  
 percilia, Palpebras. 508,  
 ad 510. Humectatio unde,  
 & quos in usus? 512.  
 Caruncula spongiosa,  
 Punctalachrymalia, ca-  
 nales Lachrymosi, saccus  
 Lachrymalis. 513
- Oculi Orbita ossea, & pin-  
 guedo. 517. Orbitae fo-  
 ramen rotundum. 516.  
 hujus foraminis situs,  
 525. hujus situs necessi-  
 tas. 543
- H h      Ocu-

# INDEX RERUM

- Oculi Nervus Opticus. 516  
 Oculi Tunica. 1. *sclerotica*, anteriori parte Corneâ dicta, a durâ matre orta. 518. 2. *Choroeidea*, (a pîa meninge orta) ejusque structura. 519. *Uveae* (quâe Choroeidis pars anterior, & in cuius medio *Pupilla*.) nervi, fibrae musculares, harumque usus. 520. Uveae arteriosi annuli, horumque usus. 521. 3. *Retina*, ejusque structura. 525. Membrana Humoris Vitrei a scleroticâ orta ejusque processus Ciliares. 522. horum usus. 539. Tunica humoris Vitrei propria. 523 Tunica Crystallina. 524. membrana *Adnata*. 529  
 Oculi Humor Aqueus. 526. Crystallinus. 527. Vitreus. 528  
 Iris, & processum Ciliarium atrum pigmentum. 520, 522. illiusque usus. 536  
 Oculi Musculi quatuor Recti, & duo Obliqui. 530  
 Odorum materies. 499. Vehiculum. 500. ad 506.  
 Oeconomia animalis. V. Physiologia.  
 Oesophagi structura, & usus. 73  
 Oesopagaeus Musculus Pharyngis. 72  
 Oleositas nimia Ingestorum quos Effectus producat? 765  
 Olfactûs Organum descriptum. 491. ad 498. ejus objecta. 499. quomodo ejus sensus excitetur. 506. circa Olfactum variae quaestiones. 507  
 Olfactorius Nervus, ejus Origo, & distributio. 495  
 Omentum ejusque structura, & munus. 330. ad 333  
*O'phthalmoïas* natura & causa. 849  
 Ophthalmiae natura, & causa. 841  
*O'phthalmoïas* quid sit? & unde oriatur. 864  
 Organicorum morborum divisio. 704 &c.  
*Ophthalmoïas* indoles, & origo. 833  
 Oscitationis natura, & origo. 638  
 Ossiculi orbicularis auris connexio, usus. 555  
 Ossa unde varios accipiunt colores. 869  

P.

 Palliativa Indicatio quanam? 1082. Curatio. 1244. &c.  
 Palpebrarum structura, & musculi. 510. Innominata, aliaeque glandulae, ca-

# ET VERBORUM.

- earumque usus. 511, 512  
 Palpitatio cordis, ejusque  
 causae. 826  
 Panacea aanderur. 1180  
 Pancreas, ejusque situs,  
 structura, & functio. 100  
 Pancreaticae lymphae in-  
 doles, & partes. 101  
 Papillae mammae stru-  
 ctura. 688  
 Paralysis natura, & causae. 861  
 Παράπληγίαι natura, & cau-  
 sae. 861  
 Parotis Glandula. 65, n. 1  
 Partus quomodo fiat? 685  
 Pathologia, quid doceat? &  
 qualia ejus objecta? 698  
 Pecqueti Ductus Thoraci-  
 cus. 124, 125  
 Pelvis Renalis structura. 337  
 Penis structura. 654, 655.  
 Vasa sanguinea. 656.  
 musculi. 657. erectio, &  
 succedens flacciditas un-  
 de? ibidem  
 Peritonæi actio. 86. &c.  
 Peyer glandulae intestina-  
 les 92  
 Perspirabilis Sanctoriani  
 glandulae & Emissaria. 426.  
 Modus quis opti-  
 mus ad sanitatem? 428.  
 429. causae promovere. 430, 433.  
 impediens. 431, 433  
 Perspiratio quando maxi-  
 ma in sanis, & quando mi-  
 nima 433. minor in Faemi-  
 nis, quam in Viris. 662  
 Perspiratio nimia, vel parci-  
 or quos morbos creet? 778  
 Pharyngis musculi, eorum-  
 que actio. 71, 72  
 Pervigilii natura, & causae. 856  
 Phlebotome. vid. Venæ sect.  
 Physiologia quid sit, & quæ-  
 nam ejus objecta? 33  
 Pinguetudinis secretio glan-  
 dulosa. 330  
 Pituitae variae species, &  
 effectus. 787  
 Placentae uterinae rudi-  
 menta. 675. incrementa,  
 & connexio cum utero. 676.  
 ejus structura, &  
 funiculi umbilicalis vasa. 679.  
 Membranae cho-  
 rion, & amnion, earum-  
 que usus. 682. Allantois,  
 hujusque munus. 684  
 Πληθώρα qualis, & quotu-  
 plex. 717. ejus origo &  
 effectus. 731  
 Porus. V. Ingesta.  
 Prognosis morborum unde  
 petenda? 921  
 Προφυλάξις, seu præserva-  
 tionis morborum præci-  
 pua auxilia. 1050. ad 1052  
 Prophylactica, seu Prae-  
 servatoria indicatio quæ-  
 nam dicatur. 1080  
 H h 2 Pro-

# INDEX RERUM

- Prostatae structura, & E-**  
missaria in urethram.  
652. ejus humoris indol-  
es. 653. miscela cum se-  
mine. 653. prostatae  
membrana muscularis,  
hujusque usus. 657
- Πύλας seu Portae Hepatis.**  
338
- Pulmonis Aspera Arteria, &**  
Bronchia, horumque fi-  
nes vesiculares. 195, 196.  
Vasa sanguinea, sangui-  
nisque per Pulmonem cir-  
culatio. 198, 199  
Pulmonis actio in chy-  
lum & in sanguinem.  
200, 203
- Pulmonis naturalis in con-**  
tractionem nisus unde?  
602, 605. ejus in inspi-  
ratione status 197, 618,  
619. in expiratione con-  
tractio qualis? 619, ad  
622
- Pulmonis in Fœtu quis sit**  
status? 681
- Pulmonis Actio laesa quos**  
producat morbos? 820.
- Pulsus arteriarum & cordis**  
origo, natura, & pro-  
prietates. 132, 217. ad  
219. &c.
- Pulsuum cognoscendorum**  
necessitas. 958
- Pulsus quinam boni? qui-**  
nam optimi? 964, 966
- Pulsus quinam mali? qui-**  
nam pessimi? 964. ad 966
- Pulsus Fortis & debilis unde?**  
& quid indicent? 959, 960.  
*Magnus, parvus, plenus,*  
*Vacuus.* quid notent? 661.  
*Durus & mollis* quid præfa-  
giant. 962. *mollis* tamen in  
peripneumonia malus ibi-  
dem. *Rarus & frequens* quid  
iudicent? 663. *intermittens*  
unde oriatur? 827. unde  
celerior? 828
- Pulsus imminuti symp-**  
tomata, & causae. 829
- Pulsuum multiplex variatio**  
unde saepe oriatur? 966
- Pupilla oculi. ejusque situs.**  
519. dilatatio, & con-  
strictio ejus quomodo fi-  
at? 520. & quibus de cau-  
sis? 536
- Pylori constrictio, & laxa-**  
tio unde? 81, 83.
- Pyramidales Musculi Ab-**  
dominis. 86
- Pyramidale corpus sperma-**  
ticum. 643
- Q.**
- Qualitas Vitiata corpo-**  
ris quid sit? 867
- Quies nimia quos**  
morbos producat? 769
- R.**
- Radiatorum Lucidorum o-**  
rigo. & proprietates.  
532. eorum Reflexio quan-  
do? & quibus legibus fiat?  
533, ad 535. eorum Refra-  
ctio ad Corneam. 536, 540.  
ad



- ad Lentem crystallinam. 338, 340. ad Humorem Vitreum. 340. eorum collectio ad Retinam. 338, 341, 342.
- Radii sonori cujus sint indolis. 347. quomodo ad membranam Tympani perveniant. 352. quomodo ad membranam foraminis ovalis. 355, 357. & ad membranam foraminis rotundi. 359. quomodo ad nervum Acousticum, & inde ad sensorium commune. 361.
- Rectum Intestinum ejusque positura, structura, &c. 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
- Reflexio radiorum lucidorum quibus fiat legibus. 333.
- Refractionis radiorum eausa. 334. leges. 335.
- Renum Arteriae Emulgentes, harum ramificationes, exitus in Venas, & in fistulas laterales utinarias; corpora Pyramidalia; Papillae. 352. Glandulosa corpuscula. 353. hinc duplex secernendae Urinae ratio. ibidem. Venae Emulgentis ramificationes, & exitus. 355.
- Palvis, ejusque structura. 356, 357. Ureterum oris, structura, decursus, insertio obliqua in Vesicam, usus. 357. Arteriae nutritioni Renum dicatae, & hinc ortae Venulae, & vasa Lymphatica. 354. Renum actio mechanica. 359. Renum in Foetu conditio. 684.
- Resolutio Materiae crudae quid sit? 930.
- Respiratio est Actio partim Vitalis, partim voluntaria. 601.
- Respirationis Vitalis Phaenomena. 606, ad 611. ejus Organa. a 612, ad 620. Respirationis voluntariae Organa. 621. Variarum quaestiones circa Respirationem. 625. V. Inspiratio, & Expiratio.
- Respiratio exclusi Foetus quomodo incipiat? 691.
- Respirationis multiplex varietas unde oriatur? 987.
- Respiratio qualis in Somno? 590. N. 6. 7. & 597.
- Respirationis considerandae Medico necessitas. 990.
- Respirationis laesae Symptomata. 830, ad 835.
- Respiratio quatenam bona? quatenam optima? 981, 985. quatenam mala? quatenam pessima? 982, 983, 984, 989.
- Respiratio Facilis & Difficilis. 971. Dolens. 972. Magna. 973. Parva. 974.

# INDEX RERUM

- Lenta.* 975. *Celeris.* 976. Sanguinis singularis circu-  
*Æqualis*, & *inaequalis*. 224, 300. &c.  
*Suffocativa.* 978. Sanguinis in Corde conten-  
 exercitata in suprema parte Thoracis. 979. ti conditio. 165. ad 169  
*Sublimis.* 980. *Frigida.* Sanguinis ad Cerebrum de-  
 983 ferendi indoles & portio.  
 Restitutio Musculi. V. Mu- 224, 235, 239, 274  
 scul. Sanguini quid in Pulmone  
 Retina Tunica Oculi. 525. contingat. 200, 204, 205,  
 ejus functio. 542 208, 619, 620. quid in  
 Rhomboides Musc. Scapu- Liene? 323, 324. quid  
 lae. 621 in Omento? 330. ad 332.  
 Rigiditas solidorum nimia quid in Venâ Portarum.  
 quomodo emendetur. 106. quid ad Renes. V.  
 1158 Renes. &c.  
 Ritus natura, & Organa. Sanguinis expulsio velocior  
 635 ex Corde, & tardior  
 Ros in cava Abdominis, 611 quid producat? 819  
 &c. exhalans. 331 Sanguinis excretio nimia,  
 Ructus natura, & causae. vel solita impedita quid  
 811 incommodi pariat? 775  
 S. Sanitas quid sit? 1, 695,  
 Saliva, ejusque Origo & 882, 1019  
 Emissaria. 65. natura. Sanitas Temperiei, qualis  
 66. usus. 67. immode- sit? 889  
 rata rejectio quid incom- Sanitatis optimae signa un-  
 modi producat. 66, 68, de petenda? 885, 886  
 772 Sanitas quomodo conserva-  
 Salivatio quando indicetur. ri queat? 1020. ad 1048  
 1198. quomodo excite- Scarificationes quomodo  
 tur? 1199, 1200. quo- agant? 1237  
 modo sedetur. 1201 Sclerotica Tunica Oculi.  
 Sanctioriana Perspiratio. V. 518  
 Perspiratio. Secretio humorum quomo-  
 Sanguis, ejusque Natura, do fiat ad Glandulas?  
 Partes, Phaenomena. 244. ad 252  
 223. ad 230 Secretorum humorum Va-  
 do quid sit

# ET VERBORUM.

- rietas unde pendeat? 253  
 Secretionis glandulosae fi-  
 ctitiae causae refutantur. 255, 256  
 Secundinae. 685  
 Semeiotice quid tradat,  
 & qualia sint ejus Ob-  
 jecta. 35  
 Seminis Masculini genera-  
 tio in Testibus. 644, 649,  
 650. &c. ejus indoles.  
 651, 658, 673. ejus iter a  
 Testibus ad Vesiculas se-  
 miniales, & quid ibi pa-  
 tiatur. 649. ejus admi-  
 stio cum humore Pro-  
 statae. 652. ejus ejacula-  
 tio ex pene quomodo  
 fiat? 657. ingressus in  
 Ovum Faemininum, &  
 hinc sequens Conceptus.  
 673  
 Seminis resorptio in san-  
 guinem, ejusque effe-  
 ctus. 647  
 Seminales Arteriae & Ve-  
 nae. 641  
 Seminis Excretio nimia  
 quos morbos pariat? 776  
 Sensorium commune ubi  
 sedem habeat? 574  
 Senum Visus ratio. 537,  
 538. quomodo emende-  
 tur. 539  
 Sensatio quomodo fiat? 566.  
 ad 571  
 Sensus Externi: Auditus.  
 547. Gustus. 485  
 Olfactus. 491. Tactus.  
 481. Visus. 508  
 Sensus Interni: Affectus  
 animi. 572. Attentio.  
 584. Imaginatio. 582.  
 Memoria. 579. Varia  
 quaesita circa sensus In-  
 ternos. 586  
 Septum Medium. V. Dia-  
 phragma.  
 Septrum medium Penis. 655  
 Setacea quomodo agant?  
 1239  
 Sialagoga. V. Saliva.  
 Signa διαγνωστικά, vel δηλω-  
 τικά quaenam dicantur?  
 876. quaenam προγνωστι-  
 κά? quaenam verò ἀνα-  
 μνηστικά? ibidem.  
 Signum παθολογικόν, e-  
 jusque necessitas. 877, 873  
 Signa ἐπιγνωσμένα, co-  
 rumque summa utili-  
 tas. 879, 880. Signa κρι-  
 τικά 881. n. 3  
 Signa Sanitatis optimae ge-  
 neralia, unde petenda?  
 885. &c. Temperamento-  
 rum. 890. ad 897. Mor-  
 bi futuri. 898. praeteriti.  
 899. praesentis. 900  
 Signa causae morbi unde pe-  
 tenda? 901  
 Signa morborum in Solidis.  
 902. ad 907  
 Signa Acuti Morbi in Flui-  
 dis. 908. Signa Acrimo-  
 niae in genere 911. Aci-  
 dae.

# INDEX RERUM

- dae.* 613. *Alcalinae* 912.  
*Ammoniaca* seu *muriati-*  
*cae.* 914. *Oleosae putre-*  
*factae.* 915. *Fluiditatis*  
*nimiae* 916. *Tenacitatis*  
*nimiae.* 917  
*Signa Malignitatis* in *Acu-*  
*tis.* 919  
*Signa Cruditatis.* 925. *Coc-*  
*tionis.* 928. *Crisis futu-*  
*rae.* 936, 937. *praesen-*  
*tis.* 938. *Salubris.* 939  
*Signa roboris Vitae.* 947.  
*Magnitudinis Morbi.* 949  
*Similarium Morborum Na-*  
*tura.* 700. *Sedes.* 701.  
*Origo.* 702, 703  
*Sinapismi, eorumque ma-*  
*teries,* 1243. n. 2  
*Sinus Venae Cavae in Auri-*  
*culam dextram Cordis*  
*terminatus.* 135. *ejus*  
*Muscularis Actio.* 147  
*Sinus Venarum Pulmonica-*  
*rum in Auriculam sini-*  
*stram desinens.* 135. *ejus*  
*muscularis actio.* 156  
*Sitis nimia unde?* 804. *ejus*  
*Varia remedia, pro varie-*  
*tate causae.* 1247. ad 1250  
*Solidorum ex fluidis origo.*  
*441. ad 443*  
*Solida ultima a fluidis vix*  
*differentia.* 461  
*Solidorum moles aucta in-*  
*crefcente aetate.* 467, 470.  
 1053  
*Solidorum robur & firmitas*  
*nuda?* 967. ad 970. *mo-*  
*tus unde?* 390  
*Solutionis Continui Morbi?*  
 713. *quomodo Sanentur.*  
 1156, 1157  
*Somnolentiae Natura, &*  
*causae.* 857  
*Somni phaenomena & pro-*  
*prietates.* 590. *definitio.*  
 593. *Causa proxima.* 594,  
 595. *Causae procatacti-*  
*cae.* 591. *impedimenta.*  
 592. *Effectus.* 596. ad  
 598. *Varia quae sita solu-*  
*ta circa somnum.* 599. *e-*  
*jus modus requisitus ad*  
*sanitatem conservandam*  
 1045  
*Sonus, ejusque Natura, &*  
*propagatio.* 547  
*Spasmi Natura, causae &*  
*species.* 864  
*Sphincter ani, ejusque actio.*  
 111. *Vesicae urinae,*  
*ejusque structura, & mu-*  
*nus.* 366, 367  
*Spirituum Nervosorum ori-*  
*go, & canales Medullofi.*  
 274. *Natura* 275, 276.  
*Copia ingens, & conti-*  
*nua & aequabilis genera-*  
*tio.* 278, 279. *Munus.*  
 284, 285. & 404. *Circu-*  
*latio.* 292  
*Spirituum Motus Excedens,*  
*vel nimium imminutus,*  
*quos morbos producat?*  
 783  
 Sta-

# E T V E R B O R U M.

Stapes, ejusque structura, connexio, usus. 555	Systoles Cordis causa, phaenomena, & Effectus. 187, 188. illa cordi Vix lenta. 217
Σταχάρια quid sit? 709	Systolae Arteriarum (quae illis est naturalis.) diastolae cordis σύγχρονα. 218. &c.
Sternutatio quomodo fiat? & Sternutatoria quatenam? 507. & 637	T.
Succi Nervosi Natura. 275. &c. Pancreatici indoles, Effectus. 101	Tactus Organum. 481. ad 483. de Tactu variae quaestiones. 484
Sudoris princeps Organum, Glandulae miliares, emissaria, horumque Valvulae. 424. Sudoris secundaria scaturigo. 420, 433. Sudoris varietas, & Effectus, unde? 425, 433	Temperamenti calidi signa, & proprietates. 890. frigidi. 891. siccitatis & humiditatis. 892. Biliosi. 893. sanguinei. 894. Phlegmatici. 895. Melancholici. 896
Sudorifera Medicamenta. 1188. eorum materies. 1189. ad 1191. Indicatio. 1192	Temperiei Sanitas quatenam dicatur. 889
Σύμφυσις quid sit? 709	Tenacitas humorum quid mali apporret? 785. ejus signa. 917. Remedia. 1165, 1169
Συμψησις. ibidem	Tendo muscularis. 393. ejus structura. 399. Status tam in contractione, quam in restitutione fere idem. 401. n. 7, 8
Supercilia, eorumque structura, & usus. 508. Musc. depressor. 509. Musc. Elevator Frontalis. ibidem.	Testis Masculini Vasa sanguinea. 642. Vasa seminalia, Ductusque Hig-morianus. 644. Vasa Lymphatica. 647. Nervi, & nervea Tunica. 646.
Suppositoria, eorumque materies. 1218	Epididymis & Vas Ejaculatorium. 645. Actio. 649
Surditas perfecta unde oritur? 852	
Symptomata, eorumque variae species, & denominationes. 801, 802	
Συμπτωματολογία. 801. ad 870	
Syncopes natura, & causae 829	

# INDEX RERUM

*Τέτρανος* quid sit? & unde oriatur? 864

Therapeutice quid doceat? & quas contineat partes? 37

Thoracis capacitas aucta in Inspiratione. 609. n. 3. hujus dilatationis organa. 615, 616. Thoracis restitutio. 619

*Θλίψις* quid sit? 709

Tubae Fallopiianae uteri, earumque structura. 668. earum Actio. 671. & 668

Tubae Eustachianae structura, & usus. 558, 560

Tulpiana Valvula, ejusque usus. 109

Tussis natura, & Organa. 636

Tympani membrana, ejusque structura, & Actio. 552, 553

## V.

Valvularum Intestinalium fabrica, usus. 91, 93, 103, 104. Valvulae in Colo frequentes. 109

Valvula Tulpiana, ejusque usus. 109

Valvulae Venarum Sanguinearum. 133. Lymphaticarum. 249. Lactearum. 116, 117. Ductus Thoracici. 124

Valvula semilunaris subclaviae sinistrae, ejusque usus. 124, 161

Valvulae tres tricuspides ventriculi dextri Cordis, quomodo aperiantur. 149. quomodo occludantur. 151

Valvularum 2 tricuspidum Ventriculi sinistri aperiatio, & occlusio. 156

Valvulae tres semilunares Aortae, earumque usus. 157, 219

Valvulae tres semilunares arteriae Pulmonalis, earumque munus. 152, 153

Vasorum Vis & Actio unde pendeat? 1092. ad 1094

Vasorum numerus unde in crescente aetate decreseat? 467. ad 470, 1053

Venarum figura, membranae, Valvulae, & differentiae ab arteriis. 133

Venae sanguinem ab angusto in latum, ab extremis ad cor vehentes. 143, 144, 146, 161

Venae Cavae Sinus Muscularis. 135, ejus actio 147

Venae Coronariae Cordis. 183

Vena sine Pari, ejusque usus. 308

Venae Portarum, ortus, capsula Glissoniana, & in arteriosam structuram degeneratio. 338. ejus ramificatio per Hepar. 339

Venae

- Venae subclaviae sinistrae  
Valvula semilunaris. 124  
Vena spermatica. 641. Um-  
bilicalis. 679. ejusque  
degeneratio in ligamen-  
tum post Partum. 692  
Venae Sectionis Effectus.  
1228, 1229. quando in-  
dicetur? 1230. quando  
veterut? 1233. quomodo  
optime instituitur. 1231.  
praeparatio ad V. Sectio-  
nem. 1232  
Venenorum variae classes.  
1136. ad 1145. varia an-  
tidota. 1119. ad 1135  
Ventriculi crusta Villosa, &  
Tunica intima. 77. Tu-  
nica Vasculosa, & Glan-  
dulosa, Humorisque in  
Ventriculum secreti ori-  
go, indoles. ibidem. Tu-  
nica Muscularis, motus-  
que Peristalticus. 81. Tu-  
nica Extima. 82. Actio  
in Ingesta. 84. quibus-  
que aliis adjuvetur auxi-  
liis. 86  
Ventriculi os superius  
quomodo constringatur?  
75, 81. Os inferius. V.  
Pylorus.  
Ventriculus dexter Cordis  
laxatus admittens san-  
guinem ex auricula dex-  
trâ. 149. contractus eum  
pellens in arteriam Pul-  
monalem. 151, 152  
Ventriculus sinister laxa-  
tus admittens sanguinem  
ex auriculâ sinistra. 156.  
contractus verò eum pel-  
lens in Aortam. 157  
Ventriculus uterque simul  
flaccidus, simul contra-  
ctus. 159. cum  
auriculis. 159  
Ventorum actio in corpus  
humanum varia unde  
pendeat. 753  
Vermium Intestinalium  
origo, tres species, &  
Effectus. 792  
Vermicularis Intestinuli of-  
ficium. 109  
Vertiginis natura, & cau-  
sae. 863  
Vesicatoria, eorumque ma-  
teries. 1243. n. 3  
Vigilia quid sit, & unde o-  
rriatur? 587. ad 589  
Vigiliae nimiae symptomati-  
cae quibus auxiliis pel-  
lantur. 1252. ad 1257  
Vigilia nimia quos morbos  
producat. 768  
Vinum quomodo conficia-  
tur. 56  
Vires Vitae in aegris quae-  
nam dicantur? 1076. un-  
de pendeant, & unde  
aestimandae. 942, 1077,  
1078. & 1088. ad 1094  
Viscositas nimia Ingesto-  
rum quid producat? 764  
Visionis locus & modus.  
331.

# INDEX RERUM

- Visus** perfectio unde pendet? 531. &c. 544  
**Visus** Myopum, & Senum unde? 537. ad 538. quomodo emendetur? 539  
**Circa Visum** varia quae sita. 545, 546  
**Visus** laesi symptomata & causae. 836. ad 848  
**Vita**, ejusque definitio. 42, 695  
**Vitalis Indicatio** quatenam sit? 1079  
**Vitales Functiones** quatenam dicantur? 695  
**Vitreæ tunica Oculi.** 523.  
**Vitreus humor.** 528. Umbilicalis funiculi Vasa, eorumque usus. 677. Unitatis Solutae morbi. 613. eorum causae. 800  
**Vomitus** natura, & causae. 809  
**Vomitória** quando Indicentur? 1202. quando verentur. 1203. eorum materies. 1205. ad 1207. praeparatio ad faciliorem Vomitum. 1204. Vomitus quomodo sedetur? 1208  
**Vox** quomodo edatur? 626.  
**Vocis** differentiae unde? 627, 628  
**Urachus**, ejusque in Foetu usus. 684. ejus contractio post Partum. 693  
**Ureteres**, eorumque ortus, structura, decursus, insertio, & usus. 357  
**Urethrae** structura. 654. Musculi, eorumque actio. 367, 657, 658  
**Urina** ejusque Mechanica Secretio in Renibus. 352. ad 359. excretio ex Vesica quomodo fiat? 366, 367  
**Urina** quibus constet partibus. 375. ad 379  
**Urinarum** in sanis quatuor differentiae. 369. ad 372  
**Urinae** qualitates variae unde? 382  
**Urinae** varietas in variis unde? 991  
**Urinae** in Foetu natura, & aggestio ubi fiat? 684. Excretio per Urethram post Partum unde? 693  
**Urinae** Excretio nimia, & suppressio quos morbos producat. 777  
**Urinae** secretionis laesae symptomata, horumque causae. 821. ad 824  
**Urina** cur cruenta a nimio motu? 383. Quatenam Medico in urinis sint observanda. 992. Quatenam ex Urinis colligi possint? 1017  
**Urinae** consideratio in acutis febribus maxime necessaria. 1016  
**Urina copiosa** unde? 993. quid



# ET VERBORUM.

- quid praefagiat? 994.  
*parcior* unde? 995. quid  
 portendat? 996. *Tenuis*.  
 997. 998. *Rubra* absque  
 sedimento in acutis. 999,  
 1000. *Flammea* tenuis  
 sine sedimento. 1001. *Ru-*  
*bra* cum sedimento. 1003  
 1004. *Crocea* tingens im-  
 missa. 1005. *Viridis*. 1006  
 1007. *Pinguis arenulosa*.  
 1010. *Pinguis oleosa*.  
 1011. *Spumosa*. 1012.  
*sponte faetida*. 1013. *Co-*  
*lorata insulsa*. 1014  
 Urina qualis designat vitia  
 organotum urinariorum  
 & seminalium? 1008.  
 quatenam calculum Vesi-  
 cae ut plurimum denotet?
1015.  
 Uterus, ejus situs qualis. 663.  
 structura. 664. Tubae  
 Fallopianae. 668. Ova-  
 ria. 669  
 Uterus impraegnatus quo-  
 modo claudatur. 675. ejus  
 vero Vasa & Emissaria  
 sensim dilatentur? 676,  
 677. Os internum quo-  
 modo in Partu dilatetur,  
 & lubricetur. 685  
 Uterina Medicamenta co-  
 rumque materies. 1226  
 Uvea membrana Oculi. 510  
 Uvula, ejusque actio. 71  
 W.  
 Witfungenus Pancrea-  
 tis Ductus. 96. & 100

## FINIS.

